Quantenmechanik:

jedes Molekül hat diskrete Energieniveaus

Bsp. Schwingung: Niveaus näherungsweise äquidistant (vgl. Sprossen einer Leiter)

Gesucht: wahrscheinlichste Besetzung der Energieniveaus

Quantenmechanik:

jedes Molekül hat diskrete Energieniveaus

Bsp. Schwingung: Niveaus näherungsweise äquidistant (vgl. Sprossen einer Leiter)

1. Bsp.:
Ensemble aus 3 Molekülen, $N = 3$
Gesamtenergie $E = 3$

a) jedes habe Energie ϵ_0 – Wie viele Möglichkeiten ?

keine ! $3 \cdot \epsilon_0 = 0$, Widerspruch zur Randbedingung Gesamtenergie $E = 3$!

Quantenmechanik:

jedes Molekül hat diskrete Energieniveaus

Bsp. Schwingung: Niveaus näherungsweise äquidistant (vgl. Sprossen einer Leiter)

Gesucht: wahrscheinlichste Besetzung der Energieniveaus

1. Bsp.:
Ensemble aus 3 Molekülen, $N = 3$
Gesamtenergie $E = 3$

a) jedes habe Energie ϵ_0 – Wie viele Möglichkeiten ?

keine ! $3 \cdot \epsilon_0 = 0$, Widerspruch zur Randbedingung Gesamtenergie $E = 3$!

b) jedes habe Energie ϵ_1 – Wie viele Möglichkeiten ?

eine ! $3 \cdot \epsilon_1 = 3$, Randbedingung Gesamtenergie $E = 3$ erfüllt

Gesucht: wahrscheinlichste Besetzung der Energieniveaus

Quantenmechanik:

jedes Molekül hat diskrete Energieniveaus

Bsp. Schwingung: Niveaus näherungsweise äquidistant (vgl. Sprossen einer Leiter)

1. Bsp.:
Ensemble aus 3 Molekülen, $N = 3$
Gesamtenergie $E = 3$

a) jedes habe Energie ϵ_0 – Wie viele Möglichkeiten ?

keine ! $3 \cdot \epsilon_0 = 0$, Widerspruch zur Randbedingung Gesamtenergie $E = 3$!

b) jedes habe Energie ϵ_1 – Wie viele Möglichkeiten ?

eine ! $3 \cdot \epsilon_1 = 3$, Randbedingung Gesamtenergie $E = 3$ erfüllt

c) eines habe Energie ϵ_3 – Wie viele Möglichkeiten ?

drei ! $1 \cdot \epsilon_3 + 2 \cdot \epsilon_0 = 3$, Randbedingung $E = 3$ erfüllt

Quantenmechanik:

jedes Molekül hat diskrete Energieniveaus

Bsp. Schwingung: Niveaus näherungsweise äquidistant (vgl. Sprossen einer Leiter)

1. Bsp.:
Ensemble aus 3 Molekülen, $N = 3$
Gesamtenergie $E = 3$

allg. Formel für die Zahl der Möglichkeiten

$$W = \frac{N!}{n_0!n_1!n_2!n_3!...} \quad n_i = \text{Anzahl Moleküle in Energieniveau } \epsilon_i$$

mit den Randbedingungen

$$\sum n_i = N, \quad \sum n_i \epsilon_i = E$$

hier also:

$$W = \frac{3!}{2!0!1!1!0!...} = \frac{6}{2} = 3$$

Gesucht: wahrscheinlichste Besetzung der Energieniveaus

Quantenmechanik:

jedes Molekül hat diskrete Energieniveaus

Bsp. Schwingung: Niveaus näherungsweise äquidistant (vgl. Sprossen einer Leiter)

1. Bsp.:
Ensemble aus 3 Molekülen, $N = 3$
Gesamtenergie $E = 3$

allg. Formel für die Zahl der Möglichkeiten

$$W = \frac{N!}{n_0!n_1!n_2!n_3!...} \quad n_i = \text{Anzahl Moleküle in Energieniveau } \epsilon_i$$

mit den Randbedingungen

$$\sum n_i = N, \quad \sum n_i \epsilon_i = E$$

Welches ist die Kombination mit den meisten Möglichkeiten?

$$W = \frac{3!}{1!1!1!0!0!...} = 6$$

Gesucht: wahrscheinlichste Besetzung der Energieniveaus

Quantenmechanik:

jedes Molekül hat diskrete Energieniveaus

Bsp. Schwingung: Niveaus näherungsweise äquidistant (vgl. Sprossen einer Leiter)

2. Bsp.:
Ensemble aus 30 Molekülen, $N = 30$
Gesamtenergie $E = 30$

a) jedes habe Energie ϵ_1 – Wie viele Möglichkeiten?

$$W = \frac{30!}{0!30!0!0!0!...} = 1$$

Gesucht: wahrscheinlichste Besetzung der Energieniveaus

Quantenmechanik:

jedes Molekül hat diskrete Energieniveaus

Bsp. Schwingung: Niveaus näherungsweise äquidistant (vgl. Sprossen einer Leiter)

2. Bsp.:
Ensemble aus 30 Molekülen, $N = 30$
Gesamtenergie $E = 30$

a) jedes habe Energie ϵ_1 – Wie viele Möglichkeiten?

$$W = \frac{30!}{0!30!0!0!0!...} = 1$$

b) je 10 haben Energie $\epsilon_0, \epsilon_1, \epsilon_2$

$$W = \frac{30!}{10!10!10!0!0!...} = \frac{2.65 \cdot 10^{32}}{4.78 \cdot 10^{19}} = 5.55 \cdot 10^{12}$$

Quantenmechanik:

jedes Molekül hat diskrete Energieniveaus

Bsp. Schwingung: Niveaus näherungsweise äquidistant (vgl. Sprossen einer Leiter)

2. Bsp.:
Ensemble aus 30 Molekülen, $N = 30$
Gesamtenergie $E = 30$

a) jedes habe Energie ϵ_1 – Wie viele Möglichkeiten?

$$W = \frac{30!}{0!30!0!0!0!...} = 1$$

b) je 10 haben Energie $\epsilon_0, \epsilon_1, \epsilon_2$

$$W = \frac{30!}{10!10!10!0!0!...} = \frac{2.65 \cdot 10^{32}}{4.78 \cdot 10^{19}} = 5.55 \cdot 10^{12}$$

c) Kombination mit den meisten Möglichkeiten?

Randbedingungen erfüllt:

$$N = 15 + 7 + 4 + 2 + 1 + 1 = 30$$

$$E = 15 \cdot 0 + 7 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 5 = 30$$

Gesucht: wahrscheinlichste Besetzung der Energieniveaus

Quantenmechanik:

jedes Molekül hat diskrete Energieniveaus

Bsp. Schwingung

Für große Systeme (große N) dominiert die Kombination mit den meisten Möglichkeiten komplett, d.h. die anderen Kombinationen können ignoriert werden!

2. Bsp.:
Ensemble aus 30 Molekülen, $N = 30$
Gesamtenergie $E = 30$

a) jedes habe Energie ϵ_1 – Wie viele Möglichkeiten?

$$W = \frac{30!}{0!30!0!0!0!...} = 1$$

b) je 10 haben Energie $\epsilon_0, \epsilon_1, \epsilon_2$

$$W = \frac{30!}{10!10!10!0!0!...} = \frac{2.65 \cdot 10^{32}}{4.78 \cdot 10^{19}} = 5.55 \cdot 10^{12}$$

c) Kombination mit den meisten Möglichkeiten?

$$W = \frac{30!}{15!7!4!2!1!1!...} = \frac{2.65 \cdot 10^{32}}{3.17 \cdot 10^{17}} = 8.4 \cdot 10^{14}$$

Gesucht: wahrscheinlichste Besetzung der Energieniveaus

Quantenmechanik:

jedes Molekül hat diskrete Energieniveaus

Bsp. Schwingung: Niveaus näherungsweise äquidistant (vgl. Sprossen einer Leiter)

2. Bsp.:
Ensemble aus 30 Molekülen, $N = 30$
Gesamtenergie $E = 30$

Kombination mit den meisten Möglichkeiten zeigt exponentiellen Abfall zu steigenden Energien!

$$n_i = \text{const} \cdot \exp(-\epsilon_i \cdot \beta)$$

exakter Beweis: suche Maximum von W unter Beachtung der Randbedingungen (Atkins, 4. Aufl., Kap. 16, Zusatzinformation 16.1)

Gesucht: wahrscheinlichste Besetzung der Energieniveaus

Zweiniveausystem,

$e_0 = 0, e_1 = 1 \text{ kJ/mol}$

Regel von Dulong-Petit:

molare Wärmekapazität vieler Festkörper bei Raumtemperatur:

$\approx 3 R \quad (\approx 25 \text{ J/mol K})$

experimentelle Werte (Atkins, 3. Aufl., Tabelle 2.12.)

Eisen	25.1 J/mol K	3.02 R
Kupfer	24.4 J/mol K	2.93 R
Silber	25.4 J/mol K	3.06 R
Gold	25.4 J/mol K	3.06 R
Phosphor (weiß)	23.8 J/mol K	2.86 R
Antimon	25.2 J/mol K	3.03 R

Einstein-Modell
des Festkörpers

Atome schwingen um ihre Gitterplätze mit einer festen Frequenz

NaCl