Höhere Mathematik II

für die Fachrichtungen Elektrotechnik und Informationstechnik

Lösungsvorschläge zum 1. Übungsblatt

Lösungen zu Aufgabe 1: a) Wir können die Determinante direkt berechnen indem wir die Regel von Sarrus benutzen.

$$\det(A) = 3 \cdot (-1) \cdot (-2) + (-2) \cdot (-1) \cdot 2 + 2 \cdot 1 \cdot 1 - 2 \cdot (-1) \cdot 2 - 1 \cdot (-1) \cdot 3 - (-2) \cdot 1 \cdot (-2) = 6 + 4 + 2 + 4 + 3 - 4 = 15.$$

Alternativ wissen wir, dass sich die Determinante einer Matrix nicht verändert, wenn wir das Vielfache einer Spalte zu einer anderen Spalte bzw. das Vielfache einer Zeile zu einer anderen Zeile addieren. Auf diese Weise formen wir die Matrizen nun um und verwenden zudem den Entwicklungssatz.

$$\det(A) =_{[Z_3 \rightarrow Z_3 - 2Z_2]} \det \begin{pmatrix} 3 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} =_{[\text{Entw. nach } Z_3]} -3 \det \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = -3(3 \cdot (-1) - 1 \cdot 2) = 15.$$

b) Da $\det(A) \neq 0$, ist A regulär und das Gleichungssystem damit eindeutig lösbar. Die Cramersche Regel besagt, dass die Komponenten von $\vec{x}$ gegeben sind durch $x_i = \det(M_i) / \det(A)$, wobei die Matrix M_i aus der Matrix A entsteht, indem man die i -te Spalte von A durch $\vec{b}$ ersetzt. Konkret (für die Berechnung der Determinanten verwenden wir die Regel von Sarrus) heißt das:

$$x_1 = \frac{1}{15} \det \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \frac{2 + 2 + 0 + 2 + 1 - 0}{15} = \frac{7}{15},$$

$$x_2 = \frac{1}{15} \det \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \frac{0 - 2 + 2 + 0 + 3 + 2}{15} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3},$$

$$x_3 = \frac{1}{15} \det \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{-3 + 0 + 1 + 2 - 0 + 2}{15} = \frac{2}{15}.$$

Also: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 7/15 \\ 1/3 \\ 2/15 \end{pmatrix}.$

c) Indem man die Cramersche Regel für eine reguläre $n \times n$ -Matrix verwendet und direkt die Entwicklungsformel auf die j -te Spalte anwendet, erhält man

$$A_{j,k}^{-1} = \frac{(-1)^{j+k}}{\det(A)} \det \widehat{A}_{j,k},$$

wobei man die Matrix $\widehat{A}_{j,k}$ aus der Matrix A erhält, indem man die j -te Spalte und die k -te Zeile

streicht. Somit ist $\widehat{A}_{j,k}$ eine $(n-1) \times (n-1)$ -Matrix. Hier ergibt sich

$$A_{1,1}^{-1} = \frac{1}{15} \det \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \frac{3}{15}$$

$$A_{2,1}^{-1} = \frac{-1}{15} \det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = 0$$

$$A_{3,1}^{-1} = \frac{1}{15} \det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{3}{15}$$

$$A_{1,2}^{-1} = \frac{-1}{15} \det \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \frac{-2}{15}$$

$$A_{2,2}^{-1} = \frac{1}{15} \det \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = \frac{-10}{15}$$

$$A_{3,2}^{-1} = \frac{-1}{15} \det \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{-7}{15}$$

$$A_{1,3}^{-1} = \frac{1}{15} \det \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{4}{15}$$

$$A_{2,3}^{-1} = \frac{-1}{15} \det \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{5}{15}$$

$$A_{3,3}^{-1} = \frac{1}{15} \det \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{-1}{15}$$

Insgesamt:

$$A^{-1} = \frac{1}{15} \begin{pmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 0 & -10 & 5 \\ 3 & -7 & -1 \end{pmatrix}$$

Lösungen zu Aufgabe 2: Wir berechnen

$$B^T B = \begin{pmatrix} 14 & 14 \\ 14 & 98 \end{pmatrix}, \quad BB^T = \begin{pmatrix} 20 & 2 & 38 \\ 2 & 10 & -6 \\ 38 & -6 & 82 \end{pmatrix}.$$

Damit ist

$$\det(B^T B) = (14 \cdot 98) - (14 \cdot 14) = 1176.$$

Wir wissen, dass sich die Determinante einer Matrix nicht verändert, wenn wir das Vielfache einer Spalte zu einer anderen Spalte bzw. das Vielfache einer Zeile zu einer anderen Zeile addieren. Auf diese Weise formen wir die Matrizen nun um und verwenden zudem den Entwicklungssatz.

[Die verwendete Umformung steht jeweils in Klammern hinter dem Gleichheitszeichen.]

$$\begin{aligned} \det(BB^T) &=_{[Z_1 \rightarrow Z_1 - 10Z_2]} \det \begin{pmatrix} 0 & -98 & 98 \\ 2 & 10 & -6 \\ 38 & -6 & 82 \end{pmatrix} =_{[Z_3 \rightarrow Z_3 - 19Z_2]} \det \begin{pmatrix} 0 & -98 & 98 \\ 2 & 10 & -6 \\ 0 & -196 & 196 \end{pmatrix} \\ &=_{[\text{Entw. nach } S_1]} (-2) \cdot \det \begin{pmatrix} -98 & 98 \\ -196 & 196 \end{pmatrix} = 0. \end{aligned}$$

Für $n \times n$ -Matrizen gilt bekanntlich $\det(B) = \det(B^T)$ und wegen der Multiplikativität der Determinante damit $\det(BB^T) = \det(B^T B) = (\det(B))^2$. Hier ist aber $\det(BB^T) \neq \det(B^T B)$, was aber kein Widerspruch zur Vorlesung ist, da B keine $n \times n$ -Matrix ist.

Man kann $\det(BB^T) = 0$ auch ohne größere Rechnungen zeigen. Die Dimensionsformel für $n \times m$ -Matrizen A besagt

$$m = \text{Rang } A + \dim \text{Kern } A.$$

Damit: $3 = \text{Rang } B^T + \dim \text{Kern } B^T$. Wegen $\text{Rang } B^T \leq n = 2$ folgt $\dim \text{Kern } B^T \geq m - n = 1$. Sei $\vec{v} \neq 0$ ein Vektor aus Kern B^T . Dann ist $\vec{v}$ auch im Kern von BB^T , also hat BB^T einen nichttrivialen Kern und somit ist BB^T nicht regulär. Insgesamt: $\det(BB^T) = 0$.

Lösungen zu Aufgabe 3: Wir verwenden vollständige Induktion nach $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$.

IA: $n = 2$. Für alle $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ gilt

$$\det \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \end{pmatrix} = x_2 - x_1 = \prod_{1 \leq j < k \leq 2} (x_k - x_j).$$

IS: Sei $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ beliebig. Es gelte

$$\det \begin{pmatrix} 1 & y_1 & y_1^2 & \dots & y_1^{n-1} \\ 1 & y_2 & y_2^2 & \dots & y_2^{n-1} \\ 1 & y_3 & y_3^2 & \dots & y_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & y_n & y_n^2 & \dots & y_n^{n-1} \end{pmatrix} = \prod_{1 \leq j < k \leq n} (y_k - y_j) \quad \text{für alle } y_1, y_2, \dots, y_n \in \mathbb{R} \text{ (IV).}$$

Seien nun $x_1, x_2, \dots, x_{n+1} \in \mathbb{R}$. Zur Berechnung von

$$\det \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-1} & x_2^n \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \dots & x_3^{n-1} & x_3^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} & x_n^n \\ 1 & x_{n+1} & x_{n+1}^2 & \dots & x_{n+1}^{n-1} & x_{n+1}^n \end{pmatrix}$$

multiplizieren wir zuerst die vorletzte Spalte mit x_1 und ziehen diese von der letzten ab. Dann multiplizieren wir die vorvorletzte Spalte mit x_1 und ziehen diese von der vorletzten ab, usw. Die letzte Umformung besteht darin, das x_1 -fache der ersten Spalte von der zweiten Spalte abzuziehen.

Für $k = n+1, n, \dots, 3, 2$ ziehen wir also nacheinander das x_1 -fache der $(k-1)$ -ten Spalte von der k -ten Spalte ab. Im Anschluss entwickeln nach der ersten Zeile:

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-1} & x_2^n \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \dots & x_3^{n-1} & x_3^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} & x_n^n \\ 1 & x_{n+1} & x_{n+1}^2 & \dots & x_{n+1}^{n-1} & x_{n+1}^n \end{pmatrix} &= \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & x_2 - x_1 & x_2^2 - x_1 x_2 & \dots & x_2^n - x_1 x_2^{n-1} \\ 1 & x_3 - x_1 & x_3^2 - x_1 x_3 & \dots & x_3^n - x_1 x_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n - x_1 & x_n^2 - x_1 x_n & \dots & x_n^n - x_1 x_n^{n-1} \\ 1 & x_{n+1} - x_1 & x_{n+1}^2 - x_1 x_{n+1} & \dots & x_{n+1}^n - x_1 x_{n+1}^{n-1} \end{pmatrix} \\ &= 1 \cdot \det \begin{pmatrix} x_2 - x_1 & x_2(x_2 - x_1) & \dots & x_2^{n-1}(x_2 - x_1) \\ x_3 - x_1 & x_3(x_3 - x_1) & \dots & x_3^{n-1}(x_3 - x_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n - x_1 & x_n(x_n - x_1) & \dots & x_n^{n-1}(x_n - x_1) \\ x_{n+1} - x_1 & x_{n+1}(x_{n+1} - x_1) & \dots & x_{n+1}^{n-1}(x_{n+1} - x_1) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Nun können wir aus der ersten Zeile dieser Matrix den Faktor $(x_2 - x_1)$ herausziehen, aus der zweiten Zeile $(x_3 - x_1)$ etc. und aus der letzten Zeile den Faktor $(x_{n+1} - x_1)$:

$$= \underbrace{(x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \dots (x_n - x_1)(x_{n+1} - x_1)}_{= \prod_{1 < l \leq n+1} (x_l - x_1)} \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & x_2 & \dots & x_2^{n-1} \\ 1 & x_3 & \dots & x_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^{n-1} \\ 1 & x_{n+1} & \dots & x_{n+1}^{n-1} \end{pmatrix}.$$

Diese $n \times n$ Matrix ist wiederum eine Vandermonde-Matrix. Gemäß Induktionsvoraussetzung mit $y_m =$

x_{m+1} (für $m = 1, 2, \dots, n$) gilt

$$\det \begin{pmatrix} 1 & x_2 & \dots & x_2^{n-1} \\ 1 & x_3 & \dots & x_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^{n-1} \\ 1 & x_{n+1} & \dots & x_{n+1}^{n-1} \end{pmatrix} = \prod_{1 \leq j < k \leq n} (x_{k+1} - x_{j+1}) = \prod_{2 \leq i < l \leq n+1} (x_l - x_i).$$

Zusammen ergibt sich

$$\det \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-1} & x_2^n \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \dots & x_3^{n-1} & x_3^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} & x_n^n \\ 1 & x_{n+1} & x_{n+1}^2 & \dots & x_{n+1}^{n-1} & x_{n+1}^n \end{pmatrix} = \prod_{1 < l \leq n+1} (x_l - x_1) \cdot \prod_{2 \leq i < l \leq n+1} (x_l - x_i) = \prod_{1 \leq i < l \leq n+1} (x_l - x_i).$$

Lösungen zu Aufgabe 4: Wir wissen, dass sich die Determinante einer Matrix nicht verändert, wenn wir das Vielfache einer Spalte zu einer anderen Spalte bzw. das Vielfache einer Zeile zu einer anderen Zeile addieren. Auf diese Weise formen wir die Matrizen nun um und verwenden zudem den Entwicklungssatz. Wir starten mit Umformungen in Zeile 4, denn diese enthält die meisten Nullen.

[Die verwendete Umformung steht jeweils in Klammern hinter dem Gleichheitszeichen.]

$$\begin{aligned} \det(C) &=_{[S_3 \rightarrow S_3 + 2S_2]} \det \begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & -3 & 4 \\ -6 & 3 & 7 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} =_{[\text{Entw. nach } Z_4]} 1 \cdot \det \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 3 & -3 & 4 \\ -6 & 7 & 9 \end{pmatrix} \\ &=_{[S_1 \rightarrow S_1 + S_2]} \det \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & 4 \\ 1 & 7 & 9 \end{pmatrix} =_{[\text{Entw. nach } S_1]} 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = (2 \cdot 4) - (-3 \cdot 1) = 11 \end{aligned}$$

Lösungen zu Aufgabe 5: Wir wissen, dass sich die Determinante einer Matrix nicht verändert, wenn wir das Vielfache einer Spalte zu einer anderen Spalte bzw. das Vielfache einer Zeile zu einer anderen Zeile addieren. Auf diese Weise formen wir die Matrizen nun um und verwenden zudem den Entwicklungssatz.

[Die verwendete Umformung steht jeweils in Klammern hinter dem Gleichheitszeichen.]

$$\begin{aligned} \det(D) &=_{[Z_1 \rightarrow Z_1 - Z_4]} \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 & \alpha \end{pmatrix} =_{[S_4 \rightarrow S_4 - S_1]} \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & \alpha - 3 \end{pmatrix} \\ &=_{[\text{Entw. nach } Z_1]} 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \alpha - 3 \end{pmatrix} =_{[S_3 \rightarrow S_3 - S_1]} \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \alpha - 4 \end{pmatrix} \\ &=_{[\text{Entw. nach } Z_1]} 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & \alpha - 4 \end{pmatrix} = \alpha - 4 - 1 = \alpha - 5. \end{aligned}$$

Man sieht: $\det D \neq 0 \iff \alpha \neq 5$. Daher ist D genau für $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \{5\}$ regulär.

Lösungen zu Aufgabe 6: Für $\vec{x} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\vec{y} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ gilt

$$\vec{x} \times \vec{y} = \begin{pmatrix} -2 - 0 \\ 2 - 4 \\ 0 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix},$$

$$(\vec{x} \times \vec{y} | \vec{x}) = \left(\begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = -2 \cdot (-2) + (-2) \cdot 1 + (-2) \cdot 1 = 0$$

[dieses Ergebnis war zu erwarten, weil stets $\vec{x} \times \vec{y}$ sowohl orthogonal auf $\vec{x}$ als auch orthogonal auf $\vec{y}$ steht]. Für den Winkel ϕ , den die Vektoren $\vec{x}$ und $\vec{y}$ einschließen, gilt

$$\cos \phi = \frac{(\vec{x} | \vec{y})}{\|\vec{x}\| \|\vec{y}\|} = \frac{-2 \cdot 2 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot (-2)}{\sqrt{4 + 1 + 1} \cdot \sqrt{4 + 4}} = \frac{-6}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{8}} = -\sqrt{\frac{6}{8}} = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Hieraus folgt $\phi = \frac{5\pi}{6}$. Der Flächeninhalt des von $\vec{x}$ und $\vec{y}$ aufgespannten Parallelogramms lautet

$$\|\vec{x} \times \vec{y}\| = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{4 + 4 + 4} = 2\sqrt{3}.$$