

Name, Vorname:

Matrikelnummer:

E-Mail-Adresse:

Erreichte Punktzahl:

Note:

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	Σ
Punkte							
Max	7,5	7	10	9	10	9	52,5

Bitte beachten Sie:

- Zugelassene Hilfsmittel: Nicht-programmierbarer Taschenrechner, 1 Blatt (2 DIN A4 Seiten) eigene handschriftliche Notizen, ausgeteiltes Blatt (letzte Seite Ihrer Klausur) mit Konstanten-, Formel- und Integralsammlung.
- Maximal erreichbare Punktzahl: 52,5. Zum Bestehen hinreichende Punktzahl: 27.
- Eckige Klammern am Aufgabenende geben die maximal erreichbaren Punkte je (Teil-)Aufgabe an.
- Prüfungsdauer: 120 min.
- Schreiben Sie auf **jedes** Blatt Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer. Blätter ohne Namen und Matrikelnummer können bei der Korrektur **keine** Berücksichtigung finden!
- Legen Sie Ihren Studierendenausweis während der Klausur bereit.
- Es werden nur Aufgaben gewertet, die auf vom KIT bereitgestelltem Papier bearbeitet wurden. Sollte Ihnen das ausgehändigte Papier nicht ausreichen, wenden Sie sich an die Betreuer.
- Nur mit dokumentenechten Stiften schreiben (kein Bleistift!).
- Versehen Sie jede Aufgabe, die Sie auf einem Zusatzblatt (weiter) bearbeiten, mit einem Hinweis. Sie erleichtern damit die Korrektur.
- Begründungen, Erklärungen und ähnliches können in Stichworten verfasst werden.
- Sofern nicht anders angegeben, ist der Rechenweg nachvollziehbar darzustellen.
- Bei allen Rechnungen ist das Ergebnis bis auf die zweite signifikante Nachkommastelle anzugeben.
- Skizzen sind grundsätzlich mit den notwendigen Beschriftungen zu versehen.

1. Optik [7,5P]

Teil 1: Polarisation

- a) Eine p-polarisierte elektromagnetische Welle trifft entsprechend der Abbildung 1 unter dem Winkel θ_1 zum Lot auf eine Grenzfläche und wird unter dem Winkel θ_2 gebrochen. Begründen Sie rechnerisch, ob die Brechung vom optisch dichteren ins optisch dünnere oder vom optisch dünneren ins optisch dichtere Medium stattfindet! [1P]




Abbildung 1: Brechung einer p-polarisierten elektromagnetischen Welle an einer Grenzfläche

- b) Skizzieren Sie qualitativ den Reflexions- und Transmissionsgrad der elektromagnetischen Welle aus Abbildung 1 beim Übergang von dem Medium n_1 in das Medium n_2 in Abhängigkeit des Einfallswinkels und kennzeichnen Sie wichtige Winkel! [1,5P]





Abbildung 2: Reflexionskoeffizient und Transmissionskoeffizient

Fortsetzung auf Rückseite!

Teil 2: Optische Abbildung

- c) Ein Gegenstand liegt linksseitig einer dünnen plankonvexen Linse aus Flintglas ($n_{Linse} = 1,7$) mit dem Radius $R = 2,1$ cm. Berechnen Sie die Brennweite der Linse für den Fall, dass sich das Linsensystem in Luft befindet! [1P]
- d) Ändert sich die Brennweite, wenn sich das Linsensystem in Wasser befindet ($n_{Wasser} = 1,33$)? Wenn ja, berechnen Sie diese, wenn nein, begründen Sie! [1 P]
- e) Die Linse befindet sich nun in Luft. Zeichnen Sie den Strahlengang für einen Gegenstand, der sich 4,5 cm links der Linse befindet, und beschriften Sie die Zeichnung! Bestimmen Sie Bildweite und Vergrößerungsmaßstab der Linse aus der Zeichnung! [2P]



- f) Benennen und erklären Sie einen möglichen Linsenfehler! Wie lässt sich dieser beheben? [1P]

Name:

Matrikel-Nr.:



Name:

Matrikel-Nr.:

2. Wellenfunktionen [7P]

- a) Ein Teilchen der Masse m sei durch die Wellenfunktion $\psi(x,t) = A \cdot e^{-\omega[(mx^2/\hbar)+it]}$ mit den positiven, reellen A und ω beschrieben. Setzen Sie diese Wellenfunktion in die Schrödingergleichung ein berechnen Sie das Potential $V(x)$, für welches die Schrödingergleichung gelöst werden kann! [2,5P]

Die Wellenfunktion eines Systems zur Zeit $t = 0$ sei durch $\psi(x,t = 0) = e^{-\frac{x^2}{2a^2}}$ gegeben. Die folgenden Teilaufgaben beziehen sich auf diese Wellenfunktion. Hinweis: Beachten Sie die Formelsammlung am Ende der Klausur!

- b) Normieren Sie diese Wellenfunktion! [1P]

- c) Berechnen Sie die Ortsunschärfe $\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$ für die normierte Wellenfunktion! [1,5P]

- d) Berechnen Sie die Impulsunschärfe $\Delta p = \sqrt{\langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2}$ für die normierte Wellenfunktion! [1,5P]

- e) Wie lautet die Heisenberg'sche Unschärferelation? Überprüfen Sie deren Richtigkeit für diese Wellenfunktion! [0,5P]



Name:

Matrikel-Nr.:



Name:

Matrikel-Nr.:



3. Asymmetrischer Endlicher Potentialtopf [10P]

Gegeben sei folgendes Potential $V(x)$:

$$V(x) = \begin{cases} V_1 & \text{für } x < 0 \text{ (Bereich 1)} \\ 0 & \text{für } 0 \leq x \leq d \text{ (Bereich 2)} \\ V_2 & \text{für } x > d \text{ (Bereich 3)} \end{cases}$$

mit $V_2 > V_1 > 0$ und $d > 0$.

- Skizzieren Sie das gegebene Potential $V(x)$! Achten Sie auf eine korrekte Achsenbeschriftung! [0,5P]
- Skizzieren Sie im selben Diagramm die Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichten für Elektronen der niedrigsten zwei gebundenen Zustände mit Eigenenergien $W < V_1$! Zeichnen Sie jeweils eine gestrichelte Linie ein, welche eine Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte von 0 markiert! [1,5P]
- Worin unterscheiden sich die Wellenfunktionen von Elektronen in Eigenzuständen mit Energien $W < V_1$ und $W > V_2$ bezüglich ihrer Anzahl und ihrer Form? Welche Besonderheit ergibt sich im Vergleich zu einem unendlichen Potentialtopf für die gebundenen Zustände innerhalb der Barriere und wie bezeichnet man den resultierenden Effekt? Nennen Sie ein Beispiel aus der Praxis, wo dieser Effekt zum Einsatz kommt! [2P]

Für die Wellenfunktionen $\psi_i(x)$ in den drei Bereichen ($i = 1,2,3$) ergeben sich folgende *allgemeine Lösungsansätze*:

$$\text{Bereich 1: } \psi_1(x) = Ae^{jk_1x} + Be^{-jk_1x}$$

$$\text{Bereich 2: } \psi_2(x) = Ce^{jk_2x} + De^{-jk_2x}$$

$$\text{Bereich 3: } \psi_3(x) = Ee^{jk_3x} + Fe^{-jk_3x}$$

- Geben Sie die Randbedingungen für die Lösungen des Problems an! Keine Rechnung! [1P]

Fortsetzung auf Rückseite!

-
- e) Bestimmen Sie die Wellenzahlen k_i ($i = 1, 2, 3$) in den Bereichen 1 bis 3! [1,5P]
- f) Wir betrachten nun lediglich Elektronen in Eigenzuständen mit Energien $W < V_1$. Setzen Sie die Wellenzahlen aus Aufgabe e) in die *allgemeinen Lösungsansätze* ein! Wie ändern sich dadurch diese Lösungsansätze? [1,5P]
- g) Das Potential im Bereich 1 sei nun $V(x < 0) = 0$. Damit betrachten wir eine Potentialstufe der Höhe V_2 an der Stelle $x = d$. Die Eigenenergie eines von links auf die Potentialstufe eintreffendes Elektrons liege $0,5eV$ unterhalb von V_2 . Wie weit innerhalb der Barriere sinkt die Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte dieses Elektrons auf 50% seiner Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte am Rand der Stufe ($x = d$)? [2P]

Name:

Matrikel-Nr.:



Name:

Matrikel-Nr.:

4. Kristalle [9P]

- a) Wie viele Atome befinden sich in der Einheitszelle eines kubisch-flächenzentrierten (fcc) Kristallgitters mit zweiatomiger Basis? Zeichnen Sie die Gitterpunkte inklusive Basis eines solchen Kristallgitters in die vorgegebene Zeichnung ein! Die Basis besteht aus zwei Atomen an den Stellen $\{(0,0,0), (\frac{1}{4}a, \frac{1}{4}a, \frac{1}{4}a)\}$. [1,5P]




Abbildung 3: Vorlage für fcc-Gitter

- b) Wir betrachten einen Halbleiter entsprechend Aufgabe a), der in einem fcc-Gitter (mit Gitterkonstante a) mit zweiatomiger Basis kristallisiert. Er hat eine Dichte von $\rho = 2,336 \frac{g}{cm^3}$ und eine molare Masse von $M = 28,09 \frac{g}{mol}$. Berechnen Sie die Gitterkonstante a ! [1P]

Das Leitungsband des Halbleiters lässt sich im k -Raum im Bereich $[-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}]$ in der Kristallrichtung (100) (zwischen Γ - und X-Punkt) näherungsweise durch das Potential $W_L(k) = \Delta W(2,5 - \sin(0,5ka))$ beschreiben. Das Valenzband wird durch das Potential $W_V(k) = -2\Delta W(1 + 1,19 \sin(0,5ka))$ beschrieben. ΔW sei $1eV$.

- c) Zeichnen Sie das Leitungsband $W_L(k)$ und das Valenzband $W_V(k)$ in das Diagramm! [1P]

Fortsetzung auf Rückseite!




Abbildung 4: Potentiale für Leitungsband $W_L(k)$ und Valenzband $W_V(k)$

- d) Handelt es sich um einen indirekten oder direkten Halbleiter? Begründen Sie! [1P]
- e) Berechnen Sie die Bandlücke des Halbleiters! [1,5P]
- f) Bestimmen Sie Gruppengeschwindigkeit v_g und effektive Masse m_{eff} eines Elektrons im Leitungsband in Abhängigkeit von a und ΔW ! Bestimmen Sie dazu zunächst die partiellen Ableitungen $\frac{\partial W_L(k)}{\partial k}$ und $\frac{\partial^2 W_L(k)}{\partial k^2}$! [2P]
- g) Beschreiben Sie knapp und qualitativ, wie sich ein angelegtes elektrisches Feld (d.h. eine konstante Kraft) auf das Verhalten des in Teilaufgabe f) beschriebenen Elektrons auswirkt! Warum lässt sich diese Auswirkung durch eine einfache Strommessung nicht überprüfen? [1P]

Name:

Matrikel-Nr.:



Name:

Matrikel-Nr.:



5. Zustandsdichte und Fermi-Dirac-Verteilung [10P]

- a) Beschreiben Sie, was man unter dem Begriff „Zustandsdichte“ versteht! Wie lautet die Einheit der Zustandsdichte im 1D-Fall? [1P]
- b) Leiten Sie die Zustandsdichte $g_{1D}(W)$ für einen eindimensionalen Quantendraht der Länge L her! Die parabolische Näherung für das Leitungsband sei gültig. Gehen Sie von einem eindimensionalen k -Raum aus! [3P]
- c) Die Leitungsbandkante W_L in einem zweidimensionalen Halbleiter liege bei 1 eV. Die Zustandsdichte im Leitungsband eines zweidimensionalen Halbleiters lautet

$$g(W)_{2D} = \frac{m}{\pi\hbar^2} \sum_n \theta(W - W_n) \quad n = 1, 2, 3, 4, \dots$$

mit

$$W_n = n^2 \cdot W_L$$

und

$$\theta(W - W_n) = \begin{cases} 1 & \text{wenn } W - W_n \geq 0 \\ 0 & \text{wenn } W - W_n < 0 \end{cases}$$

Wir betrachten nun den Energiebereich zwischen $5,49 \cdot W_L$ und $5,51 \cdot W_L$. Welche Fläche muss der Halbleiter haben, damit es im genannten Energiebereich mindestens $1,69 \cdot 10^{11}$ Zustände gibt? Es gelte $m = m_e$. [3P]

- d) Wie lautet die Formel für die Fermi-Dirac-Verteilung $f_{FD}(W, T)$ und was beschreibt diese? [1P]
- e) Für welche Bedingung kann statt der Fermi-Dirac-Funktion die Boltzmann-Verteilung verwendet werden? [0,5P]

Fortsetzung auf Rückseite!

f) Wir gehen nun von einem intrinsischen dreidimensionalen Halbleiter mit gleichen effektiven Massen für Elektronen und Löcher bei Raumtemperatur aus. Zeichnen Sie folgende Zusammenhänge in die dafür vorgesehenen Schaubilder in Abbildung 8: [1,5P]

- Energie über der Zustandsdichte für Elektronen und Löcher $g_L(W)$ und $g_V(W)$
- Energie über Fermi-Dirac-Verteilung $f_{FD}(W)$
- Energie über Ladungsträgerdichte $n(W)$ und $p(W)$




Abbildung 5: Energie über Zustandsdichte, Fermi-Dirac-Verteilung und Ladungsträgerdichte

Name:

Matrikel-Nr.:



Name:

Matrikel-Nr.:

6. Intrinsische und dotierte Halbleiter [9P]

- a) Berechnen Sie die intrinsische Ladungsträgerkonzentration von Germanium bei einer Temperatur von 300K . Die effektiven Zustandsdichten für das Leitungs- und Valenzband sind $N_L = 1,5 \cdot 10^{19}\text{cm}^{-3}$ und $N_V = 6 \cdot 10^{18}\text{cm}^{-3}$ (Hinweis: Germanium absorbiert Licht bis zu einer Wellenlänge von $\lambda = 1,88\mu\text{m}$). [1,5P]
- b) Nennen Sie zwei Dotierelemente, die prinzipiell als Akzeptoren in den Germaniumkristall eingebracht werden können! Wie nennt man diese Form der Dotierung?[1P]
- c) In Abbildung 10 sind Lochkonzentrationen p in Abhängigkeit der Temperatur abgebildet. Ordnen Sie die beiden Kurven einem intrinsischen und einem dotierten Halbleiter zu und unterteilen Sie den Verlauf in drei signifikante Bereiche! Beschriften Sie diese! [2,5P]




Abbildung 6: Lochkonzentrationen im Valenzband in Abhängigkeit von der Temperatur

Fortsetzung auf Rückseite!

-
- d) Betrachten Sie nun einen mit Akzeptoren dotierten Germanium-Kristall mit einer Akzeptorkonzentration von $n_A = 10^{15} \text{cm}^{-3}$ bei einer Temperatur von 300K . Alle Akzeptoren seien ionisiert. Bestimmen Sie die Loch- und Elektronkonzentrationen in einem solchen Kristall! [1,5P]
- e) Die Ionisierungsenergie des Akzeptors im Germanium liege 10meV oberhalb des Valenzbandes. Berechnen Sie die Lage des Fermi-niveaus W_F relativ zum Akzeptor-niveau W_A ($W_F - W_A$) und zum Valenzband W_V ($W_F - W_V$) und geben Sie diese jeweils in eV an! [1,5P]
- f) Berechnen Sie die Leitfähigkeit des dotierten Halbleiters! Die Beweglichkeit der Löcher und Elektronen ist jeweils $\mu_p = 10^3 \frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}}$ und $\mu_e = 4 \cdot 10^3 \frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}}$. [1P]

Name:

Matrikel-Nr.:



Name:

Matrikel-Nr.:



Konstanten

Planck'sches Wirkungsquantum	h	$= 6,63 \cdot 10^{-34}$	Js
	\hbar	$= \frac{h}{2\pi} = 1,05 \cdot 10^{-34}$	Js
Avogadro-Konstante	N_A	$= 6,02 \cdot 10^{23}$	mol ⁻¹
Bohr'scher Radius	a_0	$= 5,29 \cdot 10^{-11}$	m
Elementarladung	e	$= 1,6 \cdot 10^{-19}$	As
Atomare Masseneinheit	u	$= 1,66 \cdot 10^{-27}$	kg
Elektronenmasse	m_e	$= 9,11 \cdot 10^{-31}$	kg
Protonenmasse	m_p	$= 1,67 \cdot 10^{-27}$	kg
Neutronenmasse	m_n	$= 1,67 \cdot 10^{-27}$	kg
Dielektrizitätskonstante	ϵ_0	$= 8,85 \cdot 10^{-12}$	As/Vm
Permeabilitätskonstante	μ_0	$= 4\pi \cdot 10^{-7}$	Vs/Am
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum	c	$= 3,0 \cdot 10^8$	m/s
Boltzmann-Konstante	k_B	$= 1,38 \cdot 10^{-23}$	J/K
Kreiszahl	π	$= 3,14$	
Euler'sche Zahl	e	$= 2,72$	
Imaginäre Einheit	j	$= \sqrt{-1}$	

Konversion von Einheiten

Atomare Masseneinheit → Kilogramm	$1 u = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
Elektronenvolt → Joule	$1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

Fortsetzung auf Rückseite!

Formeln und Integrale

$$\exp(jkx) + \exp(-jkx) = 2 \cos(kx)$$

$$\exp(jkx) - \exp(-jkx) = 2j \sin(kx)$$

$$\int (\sin ax)^2 dx = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4a} \sin 2ax$$

$$\int (\cos ax)^2 dx = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4a} \sin 2ax$$

$$\int \sin ax \cos ax dx = \frac{1}{2a} (\sin ax)^2$$

$$\int x (\sin ax)^2 dx = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4a}x \sin 2ax - \frac{1}{8a^2} \cos 2ax$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} xe^{-ax^2} dx = 0$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2a} \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^3 e^{-ax^2} dx = 0$$

$$\int x^2 e^{ax} dx = e^{ax} \left(\frac{x^2}{a} - \frac{2x}{a^2} + \frac{2}{a^3} \right)$$

$$\int_0^{\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

$$\int_0^{\infty} xe^{-ax^2} dx = \frac{1}{2a}$$

$$\int_0^{\infty} x^2 e^{-ax^2} dx = \frac{1}{4a} \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

$$\int_0^{\infty} x^3 e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2a^2}$$

$$\int_0^{\infty} x^n e^{-ax} dx = \frac{n!}{a^{n+1}} \quad (a > 0, n = 0, 1, 2, \dots)$$

13 III. Hauptgruppe	14 IV. Hauptgruppe	15 V. Hauptgruppe
5 10,81 2,0 B Bor	6 12,01 2,5 C Kohlenstoff	7 14,007 3,0 N Stickstoff
13 26,98 1,5 Al Aluminium	14 28,09 1,8 Si Silicium	15 30,97 2,1 P Phosphor
31 69,72 1,6 Ga Gallium	32 72,59 1,8 Ge Germanium	33 74,92 2,0 As Arsen
49 114,82 1,7 In Indium	50 118,69 1,8 Sn Zinn	51 121,75 1,9 Sb Antimon
81 204,38 1,8 Tl Thallium	82 207,2 1,8 Pb Blei	83 208,98 1,9 Bi Bismut