10. Übungsblatt zu Algorithmen I im SoSe 2016

<https://crypto.iti.kit.edu/index.php?id=algo-bose16>
 {lisa.kohl,lukas.barth}@kit.edu

Aufgabe 1 (Minimale Spannbäume, 7 Punkte)

- a) Markieren Sie in dem folgenden Graphen einen Schnitt, mit dem das Gewicht des eingezeichneten Spannbaums reduziert werden kann oder zeigen Sie, dass ein solcher Schnitt nicht existiert. (*Hinweis:* Geben Sie in letzterem Fall nicht alle möglichen Schnitte an, sondern überlegen Sie eine geeignete Vorgehensweise.)

- b) Markieren Sie im folgenden Graphen einen Kreis, der die Kreiseigenschaft minimaler Spannbäume verletzt oder zeigen Sie, dass so ein Kreis nicht existiert. (*Hinweis:* Geben Sie in letzterem Fall nicht alle möglichen Kreise an, sondern überlegen Sie eine geeignete Vorgehensweise.)

- c) Sei G ein ungerichteter zusammenhängender Graph mit positiven Kantengewichten. Beweisen oder widerlegen Sie durch ein Gegenbeispiel, dass der minimale Spannbaum von G eindeutig ist, wenn alle Kantengewichte in G paarweise verschieden sind.
- d) Sei G wieder ein ungerichteter zusammenhängender Graph mit positiven Kantengewichten. Beweisen oder widerlegen Sie die Umkehrung von c). In anderen Worten, beweisen oder widerlegen Sie durch ein Gegenbeispiel, dass alle Kantengewichte in G paarweise verschieden sind, wenn der minimale Spannbaum eindeutig ist.

Aufgabe 2 (Jarník-Prims und Kruskals Algorithmus, 4 Punkte)

Berechnen Sie je einen Minimum Spanning Tree (MST) des angegebenen Graphen mit dem Algorithmus von Jarník-Prim und dem Algorithmus von Kruskal. Geben Sie jeweils die Kanten des MST in der Reihenfolge an, in der sie der Algorithmus auswählt. Verwenden Sie Knoten A als Startknoten von Jarník-Prim und wählen Sie in beiden Algorithmen bei gleichen Kantengewichten diejenige Kanten mit alphabetisch kleinstem Endknoten aus.

Aufgabe 3 (Zweitminimalste Spannäume, 8 Punkte)

Sei $G = (V, E)$ mit $|E| \geq |V|$ ein ungerichteter zusammenhängender Graph mit positiven Kantengewichten $c(e) \in \mathbb{R}_{>0}$. Wir betrachten nun zweitminimalste Spannäume. Sei T ein minimaler Spannbaum. Dann ist ein *zweitminimalster Spannbaum* definiert als ein aufspannender Baum $T^* \neq T$ für den $\sum_{e \in T^*} c(e)$ minimal wird. (Falls es mehrere minimale Spannäume gibt, ist also ein zweitminimalster Spannbaum auch ein minimaler Spannbaum.)

- a) Beweisen oder widerlegen Sie durch ein Gegenbeispiel, dass der zweitminimalste Spannbaum von G eindeutig ist, wenn alle Kantengewichte in G paarweise verschieden sind.
- b) Sei T ein **minimaler** Spannbaum von G . Beweisen Sie, dass es Kanten $(u, v) \in T$ und $(x, y) \notin T$ gibt, sodass $T - \{(u, v)\} \cup \{(x, y)\}$ ein zweitminimalster Spannbaum von G ist.
- c) Sei T ein **beliebiger** Spannbaum von G und für zwei Knoten $u, v \in V$ sei $\max[u, v] \in E$ die Kante mit maximalem Gewicht auf dem eindeutigen Pfad zwischen u und v in T . Beschreiben Sie einen $\mathcal{O}(|V|^2)$ -Algorithmus, der gegeben T für alle u, v den Wert $\max[u, v]$ berechnet und beweisen Sie die Laufzeit.
- d) Geben Sie einen effizienten Algorithmus, der den zweitminimalsten Spannbaum von G berechnet. Begründen Sie die Korrektheit Ihres Algorithmus.

Ausgabe: Mittwoch, 29.06.2016

Abgabe: Freitag, 08.07.2016, 12:45 im Briefkasten im Untergeschoss von Gebäude 50.34

Deckblatt Übungsblatt 10

Algorithmen I

A1	A2	A3	Σ
-----------	-----------	-----------	----------

Tutoriumsnummer:

Name

Matrikelnummer

Unterschrift

_____	_____	_____
_____	_____	_____

Mit unseren Unterschriften bestätigen wir, dass die Aufgaben von den Unterzeichnern eigenständig gelöst worden sind.

Hinweis: Das Übungsblatt darf in Gruppen von bis zu zwei Personen bearbeitet werden. Beide Personen müssen demselben Tutorium zugeteilt sein. Möchte jemand seine Abgaben-Gruppe innerhalb des Semesters wechseln, so ist dies im Voraus mit dem Tutor abzusprechen. **Bitte tragen Sie in das obere Quadrat groß die Nummer Ihres Tutoriums ein.** Die Lösung des Übungsblattes ist in jedem Fall mit diesem Deckblatt abzugeben.