

Robotik I: Einführung in die Robotik

Übung 3: Inverse Kinematik und Dynamik

Tamim Asfour

Institut für Anthropomatik und Robotik

KIT-Fakultät für Informatik, Institut für Anthropomatik und Robotik (IAR)
Hochperformante Humanoide Technologien (H²T)




Aufgabe 1: Differentielle Inverse Kinematik

- SCARA-Roboter mit
 - Einem Translationsgelenk d_1
 - Zwei Rotationsgelenken θ_2, θ_3
 - Konfiguration $\mathbf{q} = (d_1, \theta_2, \theta_3)$



von Jo Teichmann
 [Public domain], via
 Wikimedia Commons



von Nikola Smolenski
 [CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via
 Wikimedia Commons

- Vorwärtskinematik (nur Position):

$$f(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} -500 \cdot \sin(\theta_2) \cdot \cos(\theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) \\ 500 \cdot \cos(\theta_2) \cdot \cos(\theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) \cdot \sin(\theta_3) + 100 + 500 \cdot \cos(\theta_2) \\ d_1 \end{pmatrix}$$

End-Effektor Geschwindigkeiten

- Die Jacobi-Matrix setzt kartesische End-Effektor-Geschwindigkeiten in Relation zu Gelenkwinkelgeschwindigkeiten

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = J_f(\boldsymbol{\theta}(t)) \cdot \dot{\boldsymbol{\theta}}(t)$$

- Die folgenden Probleme können mit dieser Beziehung gelöst werden
 1. Gegeben eine kartesische End-Effektor-Geschwindigkeit, welche Gelenkwinkelgeschwindigkeiten sind notwendig, um diese zu realisieren?
 2. Gegeben die Gelenkwinkelgeschwindigkeiten, welche kartesische End-Effektor-Geschwindigkeit wird damit realisiert?

Aufgabe 1: Inverse Kinematik

- Vorwärtskinematik (nur Position):

$$f(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} -500 \cdot \sin(\theta_2) \cdot \cos(\theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) \\ 500 \cdot \cos(\theta_2) \cdot \cos(\theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) \cdot \sin(\theta_3) + 100 + 500 \cdot \cos(\theta_2) \\ d_1 \end{pmatrix}$$

- Inverse Kinematik

$$\dot{\mathbf{q}} = J^{-1}(\mathbf{q}) \cdot \dot{\mathbf{x}}$$

- Teilaufgaben:

- 1.1: Bestimmen Sie die inverse Jacobi-Matrix $J^{-1}(\mathbf{q})$.
- 1.2: Bestimmen Sie $\dot{\mathbf{q}}$ bei gegebenem \mathbf{q} und $\dot{\mathbf{x}}$.
- 1.3: In welchen Stellungen treten Singularitäten auf?

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$f(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -500 \cdot \sin(\theta_2) \cdot \cos(\theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) \\ 500 \cdot \cos(\theta_2) \cdot \cos(\theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) \cdot \sin(\theta_3) + 100 + 500 \cdot \cos(\theta_2) \\ d_1 \end{pmatrix}$$

■ Jacobi-Matrix:

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$f(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -500 \cdot \sin(\theta_2) \cdot \cos(\theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) \\ 500 \cdot \cos(\theta_2) \cdot \cos(\theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) \cdot \sin(\theta_3) + 100 + 500 \cdot \cos(\theta_2) \\ d_1 \end{pmatrix}$$

■ Jacobi-Matrix:

$$J(\mathbf{q}) = \left(\frac{\partial f}{\partial d_1}, \frac{\partial f}{\partial \theta_2}, \frac{\partial f}{\partial \theta_3} \right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial d_1} =$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$f(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -500 \cdot \sin(\theta_2) \cdot \cos(\theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) \\ 500 \cdot \cos(\theta_2) \cdot \cos(\theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) \cdot \sin(\theta_3) + 100 + 500 \cdot \cos(\theta_2) \\ d_1 \end{pmatrix}$$

■ Jacobi-Matrix:

$$J(\mathbf{q}) = \left(\frac{\partial f}{\partial d_1}, \frac{\partial f}{\partial \theta_2}, \frac{\partial f}{\partial \theta_3} \right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial d_1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{\partial}{\partial d_1}(d_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

- Ausdruck für x vereinfachen

$$x = -500 \cdot \sin(\theta_2) \cdot \cos(\theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2)$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

- Ausdruck für x vereinfachen

$$x = -500 \cdot \sin(\theta_2) \cdot \cos(\theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2)$$

$$x = -500 \cdot (\sin(\theta_2) \cdot \cos(\theta_3) + \cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_3)) - 500 \cdot \sin(\theta_2)$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

- Ausdruck für x vereinfachen

$$x = -500 \cdot \sin(\theta_2) \cdot \cos(\theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2)$$

$$x = -500 \cdot (\sin(\theta_2) \cdot \cos(\theta_3) + \cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_3)) - 500 \cdot \sin(\theta_2)$$

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta\end{aligned}$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

- Ausdruck für x vereinfachen

$$x = -500 \cdot \sin(\theta_2) \cdot \cos(\theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2)$$

$$x = -500 \cdot (\sin(\theta_2) \cdot \cos(\theta_3) + \cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_3)) - 500 \cdot \sin(\theta_2)$$

$$\begin{aligned} \sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta \end{aligned}$$

$$x = -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2)$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

- Ausdruck für y vereinfachen

$$y = 500 \cdot \cos(\theta_2) \cdot \cos(\theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) \cdot \sin(\theta_3) + 100 + 500 \cdot \cos(\theta_2)$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

- Ausdruck für y vereinfachen

$$y = 500 \cdot \cos(\theta_2) \cdot \cos(\theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) \cdot \sin(\theta_3) + 100 + 500 \cdot \cos(\theta_2)$$

$$y = 500 \cdot (\cos(\theta_2) \cdot \cos(\theta_3) - \sin(\theta_2) \cdot \sin(\theta_3)) + 100 + 500 \cdot \cos(\theta_2)$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

- Ausdruck für y vereinfachen

$$y = 500 \cdot \cos(\theta_2) \cdot \cos(\theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) \cdot \sin(\theta_3) + 100 + 500 \cdot \cos(\theta_2)$$

$$y = 500 \cdot (\cos(\theta_2) \cdot \cos(\theta_3) - \sin(\theta_2) \cdot \sin(\theta_3)) + 100 + 500 \cdot \cos(\theta_2)$$

$$\begin{aligned} \sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta \end{aligned}$$

$$y = 500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) + 100 + 500 \cdot \cos(\theta_2)$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$x = -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2)$$

$$\frac{\partial x}{\partial \theta_2} =$$

$$y = 500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) + 100 + 500 \cdot \cos(\theta_2)$$

$$\frac{\partial y}{\partial \theta_2} =$$

$$z = d_1 \quad \frac{\partial z}{\partial \theta_2} =$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$x = -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2)$$

$$\frac{\partial x}{\partial \theta_2} = -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2)$$

$$y = 500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) + 100 + 500 \cdot \cos(\theta_2)$$

$$\frac{\partial y}{\partial \theta_2} = -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2)$$

$$z = d_1 \quad \frac{\partial z}{\partial \theta_2} = 0$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$x = -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2)$$

$$\frac{\partial x}{\partial \theta_3} =$$

$$y = 500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) + 100 + 500 \cdot \cos(\theta_2)$$

$$\frac{\partial y}{\partial \theta_3} =$$

$$z = d_1 \quad \frac{\partial z}{\partial \theta_3} =$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$x = -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2)$$

$$\frac{\partial x}{\partial \theta_3} = -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3)$$

$$y = 500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) + 100 + 500 \cdot \cos(\theta_2)$$

$$\frac{\partial y}{\partial \theta_3} = -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3)$$

$$z = d_1 \quad \frac{\partial z}{\partial \theta_3} = 0$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

■ Jacobi-Matrix:

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

■ Gesucht:

$$J^{-1}(\mathbf{q}) = ?$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

■ Matrix:

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

■ Invertieren:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} ei - fh & ch - bi & bf - ce \\ fg - di & ai - cg & cd - af \\ dh - eg & bg - ah & ae - bd \end{pmatrix}$$

■ Determinante (Regel von Sarrus):

$$\det A = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det J(\mathbf{q}) = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det J(\mathbf{q}) = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$$

$$= 0 +$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det J(\mathbf{q}) = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$$

$$= 0 + (-500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2)) \cdot (-500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3))$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det J(\mathbf{q}) = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$$

$$= 0 + (-500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2)) \cdot (-500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3)) + 0$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det J(\mathbf{q}) = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$$

$$= 0 + (-500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2)) \cdot (-500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3)) + 0$$

$$- (-500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3)) \cdot (-500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2))$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det J(\mathbf{q}) = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$$

$$= 0 + (-500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2)) \cdot (-500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3)) + 0$$

$$- (-500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3)) \cdot (-500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2)) - 0$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det J(\mathbf{q}) = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$$

$$= 0 + (-500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2)) \cdot (-500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3)) + 0$$

$$- (-500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3)) \cdot (-500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2)) - 0 - 0$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det J(\mathbf{q}) = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$$

$$= (-500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2)) \cdot (-500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3)) \\ - (-500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3)) \cdot (-500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2))$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det J(\mathbf{q}) = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$$

$$= (-500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2)) \cdot (-500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3)) \\ - (-500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3)) \cdot (-500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2))$$

$$= (-500) \cdot (-500) \cdot \begin{pmatrix} (\cos(\theta_2 + \theta_3) + \cos(\theta_2)) \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ -(\sin(\theta_2 + \theta_3) + \sin(\theta_2)) \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \end{pmatrix}$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det J(\mathbf{q}) = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$$

$$= (-500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2)) \cdot (-500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3)) \\ - (-500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3)) \cdot (-500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2))$$

$$= (-500) \cdot (-500) \cdot \begin{pmatrix} (\cos(\theta_2 + \theta_3) + \cos(\theta_2)) \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ -(\sin(\theta_2 + \theta_3) + \sin(\theta_2)) \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \end{pmatrix}$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det J(\mathbf{q}) = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$$

$$= (-500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2)) \cdot (-500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3)) \\ - (-500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3)) \cdot (-500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2))$$

$$= (-500) \cdot (-500) \cdot \begin{pmatrix} (\cos(\theta_2 + \theta_3) + \cos(\theta_2)) \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ -(\sin(\theta_2 + \theta_3) + \sin(\theta_2)) \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \end{pmatrix}$$

$$= 500^2 \cdot (\cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - \sin(\theta_2) \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3))$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det J(\mathbf{q}) = 500^2 \cdot (\cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - \sin(\theta_2) \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3))$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det J(\mathbf{q}) = 500^2 \cdot (\cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - \sin(\theta_2) \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3))$$

$$\begin{aligned} \sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta \end{aligned}$$

$$\det J(\mathbf{q}) = 500^2 \cdot \begin{pmatrix} \cos(\theta_2) \cdot (\sin \theta_2 \cos \theta_3 + \cos \theta_2 \sin \theta_3) \\ -\sin(\theta_2) \cdot (\cos \theta_2 \cos \theta_3 - \sin \theta_2 \sin \theta_3) \end{pmatrix}$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det J(\mathbf{q}) = 500^2 \cdot (\cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - \sin(\theta_2) \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3))$$

$$\begin{aligned} \sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta \end{aligned}$$

$$\det J(\mathbf{q}) = 500^2 \cdot \begin{pmatrix} \cos(\theta_2) \cdot (\sin \theta_2 \cos \theta_3 + \cos \theta_2 \sin \theta_3) \\ -\sin(\theta_2) \cdot (\cos \theta_2 \cos \theta_3 - \sin \theta_2 \sin \theta_3) \end{pmatrix}$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det J(\mathbf{q}) = 500^2 \cdot (\cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - \sin(\theta_2) \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3))$$

$$\begin{aligned} \sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta \end{aligned}$$

$$\det J(\mathbf{q}) = 500^2 \cdot \begin{pmatrix} \cos(\theta_2) \cdot (\sin \theta_2 \cos \theta_3 + \cos \theta_2 \sin \theta_3) \\ -\sin(\theta_2) \cdot (\cos \theta_2 \cos \theta_3 - \sin \theta_2 \sin \theta_3) \end{pmatrix}$$

$$= 500^2 \cdot (\cos^2 \theta_2 \sin \theta_3 + \sin^2 \theta_2 \sin \theta_3)$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det J(\mathbf{q}) = 500^2 \cdot (\cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - \sin(\theta_2) \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3))$$

$$\begin{aligned} \sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta \end{aligned}$$

$$\det J(\mathbf{q}) = 500^2 \cdot \begin{pmatrix} \cos(\theta_2) \cdot (\sin \theta_2 \cos \theta_3 + \cos \theta_2 \sin \theta_3) \\ -\sin(\theta_2) \cdot (\cos \theta_2 \cos \theta_3 - \sin \theta_2 \sin \theta_3) \end{pmatrix}$$

$$= 500^2 \cdot (\cos^2 \theta_2 \sin \theta_3 + \sin^2 \theta_2 \sin \theta_3)$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det J(\mathbf{q}) = 500^2 \cdot (\cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - \sin(\theta_2) \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3))$$

$$\begin{aligned} \sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta \end{aligned}$$

$$\det J(\mathbf{q}) = 500^2 \cdot \begin{pmatrix} \cos(\theta_2) \cdot (\sin \theta_2 \cos \theta_3 + \cos \theta_2 \sin \theta_3) \\ -\sin(\theta_2) \cdot (\cos \theta_2 \cos \theta_3 - \sin \theta_2 \sin \theta_3) \end{pmatrix}$$

$$= 500^2 \cdot (\cos^2 \theta_2 \sin \theta_3 + \sin^2 \theta_2 \sin \theta_3)$$

$$= 500^2 \cdot \sin \theta_3 (\cos^2 \theta_2 + \sin^2 \theta_2)$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det J(\mathbf{q}) = 500^2 \cdot (\cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - \sin(\theta_2) \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3))$$

$$\begin{aligned} \sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta \end{aligned}$$

$$\det J(\mathbf{q}) = 500^2 \cdot \begin{pmatrix} \cos(\theta_2) \cdot (\sin \theta_2 \cos \theta_3 + \cos \theta_2 \sin \theta_3) \\ -\sin(\theta_2) \cdot (\cos \theta_2 \cos \theta_3 - \sin \theta_2 \sin \theta_3) \end{pmatrix}$$

$$= 500^2 \cdot (\cos^2 \theta_2 \sin \theta_3 + \sin^2 \theta_2 \sin \theta_3)$$

$$= 500^2 \cdot \sin \theta_3 (\cos^2 \theta_2 + \sin^2 \theta_2)$$

$$= 500^2 \cdot \sin \theta_3 \cdot 1$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det J(\mathbf{q}) = 500^2 \cdot \sin \theta_3$$

$$J(\mathbf{q})^{-1} = \frac{1}{\det J(\mathbf{q})} \begin{pmatrix} ei - fh & ch - bi & bf - ce \\ fg - di & ai - cg & cd - af \\ dh - eg & bg - ah & ae - bd \end{pmatrix}$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det J(\mathbf{q}) = 500^2 \cdot \sin \theta_3$$

$$J(\mathbf{q})^{-1} = \frac{1}{\det J(\mathbf{q})} \begin{pmatrix} ei - fh & ch - bi & bf - ce \\ fg - di & ai - cg & cd - af \\ dh - eg & bg - ah & ae - bd \end{pmatrix}$$

$$J(\mathbf{q})^{-1} = \frac{1}{500^2 \cdot \sin \theta_3} \begin{pmatrix} ei - fh & ch - bi & bf - ce \\ fg - di & ai - cg & cd - af \\ dh - eg & bg - ah & ae - bd \end{pmatrix}$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J(\mathbf{q})^{-1} = \frac{1}{500^2 \cdot \sin \theta_3} \begin{pmatrix} ei - fh & ch - bi & bf - ce \\ fg - di & ai - cg & cd - af \\ dh - eg & bg - ah & ae - bd \end{pmatrix}$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J(\mathbf{q})^{-1} = \frac{1}{500^2 \cdot \sin \theta_3} \begin{pmatrix} ei - fh & ch - bi & bf - ce \\ fg - di & ai - cg & cd - af \\ dh - eg & bg - ah & ae - bd \end{pmatrix}$$

$$ei - fh = 0$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J(\mathbf{q})^{-1} = \frac{1}{500^2 \cdot \sin \theta_3} \begin{pmatrix} 0 & ch - bi & bf - ce \\ fg - di & ai - cg & cd - af \\ dh - eg & bg - ah & ae - bd \end{pmatrix}$$

$$ei - fh = 0$$

$$ch - bi = 0$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J(\mathbf{q})^{-1} = \frac{1}{500^2 \cdot \sin \theta_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & bf - ce \\ fg - di & ai - cg & cd - af \\ dh - eg & bg - ah & ae - bd \end{pmatrix}$$

$$ei - fh = 0$$

$$ch - bi = 0$$

$$cd - af = 0$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J(\mathbf{q})^{-1} = \frac{1}{500^2 \cdot \sin \theta_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & bf - ce \\ fg - di & ai - cg & 0 \\ dh - eg & bg - ah & ae - bd \end{pmatrix}$$

$$ei - fh = 0$$

$$ch - bi = 0$$

$$cd - af = 0$$

$$ae - bd = 0$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J(\mathbf{q})^{-1} = \frac{1}{500^2 \cdot \sin \theta_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & bf - ce \\ fg - di & ai - cg & 0 \\ dh - eg & bg - ah & 0 \end{pmatrix}$$

$$bf - ce =$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J(\mathbf{q})^{-1} = \frac{1}{500^2 \cdot \sin \theta_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & bf - ce \\ fg - di & ai - cg & 0 \\ dh - eg & bg - ah & 0 \end{pmatrix}$$

$$bf - ce = -500 \cdot (\cos(\theta_2 + \theta_3) + \cos(\theta_2)) \cdot (-500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3)) - (-500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3)) \cdot (-500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2))$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J(\mathbf{q})^{-1} = \frac{1}{500^2 \cdot \sin \theta_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & bf - ce \\ fg - di & ai - cg & 0 \\ dh - eg & bg - ah & 0 \end{pmatrix}$$

$$bf - ce = -500 \cdot (\cos(\theta_2 + \theta_3) + \cos(\theta_2)) \cdot (-500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3)) - (-500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3)) \cdot (-500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2))$$

$$= 500^2 \cdot (\cos(\theta_2 + \theta_3) \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) + \cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - \cos(\theta_2 + \theta_3) \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - \cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3))$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J(\mathbf{q})^{-1} = \frac{1}{500^2 \cdot \sin \theta_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & bf - ce \\ fg - di & ai - cg & 0 \\ dh - eg & bg - ah & 0 \end{pmatrix}$$

$$bf - ce = -500 \cdot (\cos(\theta_2 + \theta_3) + \cos(\theta_2)) \cdot (-500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3)) - (-500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3)) \cdot (-500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2))$$

$$= 500^2 \cdot \begin{pmatrix} \cos(\theta_2 + \theta_3) \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) + \cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ -\cos(\theta_2 + \theta_3) \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - \cos(\theta_2 + \theta_3) \cdot \sin(\theta_2) \end{pmatrix}$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J(\mathbf{q})^{-1} = \frac{1}{500^2 \cdot \sin \theta_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & bf - ce \\ fg - di & ai - cg & 0 \\ dh - eg & bg - ah & 0 \end{pmatrix}$$

$$bf - ce = -500 \cdot (\cos(\theta_2 + \theta_3) + \cos(\theta_2)) \cdot (-500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3)) - (-500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3)) \cdot (-500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2))$$

$$= 500^2 \cdot \begin{pmatrix} \cos(\theta_2 + \theta_3) \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) + \cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ -\cos(\theta_2 + \theta_3) \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - \cos(\theta_2 + \theta_3) \cdot \sin(\theta_2) \end{pmatrix}$$

$$= 500^2 \cdot (\cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - \cos(\theta_2 + \theta_3) \cdot \sin(\theta_2))$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J(\mathbf{q})^{-1} = \frac{1}{500^2 \cdot \sin \theta_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 500^2 \cdot \sin \theta_3 \\ fg - di & ai - cg & 0 \\ dh - eg & bg - ah & 0 \end{pmatrix}$$

$$bf - ce = -500 \cdot (\cos(\theta_2 + \theta_3) + \cos(\theta_2)) \cdot (-500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3)) - (-500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3)) \cdot (-500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2))$$

$$= 500^2 \cdot \begin{pmatrix} \cos(\theta_2 + \theta_3) \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) + \cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ -\cos(\theta_2 + \theta_3) \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - \cos(\theta_2 + \theta_3) \cdot \sin(\theta_2) \end{pmatrix}$$

$$= 500^2 \cdot (\cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - \cos(\theta_2 + \theta_3) \cdot \sin(\theta_2)) = 500^2 \cdot \sin \theta_3$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J(\mathbf{q})^{-1} = \frac{1}{500^2 \cdot \sin \theta_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 500^2 \cdot \sin \theta_3 \\ fg - di & ai - cg & 0 \\ dh - eg & bg - ah & 0 \end{pmatrix}$$

$$fg - di =$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J(\mathbf{q})^{-1} = \frac{1}{500^2 \cdot \sin \theta_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 500^2 \cdot \sin \theta_3 \\ fg - di & ai - cg & 0 \\ dh - eg & bg - ah & 0 \end{pmatrix}$$

$$fg - di = -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 0$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J(\mathbf{q})^{-1} = \frac{1}{500^2 \cdot \sin \theta_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 500^2 \cdot \sin \theta_3 \\ -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) & ai - cg & 0 \\ dh - eg & bg - ah & 0 \end{pmatrix}$$

$$ai - cg =$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J(\mathbf{q})^{-1} = \frac{1}{500^2 \cdot \sin \theta_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 500^2 \cdot \sin \theta_3 \\ -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) & ai - cg & 0 \\ dh - eg & bg - ah & 0 \end{pmatrix}$$

$$ai - cg = 0 - (-500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \cdot 1)$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J(\mathbf{q})^{-1} = \frac{1}{500^2 \cdot \sin \theta_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 500^2 \cdot \sin \theta_3 \\ -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) & ai - cg & 0 \\ dh - eg & bg - ah & 0 \end{pmatrix}$$

$$ai - cg = 0 - (-500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \cdot 1) = 500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3)$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$\begin{aligned}
 J(\mathbf{q}) &= \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 J(\mathbf{q})^{-1} &= \frac{1}{500^2 \cdot \sin \theta_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 500^2 \cdot \sin \theta_3 \\ -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) & 500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) & 0 \\ dh - eg & bg - ah & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$dh - eg =$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$\begin{aligned}
 J(\mathbf{q}) &= \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 J(\mathbf{q})^{-1} &= \frac{1}{500^2 \cdot \sin \theta_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 500^2 \cdot \sin \theta_3 \\ -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) & 500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) & 0 \\ dh - eg & bg - ah & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$dh - eg = 0 \cdot 0 - (-500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2)) \cdot 1$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$\begin{aligned}
 J(\mathbf{q}) &= \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 J(\mathbf{q})^{-1} &= \frac{1}{500^2 \cdot \sin \theta_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 500^2 \cdot \sin \theta_3 \\ -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) & 500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) & 0 \\ dh - eg & bg - ah & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 dh - eg &= 0 \cdot 0 - (-500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2)) \cdot 1 \\
 &= 500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) + 500 \cdot \sin(\theta_2) \\
 &= 500 \cdot (\sin(\theta_2 + \theta_3) + \sin(\theta_2))
 \end{aligned}$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J(\mathbf{q})^{-1} = \frac{1}{500^2 \cdot \sin \theta_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 500^2 \cdot \sin \theta_3 \\ -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) & 500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) & 0 \\ 500 \cdot (\sin(\theta_2 + \theta_3) + \sin(\theta_2)) & bg - ah & 0 \end{pmatrix}$$

$$bg - ah =$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$\begin{aligned}
 J(\mathbf{q}) &= \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 J(\mathbf{q})^{-1} &= \frac{1}{500^2 \cdot \sin \theta_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 500^2 \cdot \sin \theta_3 \\ -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) & 500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) & 0 \\ 500 \cdot (\sin(\theta_2 + \theta_3) + \sin(\theta_2)) & bg - ah & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$bg - ah = (-500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2)) \cdot 1 - 0 \cdot 0$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J(\mathbf{q})^{-1} = \frac{1}{500^2 \cdot \sin \theta_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 500^2 \cdot \sin \theta_3 \\ -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) & 500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) & 0 \\ 500 \cdot (\sin(\theta_2 + \theta_3) + \sin(\theta_2)) & bg - ah & 0 \end{pmatrix}$$

$$bg - ah = (-500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2)) \cdot 1 - 0 \cdot 0$$

$$= -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2)$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q})^{-1} = \frac{1}{500^2 \cdot \sin \theta_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 500^2 \cdot \sin \theta_3 \\ -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) & 500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) & 0 \\ 500 \cdot (\sin(\theta_2 + \theta_3) + \sin(\theta_2)) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & 0 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 1.1: Inverse Jacobi-Matrix

$$J(\mathbf{q})^{-1} = \frac{1}{500^2 \cdot \sin \theta_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 500^2 \cdot \sin \theta_3 \\ -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) & 500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) & 0 \\ 500 \cdot (\sin(\theta_2 + \theta_3) + \sin(\theta_2)) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & 0 \end{pmatrix}$$

$$J(\mathbf{q})^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -\frac{\sin(\theta_2 + \theta_3)}{500 \cdot \sin \theta_3} & \frac{\cos(\theta_2 + \theta_3)}{500 \cdot \sin \theta_3} & 0 \\ \frac{\sin(\theta_2 + \theta_3) + \sin(\theta_2)}{500 \cdot \sin \theta_3} & \frac{-\cos(\theta_2 + \theta_3) - \cos(\theta_2)}{500 \cdot \sin \theta_3} & 0 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 1.2: Gelenkwinkelgeschwindigkeit

$$J(\mathbf{q})^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -\frac{\sin(\theta_2 + \theta_3)}{500 \cdot \sin \theta_3} & \frac{\cos(\theta_2 + \theta_3)}{500 \cdot \sin \theta_3} & 0 \\ \frac{\sin(\theta_2 + \theta_3) + \sin(\theta_2)}{500 \cdot \sin \theta_3} & \frac{-\cos(\theta_2 + \theta_3) - \cos(\theta_2)}{500 \cdot \sin \theta_3} & 0 \end{pmatrix}$$

■ Gegeben:

- Zustand des Roboters $\mathbf{q} = (d_1, \theta_2, \theta_3)^T = \left(1, 0, \frac{\pi}{2}\right)^T$
- EEF-Geschwindigkeit $\dot{\mathbf{p}} = (1000, 0, 0)^T$

■ Gesucht:

- Gelenkwinkelgeschwindigkeit $\dot{\mathbf{q}}$, die die EEF-Geschwindigkeit $\dot{\mathbf{p}}$ erzeugt

Aufgabe 1.2: Gelenkwinkelgeschwindigkeit

$$J(\mathbf{q})^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -\frac{\sin(\theta_2 + \theta_3)}{500 \cdot \sin \theta_3} & \frac{\cos(\theta_2 + \theta_3)}{500 \cdot \sin \theta_3} & 0 \\ \frac{\sin(\theta_2 + \theta_3) + \sin(\theta_2)}{500 \cdot \sin \theta_3} & \frac{-\cos(\theta_2 + \theta_3) - \cos(\theta_2)}{500 \cdot \sin \theta_3} & 0 \end{pmatrix}$$

$$J \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} \right)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -\frac{\sin(\theta_2 + \theta_3)}{500 \cdot \sin \theta_3} & \frac{\cos(\theta_2 + \theta_3)}{500 \cdot \sin \theta_3} & 0 \\ \frac{\sin(\theta_2 + \theta_3) + \sin(\theta_2)}{500 \cdot \sin \theta_3} & \frac{-\cos(\theta_2 + \theta_3) - \cos(\theta_2)}{500 \cdot \sin \theta_3} & 0 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 1.2: Gelenkwinkelgeschwindigkeit

$$J \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} \right)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -\frac{\sin\left(0 + \frac{\pi}{2}\right)}{500 \cdot \sin\frac{\pi}{2}} & \frac{\cos\left(0 + \frac{\pi}{2}\right)}{500 \cdot \sin\frac{\pi}{2}} & 0 \\ \frac{\sin\left(0 + \frac{\pi}{2}\right) + \sin(0)}{500 \cdot \sin\frac{\pi}{2}} & \frac{-\cos\left(0 + \frac{\pi}{2}\right) - \cos(0)}{500 \cdot \sin\frac{\pi}{2}} & 0 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 1.2: Gelenkwinkelgeschwindigkeit

$$J \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} \right)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{0}{500 \cdot \sin \frac{\pi}{2}} & \frac{\cos \left(0 + \frac{\pi}{2} \right)}{500 \cdot \sin \frac{\pi}{2}} & 1 \\ \frac{\sin \left(0 + \frac{\pi}{2} \right) + \sin(0)}{500 \cdot \sin \frac{\pi}{2}} & \frac{-\cos \left(0 + \frac{\pi}{2} \right) - \cos(0)}{500 \cdot \sin \frac{\pi}{2}} & 0 \end{pmatrix}$$

$$J \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} \right)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{500 \cdot 1} & \frac{0}{500 \cdot 1} & 0 \\ \frac{1+0}{500 \cdot 1} & \frac{-0-1}{500 \cdot 1} & 0 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 1.2: Gelenkwinkelgeschwindigkeit

$$J \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} \right)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -\frac{\sin\left(0 + \frac{\pi}{2}\right)}{500 \cdot \sin\frac{\pi}{2}} & \frac{\cos\left(0 + \frac{\pi}{2}\right)}{500 \cdot \sin\frac{\pi}{2}} & 0 \\ \frac{\sin\left(0 + \frac{\pi}{2}\right) + \sin(0)}{500 \cdot \sin\frac{\pi}{2}} & \frac{-\cos\left(0 + \frac{\pi}{2}\right) - \cos(0)}{500 \cdot \sin\frac{\pi}{2}} & 0 \end{pmatrix}$$

$$J \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} \right)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{500 \cdot 1} & \frac{0}{500 \cdot 1} & 0 \\ \frac{1+0}{500 \cdot 1} & \frac{-0-1}{500 \cdot 1} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{500} & 0 & 0 \\ \frac{1}{500} & -\frac{1}{500} & 0 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 1.2: Gelenkwinkelgeschwindigkeit

$$\dot{q} = J(q)^{-1} \cdot \dot{p}$$

Aufgabe 1.2: Gelenkwinkelgeschwindigkeit

$$\dot{q} = J(q)^{-1} \cdot \dot{p}$$

$$\dot{q} = J \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} \right)^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1000 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 1.2: Gelenkwinkelgeschwindigkeit

$$\dot{\mathbf{q}} = J(\mathbf{q})^{-1} \cdot \dot{\mathbf{p}}$$

$$\dot{\mathbf{q}} = J \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} \right)^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1000 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\dot{\mathbf{q}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{500} & 0 & 0 \\ \frac{1}{500} & -\frac{1}{500} & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1000 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 1.2: Gelenkwinkelgeschwindigkeit


$$\dot{\mathbf{q}} = J(\mathbf{q})^{-1} \cdot \dot{\mathbf{p}}$$

$$\dot{\mathbf{q}} = J \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} \right)^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1000 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\dot{\mathbf{q}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{500} & 0 & 0 \\ \frac{1}{500} & -\frac{1}{500} & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1000 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 1.3: Singularitäten

- Eine kinematische Kette ist in einer **singulären Konfiguration**, wenn die zugehörige Jacobi-Matrix nicht vollen Rang hat
 - Zwei oder mehr Spalten von J_f sind linear abhängig
- Die Jacobi-Matrix ist nicht invertierbar
 - Bestimmte Bewegungen unmöglich
- In der Umgebung von Singularitäten können **große Gelenkgeschwindigkeiten** nötig werden, um eine End-Effektor-Geschwindigkeit zu halten.



Aufgabe 1.3: Singularitäten

- Eine quadratische Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ hat genau dann vollen Rang, wenn die Determinante ungleich Null ist:

$$\text{rang } A = n \Leftrightarrow \det A \neq 0$$

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 1.3: Singularitäten

- Eine quadratische Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ hat genau dann vollen Rang, wenn die Determinante ungleich Null ist:

$$\text{rang } A = n \Leftrightarrow \det A \neq 0$$

$$J(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \cos(\theta_2) & -500 \cdot \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) - 500 \cdot \sin(\theta_2) & -500 \cdot \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det J(\mathbf{q}) = 500^2 \cdot \sin \theta_3$$

- Für Singularitäten \mathbf{q}_{sing} der quadratischen Matrix $J(\mathbf{q})$ gilt:

$$\det J(\mathbf{q}_{sing}) = 500^2 \cdot \sin \theta_3 = 0$$

Aufgabe 1.3: Singularitäten

- Für Singularitäten \mathbf{q}_{sing} der quadratischen Matrix $J(\mathbf{q})$ gilt:

$$\det J(\mathbf{q}_{sing}) = 500^2 \cdot \sin \theta_3 = 0$$

Aufgabe 1.3: Singularitäten

- Für Singularitäten \mathbf{q}_{sing} der quadratischen Matrix $J(\mathbf{q})$ gilt:

$$\det J(\mathbf{q}_{sing}) = 500^2 \cdot \sin \theta_3 = 0$$


$$\sin \theta_3 = 0$$

$$\theta_3 = n \cdot \pi, n \in [0, 1, 2, \dots]$$

$$\theta_3 = 0 \vee \theta_3 = \pi, \quad \theta_3 \in [0, 2\pi)$$

$$\mathbf{q}_{sing,1} = \begin{pmatrix} d_1 \\ \theta_2 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{q}_{sing,2} = \begin{pmatrix} d_1 \\ \theta_2 \\ \pi \end{pmatrix}$$


Aufgabe 2: Dynamikmodellierung nach Lagrange



- Annahmen:
 - Massenschwerpunkte in der Mitte der Segmente
 - Vernachlässigbarer Radius der Segmente

■ Konfiguration $\mathbf{q} = (d, \theta)^T$

Aufgabe 2: Dynamikmodellierung nach Lagrange



- Position der Punktmassen:

$$p_1 = (x_1, y_1) = \left(\frac{1}{2}l_1 + d, 0\right)$$

$$p_2 = (x_2, y_2) = \left(l_1 + d + \frac{1}{2}l_2 \cdot \cos \theta, -\frac{1}{2}l_2 \cdot \sin \theta\right)$$

Aufgabe 2: Dynamikmodellierung nach Lagrange


- Konfiguration

$$\mathbf{q} = (d, \theta)^T$$

- Position der Punktmassen:

$$\mathbf{p}_1 = (x_1, y_1) = \left(\frac{1}{2}l_1 + d, 0\right)$$

$$\mathbf{p}_2 = (x_2, y_2) = \left(l_1 + d + \frac{1}{2}l_2 \cdot \cos \theta, -\frac{1}{2}l_2 \cdot \sin \theta\right)$$



- Modellieren Sie die Dynamik des Robotersystems.

- 2.1: Kinetische Energie für jedes Gelenk bestimmen
- 2.2: Potentielle Energie für jedes Gelenk bestimmen
- 2.3: Lagrange-Funktion berechnen
- 2.4: Bewegungsgleichung aufstellen

Methode nach Lagrange (Wiederholung)

- Lagrange-Funktion:

$$L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = E_{kin}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) - E_{pot}(\mathbf{q})$$


- Bewegungsgleichung:

$$\tau_i = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i}$$

- q_i : i-te Komponente der generalisierten Koordinaten
- τ_i : i-te Komponente der generalisierten Kräfte

Aufgabe 2.1: Kinetische Energie

$$E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2$$



Kinetische Energien für s_1 und s_2 :

$$E_{kin,1} = \frac{1}{2}m_1\dot{d}^2$$

$$E_{kin,2} = \frac{1}{2}m_2v_2^2 = \frac{1}{2}m_2(\dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2)$$

Aufgabe 2.1: Kinetische Energie


$$p_2 = (x_2, y_2) = \left(l_1 + d + \frac{1}{2} l_2 \cdot \cos \theta, -\frac{1}{2} l_2 \cdot \sin \theta \right)$$

Aufgabe 2.1: Kinetische Energie

$$E_{kin,2} = \frac{1}{2} m_2 (\dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2) =$$

Aufgabe 2.2: Potentielle Energie

$$E_{pot} = mgh$$



Potentielle Energien für s_1 und s_2 :

$$E_{pot,1} = m_1 g y_1 = 0$$

$$E_{pot,2} = m_2 g y_2 = -\frac{1}{2} m_2 g l_2 \sin(\theta)$$

Aufgabe 2.3: Lagrange-Funktion

$$L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = E_{kin}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) - E_{pot}(\mathbf{q})$$

$$L = E_{kin,1} + E_{kin,2} - E_{pot,1} - E_{pot,2} =$$

Aufgabe 2.3: Ableitungen der Lagrange-Funktion

$$L = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{d}^2 - \frac{1}{2}m_2l_2\dot{\theta}\sin(\theta) + \frac{1}{8}m_2l_2^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m_2gl_2\sin(\theta)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{d}} =$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{d}} =$$

$$\frac{\partial L}{\partial d} =$$

Aufgabe 2.3: Ableitungen der Lagrange-Funktion

$$L = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{d}^2 - \frac{1}{2}m_2l_2\dot{d}\dot{\theta}\sin(\theta) + \frac{1}{8}m_2l_2^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m_2gl_2\sin(\theta)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = \frac{1}{4}m_2l_2^2\dot{\theta} - \frac{1}{2}m_2l_2\dot{d}\sin(\theta)$$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = \frac{1}{4}m_2l_2^2\ddot{\theta} - \frac{1}{2}m_2l_2(\ddot{d}\sin(\theta) + \dot{d}\dot{\theta}\cos(\theta))$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = -\frac{1}{2}m_2l_2\dot{d}\dot{\theta}\cos(\theta) + \frac{1}{2}m_2l_2g\cos(\theta)$$

Aufgabe 2.4: Bewegungsgleichung

$$\tau_i = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i}$$

$$\tau_1 = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{d}} \right) - \frac{\partial L}{\partial d} =$$

Aufgabe 2.4: Bewegungsgleichung

$$\tau_i = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i}$$

$$\tau_2 = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta}$$

$$= \frac{1}{4} m_2 l_2^2 \ddot{\theta} - \frac{1}{2} m_2 l_2 \ddot{d} \sin(\theta) - \frac{1}{2} m_2 l_2 \dot{d} \dot{\theta} \cos(\theta) \\ - \left(-\frac{1}{2} m_2 l_2 \dot{d} \dot{\theta} \cos(\theta) + \frac{1}{2} m_2 l_2 g \cos(\theta) \right)$$

$$= \frac{1}{4} m_2 l_2^2 \ddot{\theta} - \frac{1}{2} m_2 l_2 \sin(\theta) \ddot{d} - \frac{1}{2} m_2 l_2 g \cos(\theta)$$

Aufgabe 2.4: Bewegungsgleichung

$$\boldsymbol{\tau} = M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{c}(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}) + \mathbf{g}(\mathbf{q})$$

$$\boldsymbol{\tau} = \begin{pmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (m_1 + m_2)\ddot{d} - \frac{1}{2}m_2l_2(\ddot{\theta} \sin(\theta) + \dot{\theta}^2 \cos(\theta)) \\ \frac{1}{4}m_2l_2^2\ddot{\theta} - \frac{1}{2}m_2l_2 \sin(\theta) \ddot{d} - \frac{1}{2}m_2l_2g \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Aufgabe 2.4: Bewegungsgleichung

$$\boldsymbol{\tau} = M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{c}(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}) + \mathbf{g}(\mathbf{q})$$

$$\boldsymbol{\tau} = \begin{pmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (m_1 + m_2)\ddot{d} - \frac{1}{2}m_2l_2(\ddot{\theta} \sin(\theta) + \dot{\theta}^2 \cos(\theta)) \\ \frac{1}{4}m_2l_2^2\ddot{\theta} - \frac{1}{2}m_2l_2 \sin(\theta) \ddot{d} - \frac{1}{2}m_2l_2g \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Aufgabe 2.4: Bewegungsgleichung

$$\boldsymbol{\tau} = M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{c}(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}) + \mathbf{g}(\mathbf{q})$$

$$\boldsymbol{\tau} = \begin{pmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (m_1 + m_2)\ddot{d} - \frac{1}{2}m_2l_2(\ddot{\theta} \sin(\theta) + \dot{\theta}^2 \cos(\theta)) \\ \frac{1}{4}m_2l_2^2\ddot{\theta} - \frac{1}{2}m_2l_2 \sin(\theta) \ddot{d} - \frac{1}{2}m_2l_2 g \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Entspricht der allgemeinen Bewegungsgleichung:

$$\boldsymbol{\tau} = \begin{pmatrix} m_1 + m_2 & -\frac{1}{2}m_2l_2 \sin(\theta) \\ -\frac{1}{2}m_2l_2 \sin(\theta) & \frac{1}{4}m_2l_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{d} \\ \ddot{\theta} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2}m_2l_2 \dot{\theta}^2 \cos(\theta) \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2}m_2l_2 g \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Matlab für die nächsten Übungen

- Installationsanleitung für Studierende am KIT
 - <https://www.scc.kit.edu/produkte/3841.php>

- Robotics Toolbox (Peter Corke)
 - http://petercorke.com/wordpress/toolboxes/robotics-toolbox#Downloading_the_Toolbox
 - Die .mltbx Datei herunterladen
 - Aus dem Matlab-Fileexplorer öffnen

- Selber ausprobieren: Übungsblatt 1 in Matlab lösen

