Analysis für das Lehramt Lösungsvorschlag zu Übungsblatt 01

Aufgabe 1 (Rechnen mit komplexen Zahlen).

(a) Berechnen Sie für $n \in \mathbb{N}$ den Real- und Imaginärteil der folgenden komplexen Zahlen:

(i) $z_1 := \frac{3 + 5i}{2 - i}$,

(ii) $z_2 := \frac{1}{(1 + i)^2}$ und

(iii) $z_3 := (1 - i\sqrt{3})^{3n}$.

(b) Skizzieren Sie die folgenden Mengen in der komplexen Zahlenebene:

(i) $D_1 := \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z^2) \leq 1\}$,

(ii) $D_2 := \{z \in \mathbb{C} : |z + 2 + i| = |z - i|\}$,

(iii) $D_3 := \{z \in \mathbb{C} : 1 < \operatorname{Re}(iz) < 2\}$ und

(iv) $D_4 := \left\{z \in \mathbb{C} : |z + 1 - i| < 2, \operatorname{Re}(z) \geq \frac{1}{2}\right\}$.

(c) Welche geometrische Form hat die Lösungsmenge der Gleichung $2z\bar{z} + iz - i\bar{z} - 1 = 0$?

(d) Bestimmen Sie alle $z \in \mathbb{C}$, welche die gegebene Gleichung lösen: $z^2 - 2\bar{z} + 1 = 0$.

Lösungsvorschlag.

(a) (i) Es gilt

$$\begin{aligned} z_1 &= \frac{(3 + 5i)(2 + i)}{(2 - i)(2 + i)} \\ &= \frac{6 + 3i + 10i - 5}{|2 - i|^2} \\ &= \frac{1 + 13i}{2^2 + (-1)^2} \\ &= \frac{1}{5} + \frac{13}{5}i, \end{aligned}$$

also $\operatorname{Re} z_1 = 1/5$ und $\operatorname{Im} z_1 = 13/5$.

(ii) Es gilt

$$\begin{aligned} z_2 &= \frac{1}{(1 + i)^2} \\ &= \frac{1}{1^2 + 2i + i^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2i} \\
 &= \frac{1}{2} \frac{i}{i \cdot i} \\
 &= \frac{1}{2} \frac{i}{-1} \\
 &= -\frac{1}{2}i,
 \end{aligned}$$

also $\operatorname{Re} z_2 = 0$ und $\operatorname{Im} z_2 = -1/2$.

(iii) Wir nutzen die Polarkoordinatendarstellung

$$1 - \sqrt{3}i = re^{i\varphi} = r \cos \varphi + ir \sin \varphi$$

mit $r = |z|$ und $\varphi = \arg z \in (-\pi, \pi]$. Somit gilt

$$r = |1 - \sqrt{3}i| = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = 2$$

und

$$\begin{aligned}
 1 - \sqrt{3}i &= 2e^{i\varphi} = 2 \cos \varphi + 2i \sin \varphi \\
 \Leftrightarrow \cos \varphi &= \frac{1}{2} \wedge \sin \varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\
 \Leftrightarrow \varphi &= -\frac{\pi}{3},
 \end{aligned}$$

also $1 - i\sqrt{3} = 2e^{-\pi/3i}$. Wir berechnen also

$$\begin{aligned}
 (1 - \sqrt{3}i)^{3n} &= (2e^{-i\pi/3})^{3n} \\
 &= 2^{3n} (e^{-i\pi/3})^{3n} \\
 &= 2^{3n} e^{-i\pi/3 \cdot 3n} \\
 &= 2^{3n} e^{in\pi} \\
 &= 2^{3n} (\cos(-n\pi) + i \sin(n\pi)) \\
 &= 2^{3n} ((-1)^n + 0).
 \end{aligned}$$

Somit gilt $\operatorname{Re} z_3 = (-1)^n 2^{3n}$ und $\operatorname{Im} z_3 = 0$.

(b) (i) Für $u = x + iy$ mit $x, y \in \mathbb{R}$ gilt

$$\begin{aligned}
 z^2 &= (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + i2xy \\
 \Rightarrow \operatorname{Re} z^2 &= x^2 - y^2 \leq 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow x^2 \leq 1 + y^2 \\ &\Leftrightarrow |x| \leq \sqrt{1 + y^2} \\ &\Leftrightarrow -\sqrt{1 + y^2} \leq x \leq \sqrt{1 + y^2}. \end{aligned}$$

Die gesuchte Menge ist also die zwischen den beiden blauen Linien.

- (ii) Mit $P_1 = -2 - i$ und $P_2 = i$ hat D_2 die Form $\{z \in \mathbb{C} : |z - P_1| = |z - P_2|\}$, also ist die gesuchte Menge die dunkelblaue Linie.

- (iii) Für $z = x + iy$ mit $x, y \in \mathbb{R}$ gilt $iz = i(x + iy) = ix - y = -y + ix$, also $\operatorname{Re}(iz) = -y = -\operatorname{Im} z$. Somit gilt

$$\begin{aligned} &1 < \operatorname{Re}(iz) < 2 \\ &\Leftrightarrow 1 < -\operatorname{Im} z < 2 \\ &\Leftrightarrow -1 > \operatorname{Im} z > -2, \end{aligned}$$

also ist die gesuchte Menge die zwischen den beiden blauen Linien.

- (iv) Mit $P_1 = -1 + i$ hat D_4 die Form $\{z \in \mathbb{C} : |z - P_1| < 2, \operatorname{Re} z \geq 1/2\}$. Die gesuchte Menge ist somit der Teil des Kreises, der rechts der blauen Linie liegt.

(c) Wir berechnen

$$\begin{aligned}
 & 2z\bar{z} + iz - 1 = 0 \\
 \Leftrightarrow & z\bar{z} + \frac{i}{2}z - \frac{i}{2}\bar{z} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \\
 \Leftrightarrow & \left(z - \frac{1}{2}i\right)\left(\bar{z} + \frac{1}{2}i\right) - \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \\
 \Leftrightarrow & \left(z - \frac{1}{2}i\right)\overline{\left(z - \frac{1}{2}i\right)} = \frac{3}{4} \\
 \Leftrightarrow & \left|z - \frac{1}{2}i\right|^2 = \frac{3}{4} \\
 \Leftrightarrow & \left|z - \frac{1}{2}i\right| = \frac{\sqrt{3}}{2}.
 \end{aligned}$$

Somit beschreibt die Gleichung einen Kreis mit Mittelpunkt $1/2i$ und Radius $\sqrt{3}/2$.

(d) Für $z \in \mathbb{C}$ mit $z = x + iy$ und $x, y \in \mathbb{R}$ gilt

$$\begin{aligned} z^2 - 2\bar{z} + 1 &= 0 \\ \Leftrightarrow (x + iy)^2 - 2(x - iy) + 1 &= 0 \\ \Leftrightarrow x^2 - y^2 + i2xy - 2x + 2iy + 1 &= 0 \\ \Leftrightarrow (x^2 - y^2 - 2x + 1) + i(2xy + 2y) &= 0 \\ \Leftrightarrow x^2 - y^2 - 2x + 1 &= 0 \\ \wedge y(x + 1) &= 0. \end{aligned}$$

Falls $y = 0$, so folgt

$$\begin{aligned} (x - 1)^2 &= 0 \\ \Leftrightarrow x - 1 &= 0 \\ \Leftrightarrow x &= 1. \end{aligned}$$

Falls $y \neq 0$, also $x = -1$, so folgt

$$\begin{aligned} 1 - y^2 + 2 + 1 &= 0 \\ \Leftrightarrow y^2 &= 4 \\ \Leftrightarrow y &\in \{-2, 2\}. \end{aligned}$$

Somit ist die Lösungsmenge der obigen Gleichung $\{1, -1 \pm 2i\}$. □

Aufgabe 2 (Komplexe Differenzierbarkeit = Reelle Differenzierbarkeit + Cauchy-Riemannsche Differentialgleichungen). Es seien $D \subseteq \mathbb{C}$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ eine Funktion. Definieren wir $u := \operatorname{Re} f$ und $v := \operatorname{Im} f$, so können wir $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ für alle $z := x + iy \in D$ schreiben (wobei wir den Definitionsbereich D von u und v als Teilmenge des $\mathbb{R}^2$ auffassen). Im Folgenden sei $z_0 = x_0 + iy_0 \in D$. Zeigen Sie, dass folgende Aussagen äquivalent sind:

- (a) f ist komplex differenzierbar in z_0 .
- (b) u und v sind reell differenzierbar in (x_0, y_0) und es gelten $u_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0)$, $u_y(x_0, y_0) = -v_x(x_0, y_0)$.

Nutzen Sie hierfür, dass f genau dann in z_0 komplex differenzierbar ist, wenn es ein $c \in \mathbb{C}$ gibt mit $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{|f(z) - f(z_0) - c(z - z_0)|}{|z - z_0|} = 0$, und bestimmen Sie Real- und Imaginärteil von $f(z) - f(z_0) - c(z - z_0)$.

Lösungsvorschlag. Es sei $z = x + iy \in D$ mit $x, y \in \mathbb{R}$ und $z \neq z_0$, es sei $f = u + iv$ für zwei Funktionen $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ und $v : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ und ferner sei $c = a + ib$ für $a, b \in \mathbb{R}$. Dann gilt, dass

$$\begin{aligned} & f(z) - c(z - z_0) \\ &= u(x, y) + iv(x, y) - (u(x_0, y_0) + iv(x_0, y_0)) - (a + ib)((x - x_0) + i(y - y_0)) \\ &= u(x, y) + iv(x, y) - (u(x_0, y_0) + iv(x_0, y_0)) \\ &\quad - (a(x - x_0) - b(y - y_0) + i(b(x - x_0) + a(y - y_0))) \\ &= \left(u(x, y) - u(x_0, y_0) - \begin{pmatrix} a \\ -b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} \right) + i \left(v(x, y) - v(x_0, y_0) - \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} \right) \\ &=: P(x, y) + iQ(x, y). \end{aligned}$$

Die Funktion f ist in $z_0 = x_0 + iy_0 \in D$ mit $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$ genau dann komplex differenzierbar, wenn gilt

$$\begin{aligned} & \exists c = a + ib \in \mathbb{C} (a, b \in \mathbb{R}) : \lim_{z \rightarrow z_0} \left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - c \right| = 0 \\ \Leftrightarrow & \exists c = a + ib \in \mathbb{C} (a, b \in \mathbb{R}) : \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{|f(z) - f(z_0) - c(z - z_0)|}{|z - z_0|} = 0 \\ \Leftrightarrow & \exists c = (a, b) \in \mathbb{R}^2 : \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{|P(x, y) + iQ(x, y)|}{\left| \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} \right|} = 0 \\ \Leftrightarrow & \exists c = (a, b) \in \mathbb{R}^2 : \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{|P(x, y)|}{\left| \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} \right|} = \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{|Q(x, y)|}{\left| \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} \right|} = 0 \\ \Leftrightarrow & u \text{ und } v \text{ sind in } (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2 \text{ reell differenzierbar und es gelten} \\ & (\nabla u)(x_0, y_0) = (u_x(x_0, y_0) \ u_y(x_0, y_0)) = (a \ -b) \\ & (\nabla v)(x_0, y_0) = (v_x(x_0, y_0) \ v_y(x_0, y_0)) = (b \ a) \text{ für } a, b \in \mathbb{R} \\ \Leftrightarrow & u \text{ und } v \text{ sind reell differenzierbar in } x_0, y_0 \text{ und es gelten} \\ & u_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0) \\ & u_y(x_0, y_0) = -v_x(x_0, y_0). \quad \square \end{aligned}$$

Aufgabe 3 (Komplexe Differenzierbarkeit und Holomorphie).

- (a) Zeigen Sie mithilfe der Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen, dass die Funktion $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) := \bar{z}$ an keiner Stelle komplex differenzierbar ist.
- (b) Es sei $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$ stetig und die Abbildung $z \mapsto f(z)^2$ sei holomorph auf $\mathbb{C}$. Zeigen Sie, dass dann f holomorph auf $\mathbb{C}$ ist und berechnen Sie die Ableitung.

Lösungsvorschlag.

(a) Für $z = x + iy$ mit $x, y \in \mathbb{R}$ gilt

$$f(z) = \bar{z} = x - iy = u(x, y) + iv(x, y),$$

wobei $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $u(x, y) = x$ und $v : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $v(x, y) = -y$. Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= 1, & u_y(x, y) &= 0, \\ v_x(x, y) &= 0, \\ v_y(x, y) &= -1, \end{aligned}$$

also $u_y(x, y) = 1 \neq -1 = v_y(x, y)$ für alle $x, y \in \mathbb{R}$. Somit ist f in jedem Punkt $z \in \mathbb{C}$ nicht komplex differenzierbar.

(b) Sei $z_0 \in \mathbb{C}$. Dann gilt für $z \in \mathbb{C} \setminus \{z_0\}$

$$\begin{aligned} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} &= \frac{(f(z) - f(z_0))(f(z) + f(z_0))}{(z - z_0)(f(z) + f(z_0))} \\ &= \frac{f^2(z) - f^2(z_0)}{z - z_0} \frac{1}{f(z) + f(z_0)} \\ &\rightarrow (f^2)'(z_0) \frac{1}{2f(z_0)} \end{aligned}$$

für $z \rightarrow z_0$, da f^2 holomorph ist und f stetig ist sowie $f(z) \neq 0$ für alle $z \in \mathbb{C}$. Somit ist f in z_0 komplex differenzierbar und es gilt $f'(z_0) = (f^2)'(z_0)/(2f(z_0))$. Da $z_0 \in \mathbb{C}$ beliebig gewählt war, folgt, dass f holomorph ist. $\square$

Aufgabe 4 (Komplexe Potenzreihen).

(a) Berechnen Sie jeweils den Konvergenzradius der folgenden Potenzreihen.

- (i) $\sum_{n=0}^{\infty} (2 + ni)^n z^n$,
- (ii) $\sum_{n=0}^{\infty} (in^2 + 2^n) z^{2n}$ und
- (iii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(in)^{n-1}}{n!} z^n$.

(b) Bestimmen Sie alle $z \in \mathbb{C}$, für welche die gegebene Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)z^n}{n^2}$$

konvergent ist.

Lösungsvorschlag.

(a) (i) Setze $a_n := (2 + in)^n$ für $n \in \mathbb{N}_0$. Für $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{|a_n|} &= |2 + in| \geq |\operatorname{Im}(2 + in)| = n \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty) \\ \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} &= \infty \\ \implies R &= 0. \end{aligned}$$

(ii) Setze $a_{2n} = in^2 + 2^n$ und $a_{2n+1} = 0$ für $n \in \mathbb{N}_0$. Dann gilt für $n \geq 4$

$$\begin{aligned} 2^n &= |\operatorname{Re}(a_{2n})| \\ &\leq |a_{2n}| \\ &= |2^n + in^2| \\ &= \sqrt{(2^n)^2 + (n^2)^2} \\ &\leq \sqrt{(2^n)^2 + (2^n)^2} \\ &= 2^n \sqrt{2} \\ \implies 2^{1/2} &\leq \sqrt[2n]{|a_{2n}|} \\ &\leq 2^{1/2} 2^{1/(4n)} \\ &\rightarrow 2^{1/2} \quad (n \rightarrow \infty) \\ \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[2n]{|a_{2n}|} &= 2^{1/2} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \\ \implies R &= \frac{1}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

(iii) Setze $a_n = (in)^{n-1}/n!$ für $n \in \mathbb{N}$. Es gilt

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| &= \frac{n^{n-1}/n!}{(n+1)^n/(n+1)!} \\ &= \frac{n^{n-1}}{(n+1)^{n-1}} \\ &= \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n-1} \\ &= \left(\frac{1}{1-1/n} \right)^{n-1} \\ &= \frac{1}{(1+1/n)^{n-1}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow \frac{1}{e} \quad (n \rightarrow \infty) \\ \implies R &= \frac{1}{e}. \end{aligned}$$

(b) Setze $a_n = (n-1)/n$. Für $n \geq 2$ gilt

$$\frac{1}{2n} = \frac{n/2}{n^2} \leq |a_n| = \frac{n-1}{n^2} \leq \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n} \quad (1)$$

und damit

$$1 \leftarrow \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \frac{1}{\sqrt[3]{n}} \leq \sqrt[3]{|a_n|} \leq \frac{1}{\sqrt[3]{n}} \rightarrow 1$$

für $n \rightarrow \infty$. Mit dem Sandwichlemma folgt also $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{|a_n|} = 1$, also $R = 1$. Die Reihe konvergiert also für $|z| < 1$ und divergiert für $|z| > 1$.

Die Folge $(a_n)_{n \geq 2}$ ist fallend, da

$$a_n = \frac{n-1}{n^2} = \frac{1}{n} \frac{n-1}{n} = \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

und $x \mapsto x(1-x)$ für $x \in [0, 1/2]$ wachsend ist. Weiter gilt

$$|a_n| \leq \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

für $n \rightarrow \infty$, also konvergiert die Reihe nach Satz 3.3 für $|z| \leq 1$ mit $z \neq 1$.

Für $z = 1$ divergiert die Reihe nach Gleichung (1) und dem Minorantenkriterium.

Insgesamt konvergiert die Reihe genau dann, wenn $|z| \leq 1$ und $z \neq 1$. $\square$