Analysis für das Lehramt Lösungsvorschlag zu Übungsblatt 02

Aufgabe 1 (Komplexe Potenzreihen). Bestimmen Sie alle $z \in \mathbb{C}$, für welche die gegebene Reihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} n(n+1)z^n.$$

konvergent ist. Berechnen Sie zusätzlich den Wert der Reihe für die $z \in \mathbb{C}$, für die die Reihe konvergiert.

Lösungsvorschlag. Es sei $a_n = n(n+1)$ für $n \in \mathbb{N}_0$. Für $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \sqrt[n]{n^n \sqrt{n+1}} \rightarrow 1$$

für $n \rightarrow \infty$, also $R = 1$.

Für $|z| = 1$ divergiert die Reihe, da $(a_n z^n)_{n \in \mathbb{N}}$ keine Nullfolge ist für $|z| = 1$.

Die Reihe konvergiert also genau dann, wenn $|z| < 1$.

Für $z \in \mathbb{C}$ mit $|z| < 1$ gilt

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} n(n+1)z^n &= z \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)z^{n-1} \\ &= z \sum_{n=2}^{\infty} (n-1)nz^{n-2} \\ &\stackrel{\text{Satz 3.2}}{=} z \left(\frac{d}{dz} \right)^2 \left(\sum_{n=0}^{\infty} z^n \right) \\ &= z \left(\frac{d}{dz} \right)^2 \left(\frac{1}{1-z} \right) \\ &= z \frac{d}{dz} \frac{1}{(1-z)^2} \\ &= z \frac{2}{(1-z)^3} \\ &= \frac{2z}{(1-z)^3} \end{aligned}$$

□

Aufgabe 2 (Komplexe Funktionen).

(a) Berechnen Sie den Real- und Imaginärteil folgender komplexer Zahlen:

- (i) $z_1 := (1+i)^i$,
- (ii) $z_2 := (\log(i))^i$ und
- (iii) $z_3 := i^{(i^i)}$.

- (b) Berechnen Sie für $w \in \mathbb{C}$ mit $|w| = 1$ alle Lösungen $z \in \mathbb{C}$ der Gleichung $e^z = w$.
 (c) Berechnen Sie die Nullstellen der komplexen Funktionen $\exp$, $\sin$ und $\cos$.

Lösungsvorschlag.

- (a) (i) Wir bemerken zunächst, dass

$$\log(1 + i) = \log(|1 + i|) + i \arg(1 + i) = \log \sqrt{2} + i \frac{\pi}{4}.$$

Somit gilt

$$\begin{aligned} z_1 &= (1 + i)^i \\ &= \exp(\log(1 + i)i) \\ &= \exp\left(-\frac{\pi}{4} + i \log \sqrt{2}\right) \\ &= e^{-\pi/4} \exp(i \log \sqrt{2}) \\ &= e^{-\pi/4} (\cos \log \sqrt{2} + i \sin \log \sqrt{2}). \end{aligned}$$

Also folgt

$$\begin{aligned} \operatorname{Re} z_1 &= e^{-\pi/4} \cos \log \sqrt{2} \text{ und} \\ \operatorname{Im} z_1 &= e^{-\pi/4} \sin \log \sqrt{2}. \end{aligned}$$

- (ii) Wie vorhin bemerken wir, dass

$$\begin{aligned} \log i &= \log|i| + i \arg i = i \frac{\pi}{2} \text{ und} \\ \log \log i &= \log\left(i \frac{\pi}{2}\right) = \log \frac{\pi}{2} + i \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Somit gilt

$$\begin{aligned} z_2 &= (\log i)^i \\ &= \exp(\log \log i \cdot i) \\ &= \exp\left(-\frac{\pi}{2} + i \log \frac{\pi}{2}\right) \\ &= e^{-\pi/2} (\cos \log \frac{\pi}{2} + i \sin \log \frac{\pi}{2}). \end{aligned}$$

Also folgt

$$\begin{aligned} \operatorname{Re} z_2 &= e^{-\pi/2} \cos \log \frac{\pi}{2} \text{ und} \\ \operatorname{Im} z_2 &= e^{-\pi/2} \sin \log \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

(iii) Es gilt

$$\begin{aligned}
 z_3 &= i^{(i)} \\
 &= \exp(\log i \cdot i) \\
 &= \exp\left(i \frac{\pi}{2} \exp(\log i \cdot i)\right) \\
 &= \exp\left(i \frac{\pi}{2} e^{-\pi/2}\right) \\
 &= \cos\left(\frac{\pi}{2} e^{-\pi/2}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2} e^{-\pi/2}\right).
 \end{aligned}$$

Also folgt

$$\begin{aligned}
 \operatorname{Re} z_3 &= \cos\left(\frac{\pi}{2} e^{-\pi/2}\right) \text{ und} \\
 \operatorname{Im} z_3 &= \sin\left(\frac{\pi}{2} e^{-\pi/2}\right).
 \end{aligned}$$

(b) Sei $z = x + iy$ mit $x, y \in \mathbb{R}$ mit $e^z = w$. Dann gilt

$$1 = |w| = |e^x e^{iy}| = |e^x| e^{iy} = e^x,$$

also $x = 0$. Somit erhalten wir

$$\begin{aligned}
 e^{iy} &= w = |w| e^{i \arg w} = e^{i \arg w} \\
 \Leftrightarrow e^{i(y - \arg w)} &= 1 \\
 \Leftrightarrow \cos(y - \arg w) &= 1 \\
 \wedge \sin(y - \arg w) &= 0 \\
 \Leftrightarrow y - \arg w &= 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\
 \wedge y - \arg w &= l\pi, l \in \mathbb{Z} \\
 \Leftrightarrow y - \arg w &= 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\
 \Rightarrow z &= i(\arg w + 2k\pi), k \in \mathbb{Z}.
 \end{aligned}$$

Andererseits gilt für $k \in \mathbb{Z}$

$$e^{i \arg w + 2k\pi} = e^{i \arg w} e^{i 2k\pi} = w e^{i 2k\pi} = w(\cos(2k\pi) + i \sin(2k\pi)) = w.$$

Also sind die Zahlen $z_k = i(\arg w + 2k\pi)$ genau die Lösungen der Gleichung $e^z = w$.

(c) Für $z \in \mathbb{C}$ gilt

$$1 = e^0 = e^{z-z} = e^z e^{-z},$$

also $e^z \neq 0$ für alle $z \in \mathbb{C}$.

Für $z \in \mathbb{C}$ gilt zudem

$$\begin{aligned} \sin z &= 0 \\ \Leftrightarrow \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz}) &= 0 \\ \Leftrightarrow e^{i2z} &= 1 \\ \Leftrightarrow 2z &= \arg 1 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ \Leftrightarrow z &= k\pi, k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Schließlich gilt für $z \in \mathbb{C}$, dass

$$\begin{aligned} \cos z &= 0 \\ \Leftrightarrow \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz}) &= 0 \\ \Leftrightarrow e^{i2z} &= -1 \\ \Leftrightarrow 2z &= \arg(-1) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ \Leftrightarrow z &= \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}. \end{aligned} \quad \square$$

Aufgabe 3 (Holomorphe Funktionen). Es sei $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ ein Gebiet und $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph. Zeigen Sie, dass die folgenden Aussagen äquivalent sind.

- (a) f ist konstant.
- (b) $\operatorname{Re} f$ ist konstant.
- (c) $\operatorname{Im} f$ ist konstant.
- (d) $|f|$ ist konstant.

Hinweis: Cauchy–Riemannsche Differentialgleichungen (siehe Aufgabe 2 von Übungsblatt 1) und Satz 4.1.

Lösungsvorschlag. Sei f wie oben und setze $u := \operatorname{Re} f$ sowie $v := \operatorname{Im} f$. Die Implikationen (a) $\Rightarrow$ (b), (a) $\Rightarrow$ (c) und (a) $\Rightarrow$ (d) sind klar.

(b) $\Rightarrow$ (a) Sei u konstant. Dann folgt

$$\begin{aligned} u_x &= u_y = 0 \\ \Rightarrow v_x &= -u_y = 0 \\ \Rightarrow f' &= u_x + iv_x = 0. \end{aligned}$$

Mit Satz 4.1 folgt also, dass f konstant ist, also folgt (a).

(c) $\implies$ (a) Der Beweis funktioniert analog.

(d) $\implies$ (a) Sei $|f|$ konstant und ohne Einschränkung sei auch $|f| \neq 0$. Dann gilt

$$\begin{aligned} f(z) &\neq 0 \quad \forall z \in \Omega \\ \implies y_f &\text{ ist holomorph auf } \Omega \\ \implies \bar{f} = \frac{|f|^2}{f} &= u - iv \text{ ist holomorph auf } \Omega \\ \implies u_x = -v_y = -u_x \\ u_y = v_x &= -u_y \\ \implies f' = u_x + iv_x &= 0, \end{aligned}$$

also ist f konstant. □

Aufgabe 4 (Komplexe Funktionen).

(a) Gegeben sei die Funktion

$$f: \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(z) = \sqrt{|z|} \frac{z + |z|}{|z + |z||}.$$

Zeigen Sie $f(z)^2 = z$ für $z \in \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ und folgern Sie, dass f holomorph ist.

(b) Bestimmen Sie alle Lösungen $z \in \mathbb{C}$ der Gleichung $\cos(z) = \frac{1}{2}$.

(c) Sind $\sin$ und $\cos$ auf $\mathbb{C}$ beschränkt? Begründen Sie.

Lösungsvorschlag. (a) Wir zeigen zunächst, dass $f(z)^2 = z$ für alle $z \in \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ und folgern daraus, dass f holomorph ist.

Zunächst ist f wohldefiniert, da

$$|z + |z|| = 0 \iff z + |z| = 0 \iff z = -|z| \implies z \in (-\infty, 0].$$

Ferner gilt für $z \in \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$

$$\begin{aligned} f(z)^2 &= |z| \frac{(z + |z|)^2}{|z + |z||^2} \\ &= |z| \frac{(z + |z|)^2}{(z + |z|)(\bar{z} + |z|)} \\ &= |z| \frac{z + |z|}{\bar{z} + |z|} \\ &= \frac{z|z| + |z|^2}{\bar{z} + |z|} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= z \frac{|z| + \bar{z}}{\bar{z} + |z|} \\
 &= z.
 \end{aligned}$$

Zudem ist f stetig auf $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ als Komposition stetiger Funktionen und $z \mapsto f^2(z) = z$ für $z \in \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ ist holomorph (da es ein Polynom ist). Somit folgt mit Aufgabe 3 von Übungsblatt 1, dass f holomorph ist.

(b) Sei $z \in \mathbb{C}$ und $w = e^{iz}$. Dann gilt

$$\begin{aligned}
 &\cos z = \frac{1}{2} \\
 \Leftrightarrow &\frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz}) = \frac{1}{2} \\
 \Leftrightarrow &e^{iz} + e^{-iz} = 1 \\
 \Leftrightarrow &w + w^{-1} = 1 \\
 \Leftrightarrow &w^2 + 1 = w \\
 \Leftrightarrow &w^2 - w + 1 = 0 \\
 \Leftrightarrow &\left(w - \frac{1}{2}\right)^2 + 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 0 \\
 \Leftrightarrow &\left(w - \frac{1}{2}\right)^2 = -\frac{3}{4} \\
 \Leftrightarrow &w - \frac{1}{2} = \pm \sqrt{\frac{3}{4}}i \\
 \Leftrightarrow &w = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i \\
 \Leftrightarrow &e^{iz} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = e^{\pm i\pi/3} \\
 \Leftrightarrow &e^{i(z \mp \pi/3)} = 1 \\
 \Leftrightarrow &z \mp \frac{\pi}{3} = 2\pi k \quad k \in \mathbb{Z} \\
 \Leftrightarrow &z = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.
 \end{aligned}$$

(c) Die Funktionen $\sin$ und $\cos$ sind auf $\mathbb{C}$ nicht beschränkt. Für $y > 0$ gilt

$$\begin{aligned}
 |\sin(iy)| &= \left| \frac{1}{2i}(e^{i^2 y} - e^{-i^2 y}) \right| \\
 &= \frac{1}{2}|e^{-y} - e^y| \\
 &= \frac{1}{3}(e^y - e^{-y})
 \end{aligned}$$

$\rightarrow \infty$

für $y \rightarrow \infty$. Somit ist $\sin$ auf $\mathbb{C}$ unbeschränkt. Für $\cos$ folgt die Unbeschränktheit aus einer analogen Rechnung. $\square$

Aufgabe 5 (Wegintegrale).

- (a) Es seien $a \in \mathbb{C}, r > 0, n \in \mathbb{N}$ und $\gamma(t) := a + re^{int}$ ($t \in [0, 2\pi]$) (n -mal positiv durchlaufener Kreis). Berechnen Sie die Weglänge $L(\gamma)$.
- (b) Berechnen Sie das Wegintegral von $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = \bar{z}z^2$ mit $\gamma(t) := e^{i(\pi-t)}$ und $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$.
- (c) Es sei $r > 0$ und der Weg γ_r durch $\gamma_r(t) := r + it$ ($0 \leq t \leq r$) gegeben. Zeigen Sie:

$$\int_{\gamma_r} e^{-z^2} dz \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow \infty).$$

Lösungsvorschlag.

- (a) Es gilt $\gamma' = rine^{int}$ für alle $t \in [0, 2\pi]$. Somit folgt

$$\begin{aligned} L(\gamma) &= \int_0^{2\pi} |\gamma'(t)| dt \\ &= \int_0^{2\pi} |rine^{int}| dt \\ &= \int_0^{2\pi} |r||i||n||e^{int}| dt \\ &= rn \int_0^{2\pi} dt \\ &= 2\pi rn. \end{aligned}$$

- (b) Für $t \in [0, 2\pi]$ gilt

$$f(\gamma(t)) = \overline{\gamma(t)}\gamma(t)^2 = e^{-i(\pi-t)}e^{2i(\pi-t)} = e^{i(\pi-t)}$$

und $\gamma'(t) = -ie^{i(\pi-t)}$. Somit folgt

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_0^{\pi/2} f(\gamma(t))\gamma'(t) dt$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^{\pi/2} e^{i(\pi-t)}(-i)e^{i(\pi-t)} dt \\
 &= -i \int_0^{\pi/2} e^{2i(\pi-t)} dt \\
 &= -i \int_0^{\pi/2} e^{-2it} dt \\
 &= -i \left[\frac{1}{2i} e^{-2it} \right]_0^{2\pi} \\
 &= \frac{1}{2}(-1 - 1) \\
 &= -1.
 \end{aligned}$$

(c) Für $t \in [0, r]$ gilt $\gamma'(t) = 1$. Also gilt

$$\begin{aligned}
 &\int_{\gamma_r} e^{-z^2} dz \\
 &= \int_0^r e^{-\gamma_r(t)^2} \gamma_r'(t) dt \\
 &= i \int_0^r e^{-(r^2-t^2)-i2rt} dt \\
 \Rightarrow \left| \int_{\gamma_r} e^{-z^2} dz \right| &\leq \int_0^r |e^{-(r^2-t^2)}| |e^{-i2rt}| dt \\
 &= \int_0^r e^{-r^2-t^2} dt \\
 &\leq \int_0^r e^{-r^2+rt} dt \\
 &= e^{-r^2} \int_0^r e^{rt} dt \\
 &= e^{-r^2} \frac{1}{r} \left[\frac{1}{r} e^{rt} \right]_0^r \\
 &= \frac{e^{-r^2}}{r} (e^{r^2} - 1) \\
 &= \frac{1}{r} (1 - e^{-r^2}) \\
 &\leq \frac{1}{r} \\
 &\rightarrow 0
 \end{aligned}$$

für $r \rightarrow \infty$. Damit folgt die Behauptung.

□