Analysis für das Lehramt Lösungsvorschlag zu Übungsblatt 03

Aufgabe 1 (Wegintegrale).

(a) Berechnen Sie das Wegintegral von $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = |z|^2$ mit γ eine Parametrisierung des Randes der Menge $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z \in (0, 1)\}$, wobei der Rand entgegen dem Uhrzeigersinn durchlaufen wird.

(b) Es sei $R > 0$ und $\gamma(t) := Re^{it}$ ($t \in [0, 2\pi]$). Berechnen Sie für alle $n \in \mathbb{Z}$ das Wegintegral

$$\int_{\gamma} z^n dz.$$

(c) Bestimmen Sie für alle $n \in \mathbb{N}$ den Wert des reellen Integrals

$$\int_0^{2\pi} (\cos(t))^{2n} dt,$$

indem Sie eine geeignete Funktion entlang des Weges $\gamma(t) := e^{it}$ ($t \in [0, 2\pi]$) integrieren.

Hinweis: Schreiben Sie $(\cos(t))^{2n}$ mithilfe der exp-Funktion und nutzen Sie die Definition des Wegintegrals, um auf die zu integrierende Funktion zu schließen.

Lösungsvorschlag.

(a) Definiere $\gamma: [0, 4] \rightarrow \mathbb{C}$ durch

$$\gamma(t) = \begin{cases} \gamma_1(t) = t & t \in [0, 1), \\ \gamma_2(t) = 1 + i(t - 1) & t \in [1, 2), \\ \gamma_3(t) = (1 + i) - (t - 2) & t \in [2, 3), \\ \gamma_4(t) = i - i(t - 3) & t \in [3, 4]. \end{cases}$$

Dann ist γ stückweise stetig differenzierbar und berandet die gegebene Menge gegen den Uhrzeigersinn. Es gilt

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z) dz &= \int_0^4 f(\gamma(t))\gamma'(t) dt \\ &= \sum_{k=1}^4 \int_{k-1}^k f(\gamma_k(t))\gamma_k'(t) dt \\ &= \int_0^1 t^2 dt + \int_1^2 |1 + i(t - 1)|^2 i dt + \int_2^3 |(1 + i) - (t - 2)|^2 (-1) dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & + \int_3^4 |i - i(t-3)|^2 dt \\
 = & \int_0^1 t^2 dt + \int_0^1 i|1+it|^2 dt + \int_0^1 (-1)|(1+i)|^2 dt + \int_0^1 |(1-t)i|^2(-i) dt \\
 = & \int_0^1 t^2 + i(1+t^2) - (2(1-t) + t^2) - i(1-t)^2 dt \\
 = & \int_0^1 (-2+2t) + i(1+t^2 - (1-2t+t^2)) dt \\
 = & \int_0^1 (-2+2t) + i2t dt \\
 = & [-2t + t^2]_0^1 + [i2t]_0^1 \\
 = & -2 + 1 + i \\
 = & -1 + i.
 \end{aligned}$$

- (b) Sei $R > 0$ und $\gamma(t) = Re^{it}$ für $t \in [0, 2\pi]$. Sei $n \in \mathbb{Z}$ mit $n \neq -1$ und setze $\Omega = \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Es gilt, dass Ω in $\mathbb{C}$ offen ist und γ ein geschlossener, stückweise stetig differenzierbarer Weg in Ω ist. Weiter gilt, dass die Abbildung $z \mapsto z^n$ auf Ω die Stammfunktion $z \mapsto z^{n+1}/(n+1)$ hat. Mit Satz 7.1 folgt, dass

$$\int_{\gamma} z^n dz = 0.$$

Sei $n = -1$. Dann gilt

$$\begin{aligned}
 \int_{\gamma} z^{-1} dz &= \int_0^{2\pi} \gamma(t)^{-1} \gamma'(t) dt \\
 &= \int_0^{2\pi} R^{-1} e^{-it} i R e^{it} dt \\
 &= \int_0^{2\pi} i dt \\
 &= 2\pi i
 \end{aligned}$$

Somit ergibt sich

$$\int_{\gamma} z^n dz = \begin{cases} 2\pi i & n = -1, \\ 0 & n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}. \end{cases}$$

(c) Sei $n \in \mathbb{N}$ und $\gamma(t) = e^{it}$ für $t \in [0, 2\pi]$. Wir suchen so eine Funktion, dass

$$\int_0^{2\pi} (\cos t)^{2n} dt = \int_{\gamma} f(z) dz = \int_0^{2\pi} f(\gamma(t))\gamma'(t) dt,$$

also

$$(\cos t)^{2n} = f(\gamma(t))\gamma'(t) = f(\gamma(t))i\gamma(t)$$

für $t \in [0, 2\pi]$. Es gilt

$$(\cos t)^{2n} = \left(\frac{e^{it} + e^{-it}}{2}\right)^{2n} = \left(\frac{\gamma(t) + \gamma(t)^{-1}}{2}\right)^{2n} = \frac{1}{i\gamma(t)} \left(\frac{\gamma(t) + \gamma(t)^{-1}}{2}\right)^{2n} i\gamma(t).$$

Wir definieren

$$f(z) = \frac{1}{iz} \left(\frac{z + z^{-1}}{2}\right)^{2n}$$

für $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Damit erhalten wir

$$\int_0^{2\pi} (\cos t)^{2n} dt = \int_{\gamma} f(z) dz = \frac{1}{i2^{2n}} \int_{\gamma} \frac{1}{z} \left(z + \frac{1}{z}\right)^{2n} dz. \quad (1)$$

Weiter gilt für $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$

$$\frac{1}{z} \left(z + \frac{1}{z}\right)^{2n} = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} z^{2n-k} \left(\frac{1}{z}\right)^k = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} z^{2n-2k-1}.$$

Damit folgt mit Gleichung (1) und Punkt (b)

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} (\cos t)^{2n} dt &= \frac{1}{i2^{2n}} \int_{\gamma} \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} z^{2n-2k-1} dz \\ &= \frac{1}{i2^{2n}} \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} \int_{\gamma} z^{2n-2k-1} dz \\ &= \frac{1}{i2^{2n}} \binom{2n}{n} \int_{\gamma} z^{-1} dz \\ &= \frac{\pi}{2^{2n-1}} \binom{2n}{n}. \quad \square \end{aligned}$$

Aufgabe 2 (Cauchyscher Integralsatz, Cauchysche Integralformel).

(a) Berechnen Sie den Wert der zwei folgenden reellen Integrale

$$I_1 := \int_0^{2\pi} e^{-\sin(t)} \cos(t + \cos(t)) dt$$

und

$$I_2 := \int_0^{2\pi} e^{-\sin(t)} \sin(t + \cos(t)) dt,$$

indem Sie eine geeignete Funktion längs der Einheitskreislinie integrieren.

Hinweis: Berechnen Sie das komplexe Integral $I_1 + iI_2$.

(b) Für $r > 0$ sei $\gamma_r(t) := re^{it}$ für $t \in [0, 2\pi]$. Berechnen Sie den Wert der folgenden Wegintegrale:

(i) $\int_{\gamma_1} \frac{\cos(\pi z)}{z} dz,$

(ii) $\int_{\gamma_2} \frac{z^3}{z^2 + 1} dz,$

(iii) $\int_{\gamma_3} \frac{e^z}{z^2 + 2z} dz$ und

(iv) $\int_{\gamma_1} \frac{z^3}{z^2 + 4} dz.$

Lösungsvorschlag.

(a) Wir berechnen das komplexe Integral $I_1 + iI_2$ und wählen als Parametrisierung der Einheitskreislinie den Weg $\gamma(t) = e^{it}$ für $t \in [0, 2\pi]$. Dann erhalten wir

$$\begin{aligned} I_1 + iI_2 &= \int_0^{2\pi} e^{-\sin t} (\cos(t + \cos t) + i \sin(t + \cos t)) dt \\ &= \int_0^{2\pi} e^{-\sin t} e^{i(t + \cos t)} dt \\ &= \int_0^{2\pi} e^{i(\cos t + i \sin t)} e^{it} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \exp(ie^{it}) e^{it} \frac{i}{i} dt \\ &= \int_0^{2\pi} f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt \end{aligned}$$

$$= \int_{\gamma} f(z) dz,$$

wobei $f(z) = -ie^{iz}$ für $z \in \mathbb{C}$ holomorph ist. Mit dem Cauchyschen Integralsatz (Satz 7.3) beziehungsweise Satz 7.1 folgt nun

$$I_1 + iI_2 = \int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

Somit ergibt sich für die reellen Integrale I_1 und I_2

$$\begin{aligned} I_1 &= \operatorname{Re} 0 = 0 \\ I_2 &= \operatorname{Im} 0 = 0. \end{aligned}$$

(b) Für $r > 0$ sei $\gamma_r(t) = re^{it}$ für $t \in [0, 2\pi]$.

(i) Die Funktion $f(z) = \cos(\pi z)$ für $z \in \mathbb{C}$ ist in $\mathbb{C}$ holomorph und γ_r ist ein geschlossener, stückweise stetig differenzierbarer Weg in $\mathbb{C}$. Da $z_0 = 0$ im Inneren des Integrationsweges liegt, also $\operatorname{ind}_{\gamma_1}(z_0) = 1$, folgt mit der Cauchyschen Integralformel (Satz 7.4)

$$\int_{\gamma_1} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \int_{\gamma_1} \frac{\cos(\pi z)}{z} dz = 2\pi i f(z_0) \operatorname{ind}_{\gamma_1}(z_0) = 2\pi i.$$

(ii) Es gilt für $z \in \mathbb{C} \setminus \{\pm i\}$

$$\frac{1}{z^2 + 1} = \frac{1}{(z + i)(z - i)} = \frac{i/2}{z + i} - \frac{i/2}{z - i}.$$

Weiter gilt, dass die Punkte i und $-i$ im Inneren des Integrationsweges liegen und somit $\operatorname{ind}_{\gamma_2}(i) = 1 = \operatorname{ind}_{\gamma_2}(-i)$ gilt. Die Funktion $z \mapsto i/2z^3$ für $z \in \mathbb{C}$ ist holomorph in $\mathbb{C}$ und damit folgt mit der Cauchyschen Integralformel

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_2} \frac{z^3}{z^2 + 1} &= \int_{\gamma_2} \frac{iz^3/2}{z + i} dz - \int_{\gamma_2} \frac{iz^3/2}{z - i} dz \\ &= 2\pi i \left[\frac{iz^3}{2} \right]_{z=-i} \operatorname{ind}_{\gamma_2}(-i) - 2\pi i \left[\frac{iz^3}{2} \right]_{z=i} \operatorname{ind}_{\gamma_2}(i) \\ &= 2\pi i \frac{i(-i)^3}{2} - 2\pi i \frac{ii^3}{2} \\ &= -\pi i - \pi i \\ &= -2\pi i. \end{aligned}$$

(iii) Wieder folgt mittels Partialbruchzerlegung für $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -2\}$

$$\frac{1}{z^2 + 2z} = \frac{1}{z(z+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{z+2} \right).$$

Die Punkte 0 und -2 liegen im Inneren des Integrationsweges und somit gilt $\text{ind}_{\gamma_3}(0) = 1 = \text{ind}_{\gamma_3}(-2)$. Die Funktion $z \mapsto e^z$ ist holomorph in $\mathbb{C}$ und damit folgt mit der Cauchyschen Integralformel

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_3} \frac{e^z}{z^2 + 2z} dz &= \frac{1}{2} \left(\int_{\gamma_3} \frac{e^z}{z} dz - \int_{\gamma_3} \frac{e^z}{z+2} dz \right) \\ &= \frac{1}{2} (2\pi i [e^z]_{z=0} \text{ind}_{\gamma_3}(0) - 2\pi i [e^z]_{z=-2} \text{ind}_{\gamma_3}(-2)) \\ &= \frac{1}{2} (2\pi i - 2\pi i e^{-2}) \\ &= (1 - e^{-2})\pi i. \end{aligned}$$

(iv) Der Nenner $z^2 + 4$ hat nur die Nullstellen $2i$ und $-2i$, folglich ist die Funktion $z \mapsto z^3(z^2 + 4)^{-1}$ auf $\Omega = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 2\}$ holomorph. Da γ_1 ein geschlossener, stückweise stetig differenzierbarer Weg in Ω ist, gilt nach dem Cauchyschen Integralsatz (Satz 7.3)

$$\int_{\gamma_1} \frac{z^3}{z^2 + 4} dz = 0. \quad \square$$

Aufgabe 3 (Index, Cauchysche Integralformel). Bestimmen Sie für den skizzierten, geschlossenen und in Pfeilrichtung einmal durchlaufenen Weg γ jeweils die Umlaufzahl $\text{ind}_{\gamma}(0)$ sowie das Wegintegral

$$\int_{\gamma} \frac{\exp(z^2) - 3 \cos(z)}{z} dz.$$

Lösungsvorschlag. Wir bestimmen zunächst die Umlaufzahlen graphisch in den folgenden Bildern.

(a)

(b)

(c)

Wir definieren $f(z) = \exp(z^2) - 3 \cos z$ für $z \in \mathbb{C}$. Es gilt $f \in H(\mathbb{C})$ und γ_1, γ_2 und γ_3 sind geschlossene, stückweise stetig differenzierbare Wege in $\mathbb{C}$, wobei $0 \notin \gamma_k^*$ für $k = 1, \dots, 3$. Es

folgt mit der Cauchyschen Integralformel (Satz 7.4)

$$\begin{aligned}\int_{\gamma} \frac{\exp(z^2) - 3 \cos z}{z} dz &= \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - 0} dz \\ &= 2\pi i f(0) \operatorname{ind}_{\gamma}(0) \\ &= 2\pi i (-2) \operatorname{ind}_{\gamma}(0) \\ &= -4\pi i \operatorname{ind}_{\gamma}(0).\end{aligned}$$

Damit ergibt sich

(a) $\int_{\gamma} \frac{f(z)}{z} dz = 8\pi i,$

(b) $\int_{\gamma} \frac{f(z)}{z} dz = -8\pi i$ und

(c) $\int_{\gamma} \frac{f(z)}{z} dz = 4\pi i.$

□