Analysis für das Lehramt Lösungsvorschlag zu Übungsblatt 05

Aufgabe 1 (Ganze Funktionen).

- (a) Sei $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ eine ganze Funktion, die nicht-konstant ist. Zeigen Sie, dass das Bild von f dicht in $\mathbb{C}$ ist.
- (b) Sei $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ eine ganze Funktion mit $f(z) \notin \mathbb{R}$ für alle $z \in \mathbb{C}$. Zeigen Sie, dass f konstant ist.
- (c) Zeigen Sie, dass es keine Funktion $f \in H(\mathbb{C} \setminus \{0\})$ gibt mit

$$|f(z)| \geq \frac{1}{\sqrt{|z|}} \quad \text{für alle } z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}. \quad (1)$$

Lösungsvorschlag.

- (a) Angenommen, $f(\mathbb{C}) \subseteq \mathbb{C}$ wäre nicht dicht in $\mathbb{C}$. Dann existiert so ein $w \in \mathbb{C} \setminus f(\mathbb{C})$ und ein $\delta > 0$, dass $B(w, \delta) \subseteq \mathbb{C} \setminus f(\mathbb{C})$. Wir definieren

$$g(z) = \frac{1}{f(z) - w}$$

für $z \in \mathbb{C}$. Dann ist $g \in H(\mathbb{C})$ und

$$|g(z)| = \frac{1}{|f(z) - w|} \leq \frac{1}{\delta}$$

für $z \in \mathbb{C}$. Somit ist g beschränkt auf $\mathbb{C}$. Mit dem Satz von Liouville (Satz 8.6) folgt, dass g konstant ist. Das bedeutet aber, dass auch f konstant ist, was der Voraussetzung widerspricht. Somit war die Annahme falsch und es gilt, $f(\mathbb{C}) \subseteq \mathbb{C}$ ist dicht.

- (b) Angenommen, f wäre nicht konstant. Da f eine ganze Funktion ist, folgt mit Punkt (a), dass $f(\mathbb{C}) \subseteq \mathbb{C}$ dicht ist. Weil nach Voraussetzung $f(\mathbb{C}) \subseteq \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ und das Bild von f dicht in $\mathbb{C}$ ist, existieren solche Zahlen $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, dass $\text{Im } f(z_1) < 0$ und $\text{Im } f(z_2) > 0$. Da $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ aus zwei Zusammenhangskomponenten besteht, besteht das Bild von f auch aus mindestens zwei Zusammenhangskomponenten. Nach Satz 8.8 (a) ist $f(\mathbb{C})$ ein Gebiet (da f als nicht konstant angenommen ist), also insbesondere zusammenhängend. Dies ist ein Widerspruch, also war die Annahme falsch und die Behauptung ist bewiesen.
- (c) Angenommen, es gäbe eine Funktion $f \in H(\mathbb{C} \setminus \{0\})$, die Gleichung (1) erfüllt. Dann ist f nullstellenfrei auf $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ und somit ist die Funktion g mit

$$g(z) = \frac{1}{f(z)}$$

für $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ dort wohldefiniert und holomorph. Es gilt für $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$

$$|g(z)| = \frac{1}{|f(z)|} \stackrel{(1)}{\leq} \sqrt{|z|} \rightarrow 0 \quad (2)$$

für $z \rightarrow 0$. Das heißt, g kann stetig nach 0 (mit Funktionswert 0) fortgesetzt werden. Nach dem Riemannsches Hebbarkeitssatz ist 0 eine hebbare Singularität. Wir bezeichnen die holomorphe Fortsetzung von g auf ganz $\mathbb{C}$ wieder mit g . Die einzige Nullstelle von g ist 0, das heißt, es existieren so ein $n \in \mathbb{N}$ und so eine Funktion $g_1 \in H(\mathbb{C})$ mit $g_1(0) \neq 0$, dass

$$g(z) = z^n g_1(z) \quad (3)$$

für $z \in \mathbb{C}$. Da g außer in der 0 keine Nullstelle besitzt, hat g_1 auf ganz $\mathbb{C}$ keine Nullstellen. Wir definieren $h(z) = z^{2n-1} g_1(z)^2$ für $z \in \mathbb{C}$. Es gilt, dass h ganz ist, $h(0) = 0$ und für $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ gilt

$$|h(z)| = \left| \frac{z^{2n}}{z} g_1(z)^2 \right| = \frac{1}{|z|} |(z^n g_1(z))^2| \stackrel{3}{=} \frac{1}{|z|} |g(z)|^2 \stackrel{2}{\leq} \frac{1}{|z|} |z| = 1.$$

Somit ist h auch beschränkt und mit dem Satz von Liouville folgt, dass h konstant ist, also $h(z) = h(0) = 0$ für alle $z \in \mathbb{C}$.

Sei nun $z \neq 0$ und somit auch $z^{2n-1} \neq 0$. Aus der Definition von h folgt, dass $g_1(z) = 0$, was ein Widerspruch ist, da g_1 nullstellenfrei ist. Daraus folgt die Behauptung. $\square$

Aufgabe 2 (Residuensatz).

(a) Sei $\gamma(t) := e^{it}$ ($t \in [0, 2\pi]$). Berechnen Sie den Wert der folgenden Wegintegrale:

(i) $\int_{\gamma} \frac{z}{z^4 - 4z^2 + 2} dz$ und

(ii) $\int_{\gamma} \frac{z}{e^{iz} - 1} dz$.

(b) Bestimmen Sie den Wert der folgenden reellen Integrale:

(i) $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{1 + (\sin(t))^2} dt$ und

(ii) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{t^2 - 2}{(t^2 + 2)(t^2 + 4)} dt$.

Lösungsvorschlag.

(a) (i) Es gilt

$$z^4 - 4z^2 + 2 = 0$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow (z^2 - 2)^2 = 2 \\ &\Leftrightarrow z_1 = \sqrt{2 + \sqrt{2}}, z_2 = -\sqrt{2 + \sqrt{2}}, z_3 = \sqrt{2 - \sqrt{2}}, z_4 = -\sqrt{2 - \sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Wir setzen $A = \{z_1, z_2, z_3, z_4\}$. Weiter gilt

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow z_1} (z - z_1)f(z) &= \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{z}{(z - z_2)(z^2 - 2 + \sqrt{2})} \\ &= \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2\sqrt{2 + \sqrt{2}}(2 + \sqrt{2} - 2 + \sqrt{2})} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{8} \end{aligned}$$

sowie

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow z_3} (z - z_3)f(z) &= \lim_{z \rightarrow z_3} \frac{z}{(z^2 - 2 - \sqrt{2})(z - z_4)} \\ &= \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{(2 - \sqrt{2} - 2 - \sqrt{2})(2\sqrt{2 - \sqrt{2}})} \\ &= -\frac{\sqrt{2}}{8}. \end{aligned}$$

Somit und mit analogen Rechnungen für z_2 und z_4 folgt $\text{res}(f, z_1) = \text{res}(f, z_2) = \sqrt{2}/8$ und $\text{res}(f, z_3) = \text{res}(f, z_4) = -\sqrt{2}/8$. Diese Punkte sind Pole erster Ordnung und die einzigen Singularitäten von f , überall sonst ist f holomorph, also ist f meromorph.

Der Weg γ ist ein geschlossener, stückweise stetig differenzierbarer Weg, der nicht durch die Singularitäten läuft, da $|z_1| = |z_2| > 1$ und $|z_3| = |z_4| < 1$. Insbesondere gilt dann $\text{ind}_\gamma(z_1) = \text{ind}_\gamma(z_2) = 0$ und $\text{ind}_\gamma(z_3) = \text{ind}_\gamma(z_4) = 1$. Mit dem Residuensatz folgt nun

$$\begin{aligned} \int_\gamma f(z) dz &= 2\pi i \sum_{a \in A} \text{res}(f, a) \text{ind}_\gamma(a) \\ &= -\frac{\sqrt{2}}{2} \pi i. \end{aligned}$$

(ii) Wir berechnen die Nullstellen des Nenners. Es gilt für $z = x + iy$ mit $x, y \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} e^{iz} - 1 &= 0 \\ \Leftrightarrow \sin x = 0 \wedge \cos x = e^y \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow x = k\pi \ (k \in \mathbb{Z}) \wedge \cos x = e^y$$

$$\Leftrightarrow x = 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z}) \wedge y = 0$$

$$\Leftrightarrow z \in \{2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Definiere $f(z) = z/(e^{iz} - 1)$ auf $\mathbb{C} \setminus \{2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$. Dann ist f auf diesem Gebiet holomorph. Die Punkte $z_k = 2k\pi$ für $k \in \mathbb{Z}$ sind isolierte Singularitäten von f . Lediglich z_0 liegt im Inneren des Integrationswegs, das heißt $\text{ind}_\gamma(z_0) = 1$ und $\text{ind}_\gamma(z_k) = 0$ für $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Da f also meromorph auf $\mathbb{C}$ ist, folgt mit dem Residuensatz

$$\begin{aligned} \int_\gamma f(z) dz &= 2\pi i \sum_{k \in \mathbb{Z}} \text{res}(f, z_k) \text{ind}_\gamma(z_k) \\ &= 2\pi i \text{res}(f, 0). \end{aligned} \tag{4}$$

Weiter gilt für $z \neq 0$ und z nahe 0

$$\frac{z}{e^{iz} - 1} = \left(\frac{e^{iz} - 1}{z} \right)^{-1} \rightarrow \left(\left[\frac{d}{dz} e^{iz} \right]_{z=0} \right)^{-1} = -i$$

für $z \rightarrow 0$. Somit lässt sich f stetig nach 0 fortsetzen. Nach dem Riemannschen Hebbarkeitssatz ist 0 eine hebbare Singularität, insbesondere gilt dann $\text{res}(f, 0) = 0$. Aus Gleichung (4) erhalten wir

$$\int_\gamma \frac{z}{e^{iz} - 1} dz = 0.$$

(b) (i) Für $t \in \mathbb{R}$ gilt mit $z = e^{it}$

$$\begin{aligned} (\sin t)^2 &= \frac{e^{2it} - 2 + e^{-2it}}{-4} \\ &= \frac{z^2 - 2 + z^{-2}}{-4} \\ &= -\frac{z^4 - 2z^2 + 1}{4z^2} \\ \Rightarrow 1 + (\sin t)^2 &= \frac{-z^4 + 6z^2 - 1}{4z^2} \\ \Rightarrow \frac{1}{1 + (\sin t)^2} &= -\frac{4iz}{-z^4 + 6z^2 - 1} iz. \end{aligned}$$

Definiere $f(z) = (4iz/(z^4 - 6z^2 + 1))$, wobei der Definitionsbereich noch zu bestimmen ist. Dann gilt

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{1 + (\sin t)^2} dt = \int_{-\pi}^{\pi} f(\gamma(t))\gamma'(t) dt = \int_\gamma f(z) dz. \tag{5}$$

Wir berechnen nun die Pole von f . Es gilt

$$\begin{aligned} z^4 - 6z^2 + 1 &= 0 \\ \Leftrightarrow (z^2 - 3)^2 &= 8 \\ \Leftrightarrow z^2 &= 3 \pm 2\sqrt{2} \\ \Leftrightarrow z_{1,2} &= \pm\sqrt{3 + 2\sqrt{2}} \quad \vee \quad z_{3,4} = \pm\sqrt{3 - 2\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Es gilt

$$(z - z_3)f(z) \rightarrow \frac{4\sqrt{3 - 2\sqrt{2}}i}{-4\sqrt{2}\sqrt{3 - 2\sqrt{2}}} = -\frac{1}{2\sqrt{2}}i$$

und analog für z_4 . In z_3 und z_4 liegen Pole erster Ordnung und es gilt $\text{res}(f, z_3) = \text{res}(f, z_4) = -1/(2\sqrt{2})i$. Analog sieht man, dass in z_1 und z_2 Pole erster Ordnung liegen mit Index 0. Setze $A = \{z_1, \dots, z_4\}$. Dann $f \in H(\mathbb{C} \setminus A)$, also f meromorph. Mit dem Residuensatz folgt aus Gleichung (5)

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{1 + (\sin t)^2} dt = \sqrt{2}\pi.$$

- (ii) Setze $P_1 = z^2 - 2$ und $P_2 = (z^2 + 2)(z^2 + 4)$ für $z \in \mathbb{C}$. Der Grad von P_2 ist 4 und damit echt größer als 2, der Grad von P_1 ; zudem ist $P_2(t) \neq 0$ für $t \in \mathbb{R}$. Wir berechnen die Residuen der Funktion $R(z) = P_1(z)/P_2(z)$. Es gilt $P_2(z) = 0 \Leftrightarrow z \in \{\pm\sqrt{2}i, \pm 2i\} = A$. Für $z \in A$ handelt es sich um Pole erster Ordnung von R :

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow \sqrt{2}i} (z - \sqrt{2}i)R(z) &= \frac{\sqrt{2}}{2}i \\ \lim_{z \rightarrow 2i} (z - 2i)R(z) &= \frac{3}{4}i. \end{aligned}$$

Mit Satz 9.2 folgt

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{t^2 - 2}{(t^2 + 2)(t^2 + 4)} dt = \pi\left(\frac{3}{2} - \sqrt{2}\right). \quad \square$$

Aufgabe 3 (Differentialgleichungen mit getrennten Veränderlichen).

- (a) Es seien $t_0 \in \mathbb{R}$ und $x_0 \in \mathbb{R}$. Bestimmen Sie die Lösung des Anfangswertproblems

$$u'(t) = 1 + u(t)^2, \quad u(t_0) = x_0 \quad (6)$$

und geben Sie das maximale Existenzintervall (ω_-, ω_+) an.

(b) Es sei folgendes Anfangswertproblem gegeben:

$$u'(t) = e^{u(t)} \sin(t), \quad u(0) = 0. \quad (7)$$

Bestimmen Sie die Lösung des angegebenen Anfangswertproblems und das maximale Existenzintervall (ω_-, ω_+) .

Lösungsvorschlag.

(a) Setze $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(t, x) = 1 + x^2$. Dann ist f stetig auf $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ und lokal Lipschitz stetig bezüglich x , da f stetig partiell differenzierbar ist. Mit Picard–Lindelöf folgt, dass Gleichung (6) eindeutig lösbar ist und eine nicht fortsetzbare Lösung $u : (\omega_-, \omega_+) \rightarrow \mathbb{R}$ besitzt. Weiter gilt $f(t, x) = g(t)h(x)$ mit $g(t) = 1$ für $t \in \mathbb{R}$ und $h(x) = 1 + x^2$ für $x \in \mathbb{R}$. Es gilt $h(x_0) \geq 1$, also $h(x_0) \neq 0$ und $g \neq 0$. Somit erhält man

$$\begin{aligned} t - t_0 &= \int_{t_0}^t g(s) \, ds \\ &= \int_{x_0}^{u(t)} \frac{1}{h(x)} \, dx \\ &= \int_{x_0}^{u(t)} \frac{1}{1 + x^2} \, dx \\ &= [\arctan x]_{x_0}^{u(t)} \\ &= \arctan u(t) - \arctan x_0 \\ \Leftrightarrow \arctan u(t) &= \arctan x_0 + t - t_0 \\ \Rightarrow u(t) &= \tan(\arctan x_0 + t - t_0), \end{aligned}$$

wobei $\arctan x_0 + t - t_0 \in (-\pi/2, \pi/2)$. Also hat Gleichung (6) die Lösung $u(t) = \tan(\arctan x_0 + t - t_0)$ auf $I = (-\pi/2 + t_0 - \arctan x_0, \pi/2 + t_0 - \arctan x_0)$.

(b) Es sei $f(t, x) = e^x \sin t$ für $t, x \in \mathbb{R}$. Dann ist f stetig und stetig partiell differenzierbar, somit lokal Lipschitz stetig bezüglich x . Mit Picard–Lindelöf folgt, dass Gleichung (7) eindeutig lösbar ist und die nicht fortsetzbare Lösung $u : (\omega_-, \omega_+) \rightarrow \mathbb{R}$ besitzt. Weiter gilt $f(t, x) = g(t)h(x)$ mit $g(t) = \sin t$ und $h(x) = e^x$ für $t, x \in \mathbb{R}$, also

$$\int_0^t g(s) \, ds = \int_{x_0}^{u(t)} \frac{1}{h(x)} \, dx, \quad (8)$$

wobei $t_0 = x_0 = 0$. Die linke Seite ergibt

$$\int_0^t g(s) \, ds = \int_0^t \sin s \, ds = [-\cos s]_{s=0}^t = -\cos t + 1$$

und für die rechte Seite gilt

$$\int_0^{u(t)} \frac{1}{h(x)} dx = \int_0^{u(t)} e^{-x} dx = [-e^{-x}]_{x=0}^{u(t)} = -e^{-u(t)} + 1.$$

Aus Gleichung (8) folgt

$$\begin{aligned} e^{-u(t)} &= \cos t, \quad t \in (\omega_-, \omega_+) \\ \implies -u(t) &= \log \cos t, \quad \cos t > 0. \end{aligned}$$

Somit ist die nicht fortsetzbare Lösung von Gleichung (7) gegeben durch $u(t) = -\log \cos t$ für $t \in (-\pi/2, \pi/2)$.

□

Aufgabe 4.

(a) Es sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und u eine Lösung des autonomen Systems

$$u'(t) = f(u(t)). \tag{9}$$

(i) Es sei $u : (\omega_-, \omega_+) \rightarrow \mathbb{R}$ die nicht fortsetzbare Lösung von Gleichung (9) mit $u(0) = 0$. Ferner sei f lokal Lipschitz stetig und $f(-1) = f(1) = 0$. Zeigen Sie, dass u auf ganz $\mathbb{R}$ definiert ist.

Hinweis: Zeigen Sie, dass die Werte von u in einem beschränkten Intervall bleiben.

(ii) Es sei $J \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall und $u : J \rightarrow \mathbb{R}$ eine Lösung von Gleichung (9). Für ein $t_0 \in J$ gelte $u(t_0) > 0$ und f erfülle $f(0) > 0$.

(1) Zeigen Sie, dass $u(t) > 0$ für $t \geq t_0$.

(2) Zeigen Sie, dass $f(0) \geq 0$ nicht für die obige Aussage reicht.

(b) Es seien $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ und $f \in C([a, b] \times \mathbb{R})$. Die Funktion $v \in C^1([a, b], \mathbb{R})$ erfülle die strikte Differentialungleichung

$$v'(t) < f(t, v(t))$$

für alle $t \in (a, b)$. Sei außerdem $y : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Lösung des Anfangswertproblems

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad y(a) = y_0$$

für ein $y_0 > v(a)$.

Zeigen Sie, dass $v(t) < y(t)$ für alle $t \in [a, b]$.

Lösungsvorschlag.

- (a) (i) Wir zeigen, dass die Werte von u zwischen -1 und 1 bleiben. Nach Satz 10.2 trifft genau eine der drei folgenden Situationen ein:

Fall 1: $u'(t) = 0$ für alle $t \in (\omega_-, \omega_+)$. In diesem Fall ist u konstant und nach Bemerkung 3 nach Satz 10.1 ist u auf ganz $\mathbb{R}$ definiert.

Fall 2: $u'(t) > 0$ für alle $t \in (\omega_-, \omega_+)$. Wir setzen $t_0 = \inf\{t > 0 : u(t) > 1\}$. Aufgrund der Stetigkeit von u folgt, dass $u(t_0) = 1$. Damit folgt $u'(t_0) = f(u(t_0)) = f(1) = 0$, ein Widerspruch. Somit liegt die Menge G_+ aus Bemerkung 3 nach Satz 10.1 für alle $c > 0$ in einer kompakten Menge. Ein analoges Argument gilt für negative t . Somit ist u nach dieser Bemerkung auf ganz $\mathbb{R}$ definiert.

Fall 3: $u'(t) < 0$ für alle $t \in (\omega_-, \omega_+)$. Dieser Fall ist analog zum zweiten Fall.

- (ii) (1) Wir nehmen an, die Behauptung wäre falsch, das heißt, u wird irgendwann nichtpositiv. Definiere $t_1 = \inf\{t \geq t_0 : u(t) \leq 0\}$. Da u stetig ist, gilt also $u(t_1) = 0$. Außerdem ist $u'(t_1) = f(u(t_1)) = f(0) > 0$. Andererseits gilt durch Betrachtung des linksseitigen Differenzenquotienten

$$u'(t_1) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{1}{h}(u(t_1 + h) - u(t_1)) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{1}{h}u(t_1 + h) \leq 0.$$

Dies ist ein Widerspruch und es folgt die Behauptung.

- (2) Die Funktion $u(t) = -t^3$ für $t \in \mathbb{R}$ ist eine Lösung von Gleichung (9) mit $f(x) = -3|x|^{2/3}$ für $x \in \mathbb{R}$. Hier gilt $u(-1) > 0$, $u(1) < 0$ und $f(0) = 0$.

- (b) Angenommen, die Behauptung wäre falsch. Dann gibt es ein $t \in [a, b]$ mit $v(t) \geq y(t)$. Setze $t_1 = \inf\{t \in [a, b] : v(t) \geq y(t) > a\}$. Nach Definition von t_1 gilt $v(t) < y(t)$ für alle $t \in (a, t_1]$. Da v und y stetig sind, folgt $v(t_1) = y(t_1)$. Insgesamt folgt

$$f(t_1, v(t_1)) > v'(t_1) = \lim_{t \rightarrow t_1^-} \frac{v(t_1) - v(t)}{t_1 - t} \geq \lim_{t \rightarrow t_1^-} \frac{y(t_1) - y(t)}{t_1 - t} = y'(t_1) = f(t_1, y(t_1)),$$

ein Widerspruch. □