Analysis für das Lehramt Lösungsvorschlag zu Übungsblatt 09

Aufgabe 1 (Lyapunov-Funktionen). Es sei die folgende Differentialgleichung gegeben:

$$(u, v)'(t) = (-v(t) - u(t)^3, u(t) - v(t)^3).$$

Zeigen Sie, dass $(0, 0)$ die einzige stationäre Stelle der Differentialgleichung ist und untersuchen Sie diese auf Stabilität.

Hinweis: Weisen Sie mit einer geeigneten Lyapunov-Funktion nach, dass die stationäre Stelle $(0, 0)$ asymptotisch stabil ist.

Lösungsvorschlag. Setze

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto \begin{pmatrix} -y - x^3 \\ x - y^3 \end{pmatrix}.$$

Dann geht die Differentialgleichung in $(u, v)'(t) = f(u(t), v(t))$ über. Der Punkt $(0, 0)$ ist die einzige Nullstelle von f . Da

$$A = f'(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

ist $\sigma(A) = \{i, -i\}$ und somit sind die Sätze 13.1 und 13.3 nicht anwendbar.

Stattdessen definieren wir die Lyapunov-Funktion $V: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x^2 + y^2$. Dann gilt $V \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ sowie $V(0, 0) = 0$ und $V(x, y) > 0$ für alle $x, y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Ferner gilt

$$\begin{aligned} (V'(x, y) | f(x, y)) &= \left(\begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} -y - x^3 \\ x - y^3 \end{pmatrix} \right) \\ &= -2xy - 2x^4 + 2yx - 2y^4 \\ &= -2(x^4 + y^4) \\ &= \begin{cases} \leq 0 & x, y \in \mathbb{R}, \\ < 0 & x, y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}. \end{cases} \end{aligned}$$

Somit ist V eine (strikte) Lyapunov-Funktion zur Differentialgleichung in $(0, 0)$, also ist $(0, 0)$ nach Satz 14.1 asymptotisch stabil. □

Aufgabe 2 (Stationäre Lösungen und Stabilität). Betrachten Sie das gedämpfte mathematische Pendel. Dazu seien $\omega > 0$ und $a \geq 0$. Die entsprechende Bewegungsgleichung als System erster Ordnung ist gegeben durch

$$(u, v)'(t) = (v(t), -av(t) - \omega^2 \sin(u(t))). \quad (1)$$

(a) Bestimmen Sie alle stationären Stellen dieser Differentialgleichung.

- (b) Die Funktion $V(u, v) = \frac{1}{2}v^2 + \omega^2(1 - \cos(u))$ ist ein erstes Integral für das ungedämpfte Pendel. Zeigen Sie, dass V eine Lyapunov-Funktion zu (1) in den stationären Stellen $(2k\pi, 0)$ ($k \in \mathbb{Z}$) ist und dass diese somit stabil sind. Warum ist V in den anderen stationären Stellen keine Lyapunov-Funktion zu (1)?

Lösungsvorschlag. Durch eine Transformation in ein System erster Ordnung erhalten wir

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}'(t) = \begin{pmatrix} v(t) \\ -av(t) + \omega^2 \sin u(t) \end{pmatrix}.$$

- (a) Wir setzen

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto \begin{pmatrix} y \\ -ay - \omega^2 \sin x \end{pmatrix}$$

und erhalten als stationäre Stellen aus $f(x, y) = 0$ die Stellen $(k\pi, 0)$ für $k \in \mathbb{Z}$.

- (b) Es gilt $V \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$. Zudem gilt für $k \in \mathbb{Z}$

$$V(2k\pi, 0) = 0 + \omega^2(1 - \cos(2k\pi)) = 0,$$

und

$$V((2k+1)\pi, 0) = 2\omega^2 > 0,$$

also kann V für die stationären Stellen $((2k+1)\pi, 0)$ keine Lyapunov-Funktion sein. Im Folgenden betrachten wir nur die stationären Stellen $(2k\pi, 0)$. Es gilt

$$V(x, y) = \frac{1}{2}y^2 + \omega^2(1 - \cos x) > 0$$

für $(x, y) \in B((2k\pi, 0), r) \setminus \{(2k\pi, 0)\}$, wobei die Umgebung jeweils so gewählt sei, dass die weiteren stationären Stellen nicht darin liegen.

Ferner gilt

$$V'(x, y) = \begin{pmatrix} \omega^2 \sin x \\ y \end{pmatrix}$$

und damit

$$\begin{aligned} (V'(x, y) | f(x, y)) &= \left(\begin{pmatrix} \omega^2 \sin x \\ y \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} y \\ -ay - \omega^2 \sin x \end{pmatrix} \right) \\ &= -ay^2 \\ &\leq 0 \end{aligned}$$

für $x, y \in \mathbb{R}$. Somit ist V eine Lyapunov-Funktion des Systems in den Punkten $(2k\pi, 0)$ für $k \in \mathbb{Z}$. Nach Satz 14.1 sind diese stationären Stellen stabil. $\square$

Aufgabe 3 (Lyapunov-Funktionen und Stabilität). Wir betrachten die Differentialgleichung

$$\begin{cases} u'(t) = 4v(t)(w(t) - 1), \\ v'(t) = -u(t)(w(t) - 1), \\ w'(t) = -w^3(t)(u(t)^2 + v(t)^2 + 1). \end{cases} \quad (2)$$

Ferner sei $x_0 = (0, 0, 0) \in \mathbb{R}^3$.

(a) Finden Sie eine so eine stetig differenzierbare Funktion $f \in C^1(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$, dass (2) sich in der Form $(u, v, w)'(t) = f(u(t), v(t), w(t))$ schreiben lässt und bestimmen Sie $\sigma(f'(x_0))$. Ist Satz 13.1 anwendbar?

(b) Zeigen Sie mithilfe einer geeigneten Lyapunov-Funktion V , dass x_0 stabil ist.

Hinweis: Setzen Sie $V(x, y, z) = ax^2 + by^2 + cz^2$ mit geeigneten Parametern $a, b, c > 0$ an.

(c) Zeigen Sie, dass x_0 nicht asymptotisch stabil ist.

Hinweis: Finden Sie Lösungen (u, v, w) von (2) mit $w \equiv 0$.

Lösungsvorschlag.

(a) Wir definieren

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z) \mapsto \begin{pmatrix} 4y(z-1) \\ -x(z-1) \\ -z^3(x^2 + y^2 + 1) \end{pmatrix}.$$

Dann ist $f \in C^1(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$ und die Differentialgleichung lässt sich als $(u, v, w)'(t) = f(u(t), v(t), w(t))$ schreiben. Dann ist auch $f(x_0) = 0$, also ist x_0 eine stationäre Stelle der Differentialgleichung.

Zudem gilt

$$A = f'(x_0) = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

also $\sigma(A) = \{0, 2i, -2i\}$. Da also $\operatorname{Re} \lambda = 0$ für alle $\lambda \in \sigma(A)$, ist Satz 13.1 nicht anwendbar.

(b) Setzen wir V wie im Hinweis, so erhalten wir direkt $V \in C^1(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})$ sowie $V(x_0) = 0$ und $V(x, y, z) > 0$ für $x, y, z \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$. Zudem erhalten wir

$$\begin{aligned} (V'(x, y, z) | f(x, y, z)) &= \left(\begin{pmatrix} 2ax \\ 2by \\ 2cz \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 4y(z-1) \\ -x(z-1) \\ -z^3(x^2 + y^2 + 1) \end{pmatrix} \right) \\ &= 8axyz - 8axy - 2bxyz + 2bxy - 2cz^4(x^2 + y^2 + 1), \end{aligned}$$

also mit $a = 1$, $b = 4$ und $c = 1$

$$\begin{aligned} &= -z^4(x^2 + y^2 + 1) \\ &\leq 0 \end{aligned}$$

für alle $x, y \in \mathbb{R}^3$. Somit ist V eine Lyapunov-Funktion für die Differentialgleichung im Punkt x_0 , also ist nach Satz 14.1 x_0 stabil.

(c) Wie im Hinweis empfohlen, setzen wir $w = 0$. Dann ergibt sich

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}'(t) = \begin{pmatrix} -4v(t) \\ u(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u(t) \\ v(t) \end{pmatrix}.$$

Die Eigenwerte der auftretenden Matrix sind $1i$ und $-2i$ mit den Eigenvektoren $(2i, 1)$ beziehungsweise $-2i, 1$. Also ist für jedes $\delta > 0$ die Funktion

$$y: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, t \mapsto \delta \operatorname{Re} \left(e^{2it} \begin{pmatrix} 2i \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \delta \begin{pmatrix} -2 \sin(2t) \\ \cos(2t) \end{pmatrix}$$

eine Lösung der Differentialgleichung mit $w = 0$. Somit ist für jedes δ die Funktion

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}(t) = \delta \begin{pmatrix} -2 \sin(2t) \\ \cos(2t) \\ 0 \end{pmatrix}$$

eine Lösung der Differentialgleichung und es gilt

$$\begin{aligned} \left\| \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}(t) \right\|^2 &= \delta^2(4 \sin^2(2t) + \cos^2(2t)) \\ &= \delta^2(1 + 3 \sin^2(2t)) \\ &\geq \delta^2. \end{aligned}$$

Also gilt mit $x_1 = (u, v, w)(0) = \delta(0, 1, 0)$, dass $\|x_1 - x_0\| = \delta$, aber $\|(u, v, w)(t)\| \geq \delta$, also insbesondere $\lim_{t \rightarrow \infty} (u, v, w)(t) \neq x_0$, also ist x_0 nicht asymptotisch stabil. $\square$