Analysis für das Lehramt Lösungsvorschlag zu Übungsblatt 11

Aufgabe 1 (Normalbereiche).

- (a) Es sei $A \subseteq \mathbb{R}^2$ das abgeschlossene Dreieck mit den Eckpunkten $(0, 0)$, $(\pi, 0)$ und $(0, \pi)$. Berechnen Sie

$$\int_A xy^2 - 2 \sin(x + y) \, d(x, y).$$

- (b) Es sei $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x, y \geq 0, x^3 + y^2 \leq 1\}$. Berechnen Sie

$$\int_B x^2 + 2y \, d(x, y).$$

- (c) Es sei $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [1, 2], 0 \leq xy \leq \pi/2\}$. Berechnen Sie

$$\int_C \frac{\cos(xy)}{x} \, d(x, y).$$

- (d) Es sei $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0, y - x \geq -1, y^2 - x - 1 \leq 0\}$. Berechnen Sie

$$\int_D \cosh\left(\frac{x}{y+1}\right) \, d(x, y).$$

Lösungsvorschlag.

- (a) Es gilt

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [0, \pi], 0 \leq y \leq \pi - x\}.$$

Die Funktion $x \mapsto \pi - x$ ist stetig, also ist A ein Normalbereich bezüglich der x -Achse. Weiter ist die Funktion $(x, y) \mapsto xy^2 - 2 \sin(x + y)$ stetig auf A und somit folgt mit partieller Integration im äußeren Integral

$$\begin{aligned} \int_A xy^2 - 2 \sin(x + y) \, d(x, y) &= \int_0^\pi \int_0^{\pi-x} xy^2 - 2 \sin(x + y) \, dy \, dx \\ &= \int_0^\pi \frac{1}{3} x(\pi - x)^3 + 2 \cos x \, dx \\ &= \frac{1}{3} \left[-\frac{1}{4} x(\pi - x)^4 \right]_{x=0}^\pi - \frac{1}{3} \int_0^\pi -\frac{1}{4} (\pi - x)^4 \, dx \\ &\quad - 2\pi - 2[\sin x]_{x=0}^\pi \\ &= \frac{1}{60} \pi^5 - 2\pi \end{aligned}$$

- (b) Wir schreiben B als $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [0, 1], 0 \leq y \leq \sqrt{1-x^3}\}$. Die Funktion $x \mapsto \sqrt{1-x^3}$ ist stetig auf $[0, 1]$, also ist B ein Normalbereich bezüglich der x -Achse. Die Funktion $(x, y) \mapsto x^2 + 2y$ ist ebenfalls stetig auf B und somit gilt

$$\begin{aligned} \int_B x^2 + 2y \, d(x, y) &= \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^3}} x^2 + 2y \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 x^2 \sqrt{1-x^3} + 1 - x^3 \, dx \\ &= \frac{35}{36}. \end{aligned}$$

- (c) Wir schreiben C als $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [1, 2], 0 \leq y \leq \pi/(2x)\}$. Dies ist ein Normalbereich bezüglich der x -Achse, $(x, y) \mapsto \cos(xy)/x$ ist auf C stetig und es gilt

$$\begin{aligned} \int_C \frac{\cos(xy)}{x} \, d(x, y) &= \int_1^2 \int_0^{\pi/(2x)} \frac{\cos(xy)}{x} \, dy \, dx \\ &= \int_1^2 \frac{\sin(\pi/2)}{x^2} - 0 \, dx \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

- (d) Für $(x, y) \in D$ gilt $x \leq y + 1$ und $x \geq y^2 - 1$. Wir berechnen die Schnittpunkte der beiden Kurven $x = y + 1$ und $x = y^2 - 1$, also die Lösungen von $y^2 - y - 2 = 0$. Dies lässt sich äquivalent umformen zu

$$\left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} \iff \left|y - \frac{1}{2}\right| = \frac{3}{2} \iff y = -1 \vee y = 2.$$

Wegen $y \geq 0$ bleibt nur $y = 2$ als Lösung. D hat also die Darstellung $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \in [0, 2], y^2 - 1 \leq x \leq y + 1\}$, also ist D ein Normalbereich bezüglich der y -Achse, die Funktion $(x, y) \mapsto \cosh(x/(y+1))$ ist auf D stetig und es gilt mit partieller Integration im äußeren Integral

$$\begin{aligned} \int_D \cosh\left(\frac{x}{y+1}\right) \, d(x, y) &= \int_0^2 \int_{y^2-1}^{y+1} \cosh\left(\frac{x}{y+1}\right) \, dx \, dy \\ &= \int_0^2 (y+1) \sinh 1 - (y+1) \sinh(y-1) \, dy \\ &= \sinh 1 \left[\frac{1}{2} y^2 + y \right]_{y=0}^2 - [(y+1) \cosh(y-1)]_{y=0}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & + \int_0^2 \cosh(y-1) dy \\
 & = 2e - \frac{4}{e},
 \end{aligned}$$

wobei wir am Ende die Identitäten $\sinh z = 1/2(e^z - e^{-z})$ und $\cosh z = 1/2(e^z + e^{-z})$ verwenden. $\square$

Aufgabe 2 (Polarkoordinaten).

(a) Es seien $0 < \varrho < R$.

(i) Es sei $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \varrho^2 \leq x^2 + y^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0\}$. Berechnen Sie

$$\int_A (x^2 + y^2) d(x, y).$$

(ii) Es sei $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, |y| \leq x, \sqrt{x^2 + y^2} \in [\varrho, R]\}$. Berechnen Sie

$$\int_B \frac{y}{x} d(x, y).$$

(b) Es sei $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq e - 1\}$. Berechnen Sie

$$\int_C \frac{1}{1 + x^2 + y^2} d(x, y).$$

Lösungsvorschlag. Wir setzen auf $\mathbb{R}^2$

$$g(r, \varphi) = \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \end{pmatrix}$$

und es gilt $\det g'(r, \varphi) = r$.

(a) (i) Wir setzen $\tilde{A} = [\varrho, R] \times [0, \pi/2] \subseteq \mathbb{R}^2$. $\tilde{A}$ ist ein kompaktes Intervall und daher messbar, g ist injektiv auf $\tilde{A}$, also insbesondere auch auf dem Inneren von $\tilde{A}$ und dort ist auch $\det g'(r, \varphi) = r \neq 0$. Weiter gilt $g(\tilde{A}) = A$ und die Funktion $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$ ist stetig auf A . Mit der Substitutionsregel aus Satz 15.6 folgt nun mit dem Satz von Fubini

$$\begin{aligned}
 \int_A x^2 + y^2 d(x, y) &= \int_{\tilde{A}} r^2 r d(r, \varphi) \\
 &= \int_{\varrho}^R \int_0^{\pi/2} r^3 d\varphi dr
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\pi}{2} \int_{\varrho}^R r^3 dr \\
 &= \frac{\pi}{8} (R^4 - \varrho^4).
 \end{aligned}$$

- (ii) Für Polarkoordinaten gilt $r \in [\varrho, R]$, da $\sqrt{x^2 + y^2} \in [\varrho, R]$. Aus $x \geq 0$ folgt $\varphi \in [-\pi/2, \pi/2]$ und $|y| \leq x$, also $|\sin \varphi| \leq \cos \varphi$ impliziert $\varphi \in [-\pi/4, \pi/4]$. Mit $\tilde{B} = [\varrho, R] \times [-\pi/4, \pi/4]$ gilt $g(\tilde{B}) = B$ und die Voraussetzungen von Satz 15.6 erfüllt. Damit folgt mit dem Satz von Fubini

$$\begin{aligned}
 \int_B \frac{y}{x} d(x, y) &= \int_{\tilde{B}} \frac{r \sin \varphi}{r \cos \varphi} r d(r, \varphi) \\
 &= \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \int_{\varrho}^R r \tan \varphi dr d\varphi \\
 &= \frac{1}{2} (R^2 - \varrho^2) \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \tan \varphi d\varphi \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

- (iii) Wir setzen $\tilde{C} = [0, \sqrt{e-1}] \times [0, 2\pi]$. Dann gilt $g(\tilde{C}) = C$, g ist injektiv auf dem Inneren von $\tilde{C}$ und dort ist auch $\det g'(r, \varphi) = r \neq 0$. Die Funktion $(x, y) \mapsto 1/(1+x^2+y^2)$ ist stetig auf C . Mit der Substitutionsregel und dem Satz von Fubini folgt

$$\begin{aligned}
 \int_C \frac{1}{1+x^2+y^2} d(x, y) &= \int_{\tilde{C}} \frac{1}{1+r^2} r d(r, \varphi) \\
 &= \int_0^{\sqrt{e-1}} \int_0^{2\pi} \frac{r}{1+r^2} d\varphi dr \\
 &= 2\pi \int_0^{\sqrt{e-1}} \frac{r}{1+r^2} dr \\
 &= \pi.
 \end{aligned}$$

□

Aufgabe 3 (Zylinderkoordinaten).

- (a) Berechnen Sie für den Kreiskegel $K = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \sqrt{x^2 + y^2} \leq 1 - z, 0 \leq z \leq 1\}$ das Integral

$$\int_K (x^2 + y^2)^2 e^{(1-z)^7} d(x, y, z).$$

(b) Berechnen Sie für $a > 0$ das Volumen der folgenden Menge:

$$B_a = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, x^2 + y^2 \leq ax\}.$$

Lösungsvorschlag. Wir setzen auf $\mathbb{R}^3$

$$g(r, \varphi, z) = \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ z \end{pmatrix}$$

und es gilt $\det g'(r, \varphi, z) = r$.

(a) Setze $f(x, y, z) = (x^2 + y^2)^2 e^{(1-z)^7}$. Wir definieren $\tilde{K} = \{(r, \varphi, z) \in \mathbb{R}^3 : (\varphi, z) \in [0, 2\pi] \times [0, 1], 0 \leq r \leq 1 - z\}$. $\tilde{K}$ ist kompakt und messbar, g ist auf dem Inneren von $\tilde{K}$ injektiv und $\det g'(r, \varphi, z) = r \neq 0$ im Inneren von $\tilde{K}$. Zudem gilt $g(\tilde{K}) = K$ und f ist stetig auf K . Somit folgt mit der Substitutionsregel

$$\int_K f(x, y, z) \, d(x, y, z) = \int_{\tilde{K}} r^4 e^{(1-z)^7} r \, d(r, \varphi, z).$$

Weiter gilt, da $\tilde{K}$ ein Normalbereich im $\mathbb{R}^3$ ist, dass

$$\begin{aligned} \int_K f(x, y, z) \, d(x, y, z) &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{1-z} r^5 e^{(1-z)^7} \, dr \, dz \, d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{1}{6} (1-z)^6 e^{(1-z)^7} \, dz \, d\varphi \\ &= -\frac{1}{42} \int_0^{2\pi} 1 - e \, d\varphi \\ &= \frac{\pi}{21} (e - 1). \end{aligned}$$

(b) Für $(x, y, z) \in B_a$ gilt in Zylinderkoordinaten $r^2 \leq ar \cos \varphi \iff r \leq a \cos \varphi$. Da $a > 0$, folgt $\cos \varphi \geq 0$, also $\varphi \in [-\pi/2, \pi/2]$. Weiter gilt $z^2 \leq a^2 - r^2 \iff -\sqrt{a^2 - r^2} \leq z \leq \sqrt{a^2 - r^2}$. Wir definieren

$$\tilde{B}_a = \left\{ (r, \varphi, z) \in \mathbb{R}^3 : \varphi \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], 0 \leq r \leq a \cos \varphi, -\sqrt{a^2 - r^2} \leq z \leq \sqrt{a^2 - r^2} \right\}.$$

Es gilt $g(\tilde{B}_a) = B_a$ und die Voraussetzungen des Satzes 15.6 sind erfüllt. Damit folgt

$$V(B_a) = \int_{B_a} 1 \, d(x, y, z)$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_{\tilde{B}_a} r \, d(r, \varphi, z) \\
 &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{a \cos \varphi} \int_{-\sqrt{a^2-r^2}}^{\sqrt{a^2-r^2}} r \, dz \, dr \, d\varphi \\
 &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{a \cos \varphi} 2\sqrt{a^2-r^2} r \, dr \, d\varphi \\
 &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} -\frac{2}{3}(a^2 - a^2 \cos^2 \varphi)^{3/2} + \frac{3}{2}a^3 \, d\varphi \\
 &= \frac{4}{3}a^3 \int_0^{\pi/2} 1 - \sin^3 \varphi \, d\varphi \\
 &= \frac{4}{3}a^3 \int_0^{\pi/2} 1 - \sin \varphi + \sin \varphi \cos^2 \varphi \, d\varphi \\
 &= \frac{9}{2}a^3(3\pi - 4). \quad \square
 \end{aligned}$$

Aufgabe 4 (Kugelkoordinaten).

(a) Für $0 < \varrho < R$ sei $B_\varrho = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \varrho^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$. Bestimmen Sie

$$\lim_{\varrho \rightarrow 0} \int_{B_\varrho} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \, d(x, y, z).$$

(b) Es seien $R > 0$ und $K(0, R)$ die Kugel um den Punkt 0 mit Radius R im $\mathbb{R}^3$. Berechnen Sie

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{K(0, R)} \frac{1}{(1 + x^2 + y^2 + z^2)^2} \, d(x, y, z).$$

Lösungsvorschlag. Wir setzen auf $\mathbb{R}^3$

$$g(r, \varphi, \vartheta) = \begin{pmatrix} r \cos \varphi \cos \vartheta \\ r \sin \varphi \cos \vartheta \\ r \sin \vartheta \end{pmatrix}$$

und es gilt $|\det g'(r, \varphi, \vartheta)| = r^2 \cos \vartheta$ für $\vartheta \in [-\pi/2, \pi/2]$.

(a) Für $0 < \varrho < R$ sei $B_\varrho = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \varrho^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$. Wir setzen $\tilde{B}_\varrho = [\varrho, R] \times [0, 2\pi] \times [-\pi/2, \pi/2] \subseteq \mathbb{R}^3$. $\tilde{B}_\varrho$ ist also ein kompaktes Intervall und somit messbar. Insbesondere ist g auf dem Inneren von $\tilde{B}_\varrho$ injektiv und $|\det g'(r, \varphi, \vartheta)| = r^2 \cos \vartheta \neq 0$ für (r, φ, ϑ) im Inneren von $\tilde{B}_\varrho$. Da die Funktion $(x, y, z) \mapsto 1/\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ stetig auf

B_ϱ ist und $g(\tilde{B}_\varrho) = B_\varrho$ gilt, folgt mit der Substitutionsregel aus Satz 15.6 und dem Satz von Fubini

$$\begin{aligned} \int_{B_\varrho} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} d(x, y, z) &= \int_{\tilde{B}_\varrho} \frac{1}{\sqrt{r^2}} r^2 \cos \vartheta d(r, \varphi, \vartheta) \\ &= \int_\varrho^R \int_0^{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} r \cos \vartheta d\vartheta d\varphi dr \\ &= 2 \int_\varrho^R \int_0^{2\pi} r d\varphi dr \\ &= 4\pi \int_\varrho^R r dr \\ &= 2\pi(R^2 - \varrho^2). \end{aligned}$$

Also können wir den Grenzwert $\varrho \mapsto 0$ des Integrals bilden und erhalten

$$\lim_{\varrho \rightarrow 0} \int_{B_\varrho} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} d(x, y, z) = 2\pi R^2.$$

- (b) Wir setzen $\tilde{K} = [0, R] \times [0, 2\pi] \times [-\pi/2, \pi/2] \subseteq \mathbb{R}^3$. Wie im vorherigen Teil sehen wir, dass die Voraussetzungen des Satzes 15.6 erfüllt sind. Insbesondere gilt $g(\tilde{K}) = K(0, R)$ und die Funktion $(x, y, z) \mapsto 1/(1 + x^2 + y^2 + z^2)^2$ ist stetig auf $K(0, R)$. Mit der Substitutionsregel und dem Satz von Fubini erhalten wir folglich

$$\begin{aligned} \int_{K(0,R)} \frac{1}{(1 + x^2 + y^2 + z^2)^2} d(x, y, z) &= \int_{\tilde{K}} \frac{1}{(1 + r^2)^2} r^2 \cos \vartheta d(r, \varphi, \vartheta) \\ &= \int_0^R \int_0^{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{r^2}{(1 + r^2)^2} \cos \vartheta d\vartheta d\varphi dr \\ &= 2 \int_0^R \int_0^{2\pi} \frac{r^2}{(1 + r^2)^2} d\varphi dr \\ &= 4\pi \int_0^R \frac{r^2}{(1 + r^2)^2} dr \\ &= 4\pi \left(\left[-\frac{1}{2} \frac{1}{1 + r^2} r \right]_{r=0}^R - \int_0^R -\frac{1}{2} \frac{1}{1 + r^2} dr \right) \\ &= 2\pi \left(\arctan R - \frac{R}{1 + R^2} \right). \end{aligned}$$

Es gilt $\arctan R \rightarrow \pi/2$ und

$$\frac{R}{1 + R^2} = \frac{1}{1/R + R} \leq \frac{1}{R} \rightarrow 0$$

für $R \rightarrow \infty$, also

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{K(0,R)} \frac{1}{(1+x^2+y^2+z^2)^2} d(x,y,z) = \pi^2. \quad \square$$