Analysis für das Lehramt Lösungsvorschlag zu Übungsblatt 12

Dies ist ein Blatt mit Aufgaben im Stile von Klausuraufgaben zur Wiederholung des Stoffes. Der Umfang entspricht etwa zwei Klausuren.

Aufgabe 1 (Funktionentheorie).

(a) Bestimmen Sie den Real- und Imaginärteil folgender komplexer Zahlen.

(i) $z_1 = \frac{1 - 2i}{1 - i}$,

(ii) $z_2 = \left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^{2021}$,

(iii) $z_3 = i^i$,

(iv) $z_4 = \frac{3+i}{(1-i)^2}$ und

(v) $z_5 = (i-1)^{i\pi}$.

(b) Es sei der Weg $\gamma(t) = e^{it}$ ($t \in [0, 2\pi]$) gegeben. Berechnen Sie die folgenden Wegintegrale.

(i) $\int_{\gamma} \frac{e^{\sin(z)}}{z^2} dz$,

(ii) $\int_{\gamma} \frac{z \cos(z)}{z-2i} dz$,

(iii) $\int_{\gamma} \bar{z} e^{-|z|^2} dz$,

(iv) $\int_{\gamma} \frac{\cos(z)}{(z-1)^4} dz$ (hier sei $\gamma(t) = 2e^{it}$) und

(v) $\int_{\gamma} \frac{e^{-z^2}}{z^2+9} dz$.

(c) (i) Es sei die Funktion f gegeben durch

$$f(z) = \frac{(z+1)e^{-z}}{z^3 - 2z^2 - z + 2}.$$

Der Definitionsbereich sei die Menge aller $z \in \mathbb{C}$, für welche $f(z)$ erklärt ist.

(1) Bestimmen Sie Art und Lage aller isolierten Singularitäten von f .

(2) Es sei $\gamma_2(t) = 2 + 2e^{it}$ ($t \in [0, 2\pi]$). Berechnen Sie das Wegintegral

$$\int_{\gamma_2} f(z) dz.$$

(ii) Es sei die Funktion $f : \mathbb{C} \setminus \{i, -i\} \rightarrow \mathbb{C}$ gegeben durch

$$f(z) = \frac{e^{iz}}{1+z^2}.$$

(1) Bestimmen Sie $\text{res}(f, i)$.

(2) Für $r > 1$ sei $\gamma_r = \gamma_{1,r} \oplus \gamma_{2,r}$, wobei

$$\begin{aligned} \gamma_{1,r} : [-r, r] &\rightarrow \mathbb{C}, & \gamma_{1,r}(t) &= t, \\ \gamma_{2,r} : [0, \pi] &\rightarrow \mathbb{C}, & \gamma_{2,r}(t) &= re^{it}. \end{aligned}$$

Berechnen Sie $\int_{\gamma_r} f(z) dz$.

(3) Bestimmen Sie mithilfe des vorherigen Aufgabenteils den Wert des uneigentlichen Integrals

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(x)}{1+x^2} dx.$$

(d) (i) Es sei $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph mit $\lim_{|z| \rightarrow \infty} f(z) = 0$. Zeigen Sie, dass $f \equiv 0$ ist.

Hinweis: Der Satz von Liouville kann nützlich sein.

(ii) Bestimmen Sie alle holomorphen Funktionen $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, die $f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{n+1}{n}$ für alle $n \in \mathbb{N}$ erfüllen.

Hinweis: Identitätssatz.

Lösungsvorschlag.

(a) (i) Es gilt

$$z_1 = \frac{1-2i}{1-i} \cdot \frac{1+i}{1+i} = \frac{1+i-2i+2}{1+1} = \frac{3-i}{2}.$$

(ii) Es gilt $\left|\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right| = 1$ und $\arg\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\pi}{4}$. Daher ist $\frac{1+i}{\sqrt{2}} = e^{\frac{i\pi}{4}}$ und damit

$$z_2 = \left(e^{\frac{i\pi}{4}}\right)^{2021} = e^{\frac{2021i\pi}{4}} = e^{505i\pi} e^{\frac{i\pi}{4}} = -e^{\frac{i\pi}{4}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i.$$

(iii) Wegen $\log(i) = \log(|i|) + i \arg(i) = 0 + i \frac{\pi}{2}$ gilt

$$z_3 = i^i = e^{\log(i)i} = e^{\frac{\pi}{2}i^2} = e^{-\frac{\pi}{2}}.$$

(iv) Es gilt

$$\begin{aligned} z_4 &= \frac{3+i}{(1-i)^2} \\ &= \frac{(3+i)(1+i)^2}{|1-i|^4} \\ &= \frac{(3+i)2i}{4} \\ &= \frac{-2+6i}{4} \\ &= -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i, \end{aligned}$$

also $\operatorname{Re} z_4 = -1/2$ und $\operatorname{Im} z_4 = 3/2$.

(v) Es gilt

$$\begin{aligned} z_5 &= (i-1)^{i\pi} \\ &= \exp(\log(i-1)i\pi) \\ &= \exp((\ln|i-1| + i \arg(i-1))i\pi) \\ &= \exp((\ln \sqrt{2} + i3\pi/4)i\pi) \\ &= \exp(-3\pi^2/4 + i \ln \sqrt{2}\pi) \\ &= \exp(-3\pi^2/4) \left(\cos(\ln(\sqrt{2}\pi)) + i \sin(\ln(\sqrt{2}\pi)) \right), \end{aligned}$$

also $\operatorname{Re} z_5 = \exp(-3\pi^2/4) \cos(\ln(\sqrt{2}\pi))$ und $\operatorname{Im} z_5 = \exp(-3\pi^2/4) \sin(\ln(\sqrt{2}\pi))$.

- (b) (i) Definiere $f(z) = e^{\sin(z)}$ ($z \in \mathbb{C}$). Dann gilt: $f \in H(\mathbb{C})$ und $f'(z) = \cos(z)e^{\sin(z)}$ ($z \in \mathbb{C}$), insbesondere ist $f'(0) = 1$. Da 0 im Inneren von γ liegt und der Weg γ geschlossen und mathematisch positiv orientiert ist, gilt $\operatorname{ind}_\gamma(0) = 1$. Mit der Cauchyschen Integralformel für Ableitungen folgt daher:

$$\int_\gamma \frac{e^{\sin(z)}}{z^2} dz = \int_\gamma \frac{f(z)}{(z-0)^2} dz = 2\pi i f'(0) \operatorname{ind}_\gamma(0) = 2\pi i.$$

Alternativ lässt sich das Integral auch mit dem Residuensatz berechnen.

- (ii) Definiere $f(z) = \frac{z \cos(z)}{z-2i}$ ($z \in \Omega = K(0, \frac{3}{2})$). Dann ist Ω konvex und da $2i \notin \Omega$, ist $f \in H(\Omega)$. Nun folgt aus dem Cauchyschen Integralsatz

$$\int_{\gamma} \frac{z \cos(z)}{z-2i} dz = \int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

Alternativ lässt sich das Integral auch mit Hilfe der Cauchyschen Integralformel berechnen: Definieren wir $g(z) = z \cos(z)$ ($z \in \mathbb{C}$), so gilt $g \in H(\mathbb{C})$. Da $2i$ nicht im Inneren von γ liegt, gilt $\text{ind}_{\gamma}(2i) = 0$. Aus der Cauchyschen Integralformel folgt daher

$$\int_{\gamma} \frac{z \cos(z)}{z-2i} dz = \int_{\gamma} \frac{g(z)}{z-2i} dz = 2\pi i g(2i) \text{ind}_{\gamma}(2i) = 0.$$

- (iii) Da der Integrand nicht holomorph ist, ist weder der Cauchysche Integralsatz noch die Cauchysche Integralformel anwendbar. Daher berechnen wir das Wegintegral auf direktem Wege. Es gilt $\gamma'(t) = ie^{it}$ ($t \in [0, 2\pi]$) und damit

$$\int_{\gamma} \bar{z} e^{-|z|^2} dz = \int_0^{2\pi} e^{-it} e^{-1} ie^{it} dt = \int_0^{2\pi} ie^{-1} dt = 2\pi i e^{-1}$$

- (iv) Mit der Cauchyschen Integralformel für Ableitungen folgt

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \frac{\cos z}{(z-1)^4} dz &= \frac{2\pi i}{3!} \left(\frac{3!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\cos z}{(z-1)^4} dz \right) \\ &= \frac{\pi i}{3} \cos^{(3)} 1 \\ &= \frac{\pi i}{3} \sin 1. \end{aligned}$$

- (v) Die Funktion $f : B(0, 3) \rightarrow \mathbb{C}$, $z \mapsto \exp(-z^2)/(z^2 + 9)$ ist holomorph. Mit dem Cauchyschen Integralsatz folgt $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$.
- (c) (i) (1) Die Funktion f ist in den Nullstellen des Nenners nicht definiert. Durch Polynomdivision erhält man für $z \in \mathbb{C}$

$$z^3 - 2z^2 - z + 2 = (z+1)(z-1)(z-2).$$

$z = -1$ Es gilt

$$\lim_{z \rightarrow -1} f(z) = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{(z+1)e^{-z}}{(z+1)(z-1)(z-2)} = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{e^{-z}}{(z-1)(z-2)} = \frac{e}{6}.$$

Insbesondere ist f in einer punktierten Umgebung um -1 beschränkt. Nach dem Riemannschen Hebbbarkeitssatz ist -1 eine hebbare Singularität.

$z = 1, z = 2$ Es gelten

$$\lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)f(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z - 1)(z + 1)e^{-z}}{(z + 1)(z - 1)(z - 2)} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{e^{-z}}{z - 2} = -e^{-1} \neq 0,$$

$$\lim_{z \rightarrow 2} (z - 2)f(z) = \lim_{z \rightarrow 2} \frac{(z - 2)(z + 1)e^{-z}}{(z + 1)(z - 1)(z - 2)} = \lim_{z \rightarrow 2} \frac{e^{-z}}{z - 1} = e^{-2} \neq 0.$$

Also hat f in 1 und 2 jeweils einen Pol erster Ordnung.

- (2) Nach (a) ist $F: \mathbb{C} \setminus \{1, 2\} \rightarrow \mathbb{C}$, $F(z) = \frac{e^{-z}}{(z-1)(z+2)}$ eine meromorphe Fortsetzung von f . Nach (a) gelten für die Residuen $\text{Res}(F, 1) = \text{Res}(f, 1) = -e^{-1}$ und $\text{Res}(F, 2) = \text{Res}(f, 2) = e^{-2}$. Da γ_2 ein stückweise stetig differenzierbarer Weg in $\mathbb{C} \setminus \{1, 2\}$ und positiv orientiert ist mit $\text{ind}_{\gamma_2}(1) = \text{ind}_{\gamma_2}(2) = 1$, folgt aus dem Residuensatz

$$\int_{\gamma_2} f(z) dz = \int_{\gamma_2} F(z) dz = 2\pi i (\text{Res}(F, 1) + \text{Res}(F, 2)) = 2\pi i (e^{-2} - e^{-1}).$$

- (ii) (1) Es gilt

$$\begin{aligned} \text{res}(f, i) &= \lim_{z \rightarrow i} (z - i)f(z) \\ &= \lim_{z \rightarrow i} \frac{e^{iz}}{z + i} \\ &= \frac{e^{-1}}{2i}. \end{aligned}$$

- (2) Mit dem Residuensatz ergibt sich

$$\int_{\gamma_r} f(z) dz = 2\pi i (n(\gamma_r, i) \text{res}(f, i) + n(\gamma_r, -i) \text{res}(f, -i)) = 2\pi i \frac{e^{-1}}{2i} = \pi e^{-1}.$$

- (3) Es gilt nach der vorherigen Rechnung

$$\begin{aligned} \pi e^{-1} &= \int_{\gamma_r} f(z) dz \\ &= \int_{\gamma_{1,r}} f(z) dz + \int_{\gamma_{2,r}} f(z) dz \\ &= I_1 + I_2. \end{aligned}$$

Da zudem

$$|f(z)| \leq \frac{1}{|1 + z^2|} \leq \frac{1}{|z|^2 - 1} = \frac{1}{r^2 - 1}$$

für $r > 1$ und $z \in \text{Spur}(\gamma_{2,r})$, folgt

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma_{2,r}} f(z) dz \right| &\leq \sup_{z \in \text{Spur}(\gamma_{2,r})} |f(z)| L(\gamma_{2,r}) \\ &\leq \frac{1}{r^2 - 1} \pi r \\ &\rightarrow 0 \end{aligned}$$

für $r \rightarrow \infty$. Zudem gilt

$$\int_{\gamma_{1,r}} f(z) dz = \int_{-r}^r f(x) dx = \int_{-r}^r \frac{\cos x}{1+x^2} dx + i \int_{-r}^r \frac{\sin x}{1+x^2} dx,$$

wobei das letzte Integral 0 ist, da der Integrand ungerade ist. Aus den vorherigen Überlegungen folgt für $r \rightarrow \infty$

$$\pi e^{-1} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{1+x^2} dx.$$

- (d) (i) Da $\lim_{|z| \rightarrow \infty} |f(z)| = 0$ gilt, existiert ein $R > 0$ mit $|f(z)| \leq 1$ für alle $|z| \geq R$. Als stetige Funktion nimmt $|f|$ auf dem Kompaktum $K = \overline{K(0, R)}$ ein Maximum an, d.h., es existiert $M = \max_{z \in K} |f(z)|$. Setzen wir $C = \max\{1, M\}$, so folgt

$$|f(z)| \leq C \quad \text{für alle } z \in \mathbb{C}.$$

Also ist f beschränkt, und damit nach dem Satz von Liouville konstant, d.h., es gilt $f \equiv c$ für ein $c \in \mathbb{C}$. Dann gilt aber auch

$$c = \lim_{|z| \rightarrow \infty} f(z) = 0,$$

also $f \equiv 0$.

- (ii) Definiere $z_n = 1 + 1/n$ und $g: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $z \mapsto 1 + z$. Dann $f, g \in H(\mathbb{C})$ und $f(z_n) = g(z_n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Weiter $z_n \rightarrow 1 \in \text{Bild } f \cap \text{Bild } g = \mathbb{C}$ für $n \rightarrow \infty$. Mit dem Identitätssatz folgt $f = g$. Also ist g die einzige Funktion mit dieser Eigenschaft.

Aufgabe 2 (Differentialgleichungen).

- (a) Zeigen Sie, dass die folgenden Anfangswertprobleme eindeutig lösbar sind und bestimmen Sie die nicht fortsetzbaren Lösungen $u: (\omega_-, \omega_+) \rightarrow \mathbb{R}$.

(i) $u'(t) = \frac{e^{u(t)} - 1}{te^{u(t)}}, \quad t > 0, \quad u(1) = \ln(2).$

(ii) $u'(t) = \frac{te^{u(t)^2}}{u(t)}, \quad u(0) = \sqrt{\ln(4)}.$

Bestimmen Sie hier zudem ω_- und ω_+ sowie die Grenzwerte $\lim_{t \rightarrow \omega_-} u(t)$ und $\lim_{t \rightarrow \omega_+} u(t)$.

(b) (i) Was ist ein erstes Integral einer autonomen Differentialgleichung? Geben Sie die Definition an.

(ii) Bestimmen Sie für die folgenden beiden Differentialgleichungen jeweils ein (nicht konstantes) erstes Integral.

(1) $(u, v)'(t) = (1, 1 + u(t) + 2v(t)).$

Hinweis: Wählen Sie λ nur abhängig von x .

(2) $(u, v)'(t) = (\cos(v(t))u(t)^2 + 4v(t)^3, -4u(t) - 2u(t)\sin(v(t))).$

Folgern Sie, dass jede Lösung beschränkt sein muss.

(c) Es seien $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 > 0$. Berechnen Sie die stationären Stellen der folgenden Differentialgleichungen und untersuchen Sie diese auf asymptotische Stabilität bzw. Instabilität.

(i) $(u, v)'(t) = (u(t) - u(t)v(t)^2, -4v(t) + u(t)^2)$ und

(ii) $(u, v)'(t) = (-\alpha_1 u(t) + \alpha_2 u(t)v(t), -\beta_1 v(t) + \beta_2 u(t)v(t)).$

Lösungsvorschlag.

(a) (i) Definiere $f : (0, \infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (t, x) \mapsto (e^x - 1)/(te^x)$ und $(t_0, x_0) = (1, \ln 2)$. Dann ist f lokal Lipschitz stetig bezüglich x , da f bezüglich x stetig differenzierbar ist und stetig. Somit gibt es eine eindeutige Lösung des Anfangswertproblems nach Picard–Lindelöf. Wir erhalten die Lösung durch Trennung der Variablen.

$$\int_1^t \frac{1}{s} ds = \ln t \text{ und}$$

$$\int_{\ln 2}^u \frac{e^v}{e^v - 1} dv = \ln(e^u - 1),$$

also

$$u(t) = \ln(1 + t).$$

Damit gilt auch (da $t > 0$ gefordert ist) $(\omega_-, \omega_+) = (0, \infty)$.

(ii) Die Funktion $f : \mathbb{R} \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ sei definiert durch $f(t, x) = \frac{te^{x^2}}{x}$ ($(t, x) \in \mathbb{R}^2$). Es gilt: f ist stetig auf $\mathbb{R} \times (0, \infty)$ und stetig partiell differenzierbar bezüglich x . Somit ist f lokal Lipschitz stetig auf $\mathbb{R} \times (0, \infty)$ bezüglich x . Mit dem Satz

von Picard–Lindelöf folgt, dass das Anfangswertproblem mit der Anfangsbedingung eindeutig lösbar ist und eine nicht fortsetzbare Lösung $u : (\omega_-, \omega_+) \rightarrow \mathbb{R}$ besitzt. Weiter gilt $f(t, x) = g(t)h(x)$ ($(t, x) \in \mathbb{R}^2$) mit $g(t) = t$ ($t \in \mathbb{R}$) und $h(x) = \frac{e^{x^2}}{x}$ ($x \in (0, \infty)$). Es gilt $h(\sqrt{\ln(4)}) = 4(\ln(4))^{-\frac{1}{2}} \neq 0$ und g ist nicht die Nullfunktion. Somit kann durch Auflösen der folgenden Gleichung die Lösung u gefunden werden. Mit $t_0 = 0$, $u_0 = \sqrt{\ln(4)}$ gilt dann für $t \in (\omega_-, \omega_+)$

$$\int_{t_0}^t g(s) ds = \int_{u_0}^{u(t)} \frac{1}{h(x)} dx.$$

Nun ist

$$\int_{t_0}^t g(s) ds = \int_{t_0}^t s ds = \left[\frac{1}{2}s^2 \right]_{s=0}^{s=t} = \frac{1}{2}t^2 \quad \text{und}$$

$$\int_{u_0}^{u(t)} h(x) dx = \int_{u_0}^{u(t)} xe^{-x^2} dx = \left[-\frac{1}{2}e^{-x^2} \right]_{x=u_0}^{x=u(t)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} - e^{-u(t)^2} \right).$$

Damit erhalten wir

$$t^2 = \frac{1}{4} - e^{-u(t)^2} \quad \xrightarrow{u_0 > 0} \quad u(t) = \sqrt{-\ln\left(\frac{1}{4} - t^2\right)} \quad (t \in (\omega_-, \omega_+)).$$

Damit $u(t)$ in obiger Gleichung definiert ist, muss $-\ln\left(\frac{1}{4} - t^2\right) \geq 0$, also $\frac{1}{4} - t^2 \in (0, 1]$ gelten. Dies ist genau dann der Fall, wenn $t \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$. Hieraus lesen wir $\omega_- = -\frac{1}{2}$ und $\omega_+ = \frac{1}{2}$ ab. Es ist also

$$u : \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}, \quad u(t) = \sqrt{-\ln\left(\frac{1}{4} - t^2\right)}$$

die eindeutige nicht fortsetzbare Lösung des Anfangswertproblems und aus der Beziehung $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$ erhalten wir die Grenzwerte

$$\lim_{t \rightarrow -\frac{1}{2}^+} u(t) = \lim_{t \rightarrow \frac{1}{2}^-} u(t) = \infty.$$

- (b) (i) Es seien $u'(t) = f(u(t))$ und $f : D \rightarrow \mathbb{R}^d$ stetig, wobei $D \subseteq \mathbb{R}^d$ offen. Dann heißt $H \in C^1(D, \mathbb{R})$ ein erstes Integral der obigen Differentialgleichung, falls für alle $x \in D$ gilt, dass $(H'(x) \mid f(x)) = 0$.

(ii) (1) Die Integrabilitätsbedingung für

$$f(x, y) = \begin{pmatrix} g(x, y) \\ h(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 + x + 2y \end{pmatrix}$$

ist gegeben durch $-(\lambda h)_y = (\lambda g)_x$. Mit dem Ansatz $\lambda = \lambda(x)$ folgt

$$\begin{aligned} (-hy)\lambda &= g_x\lambda + g\lambda'(x) \\ \implies -2\lambda(x) &= \lambda'(x) \\ \implies \lambda(x) &= e^{-2x} \\ \implies H'(x, y) &= \lambda(x) \begin{pmatrix} -h(x, y) \\ g(x, y) \end{pmatrix} \\ \implies H(x, y) &= e^{-2x} \left(\frac{1}{2}x + y + \frac{3}{4} \right), \end{aligned}$$

wobei wir die anfallende Konstante auf 0 gesetzt haben.

(2) Die Funktion $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sei definiert durch

$$f(x, y) = \begin{pmatrix} g(x, y) \\ h(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(y)x^2 + 4y^3 \\ -4x - 2x \sin(y) \end{pmatrix} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

Dann lässt sich die Differentialgleichung aus der Aufgabenstellung schreiben als

$$(u, v)'(t) = f(u(t), v(t)). \quad (1)$$

Es gilt $f \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$. Als Ansatz für ein erstes Integral wählt man wie in der Vorlesung

$$H'(x, y) = \lambda(x, y) \begin{pmatrix} -h(x, y) \\ g(x, y) \end{pmatrix}$$

mit einer noch zu bestimmenden Funktion $\lambda: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, die die Integrabilitätsbedingung $\frac{d}{dy}(-\lambda h) \stackrel{!}{=} \frac{d}{dx}(\lambda g)$ erfüllt. Nun ist

$$-\frac{d}{dy}h(x, y) = 2x \cos(y) = \frac{d}{dx}g(x, y) \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2),$$

sodass $\lambda(x, y) \equiv 1$ ($(x, y) \in \mathbb{R}^2$) die Integrabilitätsbedingung erfüllt. Somit erhält man den Ansatz

$$H'(x, y) = \begin{pmatrix} 4x + 2x \sin(y) \\ \cos(y)x^2 + 4y^3 \end{pmatrix} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

Integrieren der ersten Komponente bezüglich x ergibt (für ein $C_1 \in C^1(\mathbb{R})$):

$$H(x, y) = x^2(2 + \sin(y)) + C_1(y),$$

und Integrieren der zweiten Komponente bezüglich y ergibt (für ein $C_2 \in C^1(\mathbb{R})$):

$$H(x, y) = \sin(y)x^2 + y^4 + C_2(x).$$

Gleichsetzen ergibt

$$2x^2 + C_1(y) \stackrel{!}{=} y^4 + C_2(x) \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

$$\Leftrightarrow C_1(y) - y^4 = C_2(x) - 2x^2 \equiv c \quad \text{für ein } c \in \mathbb{R} \text{ und alle } (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Es muss also $C_1(y) = y^4 + c$ ($y \in \mathbb{R}$) sein. Wir wählen $c = 0$ und erhalten das erste Integral

$$H(x, y) = (2 + \sin(y))x^2 + y^4 \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

Es sei nun $(u, v) : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ eine Lösung von (1). Nach Satz 12.1 gilt

$$H(u(t), v(t)) = c \quad (t \in I)$$

für ein $c \in \mathbb{R}$. Da $2 + \sin(y) \geq 1$ ($y \in \mathbb{R}$) gilt, haben wir

$$u(t)^2 \leq (2 + \sin(v(t)))u^2(t) \leq H(u(t), v(t)) = c \text{ und}$$

$$v(t)^4 \leq H(u(t), v(t)) = c \quad (t \in I)$$

$$\Rightarrow |u(t)| \leq \sqrt{c} \quad \text{und} \quad |v(t)| \leq \sqrt[4]{c} \quad (t \in I).$$

Dies zeigt die Beschränktheit von u und v .

(c) (i) Die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sei definiert durch

$$f(x, y) = \begin{pmatrix} x - xy^2 \\ -4y + x^2 \end{pmatrix} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

Damit ist die Differentialgleichung gegeben durch

$$(u, v)'(t) = f(u(t), v(t)).$$

Die stationären Stellen der Differentialgleichung sind die Nullstellen von f . Für $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ gilt

$$f(x, y) = (0, 0) \Leftrightarrow x(1 - y^2) = 0 \wedge x^2 = 4y.$$

Aus $x(1 - y^2) = 0$ folgt $x = 0$ oder $y = \pm 1$. Wir unterscheiden diese beiden Fälle:

1. Fall: $x = 0$ Dann folgt wegen $0 = x^2 = 4y$, dass auch $y = 0$ ist. Wir erhalten also $(x, y) = (0, 0)$.

2. Fall: $y = \pm 1$ Wegen $4y = x^2 \geq 0$ folgern wir $y = 1$. Damit ist $x^2 = 4$, also $x = \pm 2$. Wir erhalten also $(x, y) = (\pm 2, 1)$.

Insgesamt sind also $(0, 0)$, $(2, 1)$ und $(-2, 1)$ die stationären Stellen der Differentialgleichung.

Für die Stabilitätsuntersuchung verwenden wir den Stabilitätssatz und den Instabilitätssatz aus der Vorlesung (Sätze 13.1 und 13.3). Dazu stellen wir zunächst fest, dass $f \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ gilt mit

$$f'(x, y) = \begin{pmatrix} 1 - y^2 & -2xy \\ 2x & -4 \end{pmatrix} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

Wir setzen $A_1 = f'(0, 0)$, $A_2 = f'(2, 1)$ und $A_3 = f'(-2, 1)$ und bestimmen im Folgenden $s_k = \max_{\lambda \in \sigma(A_k)} \operatorname{Re}(\lambda)$ für $k \in \{1, 2, 3\}$, wobei $\sigma(A)$ die Menge der Eigenwerte einer Matrix A bezeichnet. Dann können wir anhand des Vorzeichens von s_k die asymptotische Stabilität bzw. Instabilität ablesen. Es ist

$$\begin{aligned} A_1 &= f'(0, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \\ \implies \sigma(A_1) &= \{-4, 1\} \\ \implies s_1 &= 1 > 0 \implies (0, 0) \text{ ist instabil.} \end{aligned}$$

Weiter ist

$$A_{2/3} = f'(\pm 2, 1) = \begin{pmatrix} 0 & \mp 4 \\ \pm 4 & -4 \end{pmatrix},$$

womit das charakteristische Polynom gegeben ist durch

$$\operatorname{char}_{A_{2/3}}(\lambda) = \det(A_{2/3} - \lambda I) = \lambda(4 + \lambda) + 16 = \lambda^2 + 4\lambda + 16 \quad (\lambda \in \mathbb{C}).$$

Hieraus folgt

$$\operatorname{char}_{A_{2/3}}(\lambda) = 0 \iff \lambda^2 + 4\lambda + 16 = 0 \iff \lambda = -2 \pm \sqrt{12}i$$

und damit

$$\begin{aligned} \implies \sigma(A_{2/3}) &= \{-2 + \sqrt{12}i, -2 - \sqrt{12}i\} \implies s_{2/3} = -2 < 0 \\ \implies (2, 1) \text{ und } (-2, 1) &\text{ sind asymptotisch stabil.} \end{aligned}$$

(ii) Mit

$$f(x, y) = \begin{pmatrix} -\alpha_1 x + \alpha_2 xy \\ -\beta_1 y + \beta_2 xy \end{pmatrix}$$

folgt

$$\begin{aligned} f(x, y) &= 0 \\ \Leftrightarrow (-\alpha_1 + \alpha_2 y)x &= 0 \\ \wedge (-\beta_1 + \beta_2 x)y &= 0 \\ \Leftrightarrow (x, y) &\in \left\{ (0, 0), \left(\frac{\beta_1}{\beta_2}, \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \right) \right\}. \end{aligned}$$

Da

$$f'(x, y) = \begin{pmatrix} -\alpha_1 + \alpha_2 y & \alpha_2 x \\ \beta_2 y & -\beta_1 + \beta_2 x \end{pmatrix}$$

folgt

$$f'(0, 0) = \begin{pmatrix} -\alpha_1 & 0 \\ 0 & -\beta_1 \end{pmatrix},$$

also $\sigma(f'(0, 0)) = \{-\alpha_1, -\beta_1\}$. Da der Realteil aller Eigenwerte kleiner als 0 ist, ist diese stationäre Stelle asymptotisch stabil. Ferner gilt

$$f'\left(\frac{\beta_1}{\beta_2}, \frac{\alpha_1}{\alpha_2}\right) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{\beta_1 \alpha_2}{\beta_2} \\ \frac{\beta_2 \alpha_1}{\alpha_2} & 0 \end{pmatrix},$$

also sind die Eigenwerte $\pm\sqrt{\alpha_1 \beta_1}$ also ist diese stationäre Stelle instabil. □

Aufgabe 3 (Integral- und Volumenberechnung).

(a) Es sei $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, x \leq y \leq 2 - x\}$. Berechnen Sie

$$\int_A (x^2 + 2y) \, d(x, y).$$

(b) Es sei $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [0, \pi^{\frac{1}{7}}], |y| \leq x^2\}$. Berechnen Sie

$$\int_B x^7 y^2 \cos(xy^3) \, d(x, y).$$

(c) Es sei $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \leq 0, x^2 + y^2 \leq 4\}$. Berechnen Sie

$$\int_C xy^2 \, d(x, y).$$

- (d) Es sei $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, 0 \leq z \leq 4, 0 \leq y \leq z(1-x)^3\}$. Berechnen Sie $V(D)$.
- (e) Es sei $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z \geq 0, x \geq 0, \frac{1}{4} \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$. Bestimmen Sie $V(E)$.
- (f) Es sei $0 < r < R$. Berechnen Sie das Volumen des Torus

$$T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z \in [-r, r], R - \sqrt{r^2 - z^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq R + \sqrt{r^2 - z^2}\}.$$

Lösungsvorschlag.

- (a) Wir stellen zunächst fest, dass A ein Normalbereich bzgl. der x -Achse ist: Definieren wir die stetigen Funktionen

$$f, g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x, g(x) = 2 - x,$$

so folgt

$$A = M_{f,g} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [0, 1], f(x) \leq y \leq g(x)\},$$

denn die Inklusion $A \supseteq M_{f,g}$ folgt unmittelbar aus der Definition von A und für die Inklusion $A \subseteq M_{f,g}$ muss für $(x, y) \in A$ nur noch $x \leq 1$ gezeigt werden. Dies folgt allerdings unmittelbar aus der Ungleichung $x \leq 2 - x$ in der Definition von A .

Da die Funktion $h : A \rightarrow \mathbb{R}, h(x, y) = x^2 + 2y$ stetig und A ein Normalbereich bzgl. der x -Achse ist, erhalten wir:

$$\begin{aligned} \int_A h(x, y) d(x, y) &= \int_0^1 \left(\int_x^{2-x} (x^2 + 2y) dy \right) dx = \int_0^1 [x^2 y + y^2]_{y=x}^{y=2-x} dx \\ &= \int_0^1 x^2(2-2x) + (2-x)^2 - x^2 dx = \left[\frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{3}(2-x)^3 - \frac{1}{3}x^3 \right]_{x=0}^{x=1} \\ &= \frac{2}{3} - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} + \frac{8}{3} = \frac{13}{6}. \end{aligned}$$

- (b) Da B ein Normalbereich ist, folgt wie vorhin

$$\begin{aligned} \int_B x^7 y^2 \cos(xy^3) d(x, y) &= \int_0^{\pi^{1/7}} \int_{-x^2}^{x^2} y^2 x^7 \cos(xy^3) dy dx \\ &= \int_0^{\pi^{1/7}} \left[\frac{x^6}{3} \sin(xy^3) \right]_{y=-x^2}^{y=x^2} dx \\ &= \int_0^{\pi^{1/7}} \frac{2}{3} x^6 \sin(x^7) dx \\ &= -\frac{2}{37} [\cos(x^7)]_{x=0}^{\pi^{1/7}} \\ &= \frac{4}{21}. \end{aligned}$$

(c) Definiere die stetig differenzierbare Funktion

$$g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad g(r, \varphi) = \begin{pmatrix} r \cos(\varphi) \\ r \sin(\varphi) \end{pmatrix}$$

und setze $\tilde{C} = [0, 2] \times [-\frac{\pi}{2}, 0] \subseteq \mathbb{R}^2$. Dann ist $\tilde{C}$ (als kompaktes Intervall) messbar und kompakt. Es gilt: g ist injektiv auf $\tilde{C}$, also insbesondere auch auf dem Inneren $\tilde{C}^\circ$ von $\tilde{C}$ und

$$\det(g'(r, \varphi)) = r \neq 0 \quad ((r, \varphi) \in \tilde{C}^\circ).$$

Da $f(x, y) = xy^2$ ($(x, y) \in \mathbb{R}^2$) auf C stetig ist und $C = g(\tilde{C})$ gilt, folgt mit der Substitutionsregel (Satz 15.6):

$$\int_C f(x, y) d(x, y) = \int_{\tilde{C}} f(g(r, \varphi)) |\det(g'(r, \varphi))| d(r, \varphi).$$

Mit dem Satz von Fubini (Satz 15.3) folgt:

$$\begin{aligned} \int_C f(x, y) d(x, y) &= \int_{\tilde{C}} r \cos(\varphi) r^2 \sin^2(\varphi) r d(r, \varphi) = \int_0^2 \left(\int_{-\frac{\pi}{2}}^0 r^4 \cos(\varphi) \sin^2(\varphi) d\varphi \right) dr \\ &= \int_0^2 r^4 \left[\frac{1}{3} (\sin(\varphi))^3 \right]_{\varphi=-\frac{\pi}{2}}^{\varphi=0} dr = \int_0^2 \frac{1}{3} r^4 dr = \left[\frac{1}{15} r^5 \right]_{r=0}^{r=2} = \frac{32}{15}. \end{aligned}$$

(d) Die Menge $D \subseteq \mathbb{R}^3$ ist messbar und für $z \in [0, 4]$ setzen wir

$$Q(z) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \in D\}.$$

Weiter gilt, dass $Q(z)$ ein Normalbereich bzgl. der x -Achse und damit insbesondere messbar ist: In der Tat, für $z \in [0, 4]$ gilt

$$Q(z) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [0, 1], 0 \leq y \leq z(1-x)^3\}$$

und daher

$$V(Q(z)) = \int_0^1 z(1-x)^3 dx = \left[-\frac{z(1-x)^4}{4} \right]_{x=0}^{x=1} = \frac{z}{4}.$$

Mit dem Prinzip von Cavalieri (Satz 15.5) folgt nun

$$V(D) = \int_0^4 V(Q(z)) dz = \int_0^4 \frac{z}{4} dz = \left[\frac{1}{8} z^2 \right]_{z=0}^{z=4} = 2.$$

- (e) Mit einer ähnlichen Überlegung wie bei den Polarkoordinaten wenden wir hier Kugelkoordinaten an mit

$$g(r, \varphi, \vartheta) = \begin{pmatrix} r \cos \varphi \sin \vartheta \\ r \sin \varphi \sin \vartheta \\ r \cos \vartheta \end{pmatrix}$$

und $|\det \varphi'| = r^2 |\sin \vartheta|$, also mit $\tilde{E} = [1/2] \times [-\pi/2, \pi/2] \times [0, \pi/2]$

$$\begin{aligned} |E| &= \int_{\tilde{E}} 1r^2 |\sin \vartheta| \, d(r, \varphi, \vartheta) \\ &= \pi \left[\frac{r^3}{3} \right]_{r=1/2}^1 \int_0^{\pi/2} \sin \vartheta \, d\vartheta \\ &= \pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{24} \right) [-\cos \vartheta]_{\vartheta=0}^{\pi/2} \\ &= \frac{7}{24} \pi. \end{aligned}$$

- (f) Für Rotationskörper gilt

$$\begin{aligned} |T| &= \pi \int_{-r}^r \left(R + \sqrt{r^2 - z^2} \right)^2 - \left(R - \sqrt{r^2 - z^2} \right)^2 \, dz \\ &= \pi \int_{-r}^r 4R\sqrt{r^2 - z^2} \, dz \\ &= 4\pi Rr^2 \int_{-1}^1 \sqrt{1 - z^2} \, dz \\ &= 2\pi R\pi r^2. \end{aligned}$$

□