ÜBUNGSAUFGABEN (VIII)
 (Besprechung Donnerstag, 15.12.16)

Aufgabe 1: (4 Punkte)

In einem Michelson-Interferometer wird ein Lichtstrahl mit elektrischem Feld $E(t)$ in zwei gleichstarke Strahlen geteilt, welche nach Durchlaufen verschiedener Arme des Interferometers wieder vereint werden. Einer der Arme kann variabel verlängert werden, so dass das Licht hier eine Zeitverzögerung τ im Vergleich zum Arm fester Länge erfährt. Das elektrische Feld am Detektor ist dann $E_{\text{Det}}(t) = (E(t) + E(t + \tau))/4$ und die gemessene, über die Zeit t gemittelte Intensität $I_{\text{Det}}(\tau)$ („Interferogramm“) ist mit einer Konstanten a gegeben durch

$$I_{\text{Det}}(\tau) = a \cdot \overline{E^2}_{\text{Det}} = \frac{a}{4} \int_{-\infty}^{+\infty} (E(t) + E(t + \tau))^2 dt .$$

Zeigen Sie, dass die Fouriertransformierte von $I_{\text{Det}}(\tau)$ gerade das Spektrum $I(\omega) = a \tilde{E}^2(\omega)$ erzeugt, worin $\tilde{E}(\omega)$ die Fouriertransformierte von $E(t)$ darstellt. Skizzieren Sie $I_{\text{Det}}(\tau)$ für den Fall, dass als Lichtquelle ein Laser mit zwei Emissionslinien gleicher Intensität bei den Wellenlängen $\lambda_1 = 632.8 \text{ nm}$ und $\lambda_2 = 611.9 \text{ nm}$ verwendet wird.

Hinweis: Dieses Prinzip wird insbesondere im Infrarotbereich zur hochauflösenden Spektralanalyse benutzt (FTIR-Spektrometer).

Aufgabe 2: (4 Punkte)

Eine metallische Blende wird eine von links einfallende ebene Welle mit Wellenvektor $\vec{k}_i$ senkrecht beleuchtet. Berechnen Sie für die gezeigte Spalt-Anordnung das Beugungsmuster in Fraunhofer-Näherung. Die Transmissionsfunktionen der einzelnen Spalte können durch Deltafunktionen approximiert werden. Skizzieren Sie das Beugungsbild als Funktion von $k_x a$ im Intervall $[-4\pi \dots 4\pi]$ (k_x ist die x -Komponente des Wellenvektors der gebeugten Welle). Wie ändert sich das Beugungsbild, wenn das transmittierte Licht der beiden äußeren Spalte durch Phasenplatten um 180° verzögert wird?

Aufgabe 3: (4 Punkte)

In der Vorlesung wurde eine Computersimulation zur Selbstdiffusion gezeigt. Ein zweidimensionales Gas „harter Teilchen“ mit Durchmesser $d = 0.4 \text{ nm}$ bei der Temperatur $T = 291 \text{ K}$ besteht aus 500 „markierten“ und 5060 unmarkierten Scheiben gleicher Masse $m = 4 \text{ u}$ in der Fläche $A = 107.8 \text{ nm} \times 59.0 \text{ nm}$. Die markierten Teilchen sind anfangs ($t = 0$) entlang der x -Koordinate in der Mitte konzentriert mit halber Gesamtbreite $\sigma_0 = 5.3 \text{ nm}$. Nach der Zeit $\Delta t = 0.138 \text{ ns}$ entwickelt sich daraus durch Diffusion eine gaussförmige Verteilung (vgl. Abbildung). Die Simulation ergibt für die mittlere freie Weglänge $\lambda = 0.85 \text{ nm}$ und für die mittlere Geschwindigkeit $\bar{v} = 974 \text{ m/s}$.

Passen Sie eine Gaußkurve mittels Least-Squares-Fit bestmöglich an die Verteilung an und bestimmen Sie mit dem Ergebnis den Diffusionskoeffizienten D .¹ Vergleichen Sie diesen Wert mit dem Erwartungswert D_{HD} der statistischen Mechanik für das entsprechende Modellgas harter Scheiben, $D_{\text{HD}} = \frac{2}{\pi} \lambda \bar{v}$.

Hinweis: Eine Datei mit den Datenpunkten der Abbildung finden Sie auf den ILIAS-Seiten der Übungen.

Aufgabe 4: (4 Punkte)

Im Gravitationsfeld der Erde ist die Teilchenzahldichte $n(x)$ im thermischen Gleichgewicht (konstante Temperatur T) gegeben durch $n(x) = n_0 e^{-\frac{m g x}{k_B T}}$ mit Teilchenmasse m und Höhe x . Das Gleichgewicht kann verstanden werden als ein Kompromiß zweier entgegengesetzter Tendenzen. Die Gravitationskraft führt zu einer mittleren Teilchengeschwindigkeit $v_G = B m g$ mit reibungsabhängiger Konstante B und in entgegengesetzter Richtung fließt ein Diffusionsstrom $j_D = -D \frac{\partial n}{\partial x}$ mit Diffusionskonstante D . Leiten Sie damit eine Beziehung zwischen B und D her. Bestimmen Sie dann das mittlere Verschiebungsquadrat $\langle x^2 \rangle = 2 D t$ eines sphärischen Teilchens mit Radius a im Falle Stokesscher Reibung.

Bemerkung: Ausgehend von diesen Überlegungen hat Einstein 1905 die ungeordnete Bewegung kleiner Teilchen in Flüssigkeiten (Brownsche Bewegung) theoretisch begründet und der Atomtheorie so zum endgültigen Durchbruch verholfen.

¹Ein dafür geeignetes Computerprogramm ist z.B. GNUPlot.