Moderne Experimentalphysik III – Teilchen und Hadronen

Karlsruher Institut für Technologie
Sommersemester 2020 – 9. Vorlesung (Teil 1)

ULRICH HUSEMANN, KATHRIN VALERIUS

Bildquelle: CMS

Auflösung Aufgabe 17

- Woher kommen die Elemente im Universum?
 - A. Die leichten Elemente werden kurz nach dem Urknall erzeugt, die schweren Elemente in späteren Phasen.
 - B. Der Anteil von primordialem Helium im Universum ist abhängig vom Verhältnis von Protonen und Neutronen einige Sekunden nach dem Urknall.
 - C. Alle Elemente werden aus Neutroneneinfang und Betazerfall erzeugt.
 - D. Elemente oberhalb der Eisengruppe werden durch Protoneneinfang erzeugt.
 - E. Als Quelle der auf der Erde ankommenden Sonnenneutrinos spielt der CNO-Zyklus eine untergeordnete Rolle gegenüber der pp-Kette.

Kurze Wiederholung

- Kernphysik: **breite Anwendung** in Technik und Grundlagenforschung
- **Kerntechnische Anwendungen:** Energiegewinnung möglich durch Spaltung schwerer Kerne oder Fusion leichter Kerne
 - **Kernspaltungsreaktoren:** Leicht- und Schwerwasserreaktoren im Einsatz, mit unterschiedlichen Brennstoff- und Moderator-Materialien
 - **Kernfusionsreaktoren:** zwei wesentliche Bauformen (Tokamak, Stellarator), bislang keine Nettoproduktion nutzbarer Energie
- **Medizintechnik** und medizinische **Diagnostik:** NMR, Tracer, ...
- Viele weitere Beispiele und Querverbindungen: Kriminalistik, Kunstgeschichte, Umwelttechnik, Paläontologie, ...

Kurze Wiederholung

- **Primordiale Nukleosynthese:** leichte Elemente D, ^3H , ^4He , ^7Li
 - Keine stabilen Kerne mit $A = 5$ und $A = 8$ → keine schwereren Elemente
 - Vorhersage für **Massenanteile** leichter Elemente, z. B. Heliumanteil $Y_P \approx 0,25$ → Grundpfeiler der Urknalltheorie
- **Kernfusion** in Sternen:
 - Hauptreihensterne: **Wasserstoffbrennen** (pp-Reaktion)
 - Massive Sterne: katalytisches Wasserstoffbrennen (CNO-Zyklus)
 - Höhere Temperaturen: **Schalenbrennen** (3α -Prozess, ..., Si-Brennen)
- Schwere neutronenreiche Kerne: Anlagerung von Neutronen durch **r-Prozess** (Neutronensterne, Supernovae) und **s-Prozess** (schwere Sterne)

Kapitel 5

Symmetrien und Erhaltungssätze

- Symmetrien und Erhaltungssätze: **zentrales Element** moderner physikalischer Theorien, z. B.
 - Klassische Physik: Hamilton-Formalismus
 - Quantenmechanik: quantenmechanische Phase, Parität der Wellenfunktion
 - Festkörperphysik: (diskrete) Symmetrien in Kristallen
 - Noether-Theorem: Verknüpfung (kontinuierlicher globaler) Symmetrien mit Erhaltungssätzen
- Kern- und Teilchenphysik: **Verallgemeinerung** bekannter Konzepte aus klassischer Physik und Quantenmechanik
 - Wechselwirkungen im Standardmodell: aus (lokalen) Eichsymmetrien folgt Dynamik der Theorie, z. B. Farb-SU(3) $\rightarrow$ QCD
 - Innere Symmetrien, z. B. Parität von Teilchen
 - Neue Quantenzahlen, z. B. Flavorquantenzahlen der Quarks (up, down, ...)

Kapitel 5.1

Symmetrien und Quantenzahlen

Klassische kontinuierliche Symmetrien

- **Kontinuierliche Symmetrien** in physikalischem System:
 - Invarianz unter **infinitesimaler** Symmetrieoperation
 - Beispiel Rotationssymmetrie: beliebige Drehung aus infinitesimalen Drehungen konstruierbar → Invarianz unter beliebiger Drehung
 - Mathematische Darstellung: **Lie-Gruppen**
- **Noether-Theorem** (Noether 1918):
„Zu jeder kontinuierlichen Symmetrie eines physikalischen Systems gehört eine Erhaltungsgröße“ → klassische Raum-Zeit-Symmetrien

Symmetrie	Erhaltungsgröße	Bedeutung
Translationsinvarianz	Impuls	Homogenität des Raums
Zeitliche Invarianz	Energie	Homogenität der Zeit
Rotationsinvarianz	Drehimpuls	Isotropie des Raums

Globale und lokale Symmetrien

- **Globale vs. lokale Symmetrie:**
 - **Global:** dieselbe Symmetrieoperation an jedem Raum-Zeit-Punkt
 - **Lokal:** Symmetrieoperation Funktion des Ortes $x = (\mathbf{r}, t)$
 - Analogie: Zeitangabe in koordinierter Universalzeit (UTC) oder lokaler Zeit
- Beispiel: quantenmechanische **Phase**
 - **Global:** Physik unverändert unter $\psi(x) \rightarrow U\psi(x) = \exp[i\alpha]\psi(x)$
 - **Lokal:** Physik unverändert unter $\psi(x) \rightarrow U(x)\psi(x) = \exp[i\alpha(x)]\psi(x)$
→ Elektrodynamik = Eichtheorie
- Standardmodell beruht auf **lokalen Eichsymmetrien**

Spontane Symmetriebrechung

- Spontane Symmetriebrechung (SSB):
 - **Bewegungsgleichung** eines Systems (z. B. dargestellt durch Lagrange-Dichte) **invariant** unter Symmetrieoperation, aber **Grundzustand nicht**
 - Konsequenz: **Phasenübergang** zwischen unsymmetrischem und symmetrischem Zustand
- Standardbeispiel: **Ferromagnet**
 - Oberhalb Curie-Temperatur: Rotationssymmetrie (bis auf Kristallfeld)
 - Unterhalb Curie-Temperatur: Vorzugsrichtung der Magnetisierung
- Teilchenphysik: **Brout-Englert-Higgs-Mechanismus** (→ später)

Diskrete Symmetrien im Standardmodell

- **Diskrete Symmetrien** eines physikalischen Systems:
 - Invarianz unter **nicht-kontinuierlichen** Symmetrieoperationen
 - Beispiel: Paritätsoperation = Punktspiegelung am Ursprung ($\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r}$)
 - Mathematische Darstellung: **diskrete Gruppen**
- Diskrete Symmetrien für Spin-1/2-Fermionen im Standardmodell:

Ladungskonjugation C: dieselbe Physik mit umgekehrtem **Ladungsvorzeichen** → Unterscheidung **Teilchen/Antiteilchen**

Parität P: dieselbe Physik bei Punktspiegelung am Ursprung ($\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r}$) → Unterscheidung der **Händigkeit** (genaue Definition später)

Zeitumkehr T: dieselbe Physik, wenn Zeit rückwärts ablaufe ($t \rightarrow -t$) → Unterscheidung der **Bewegungsrichtung**

Symmetrien und Quantenzahlen

- Quantenzahlen in der Quantenmechanik:
 - **Charakterisierung** eines Quantensystems über Quantenzahlen
 - Mindestens eine Quantenzahl: **Energieeigenwert** des Hamiltonoperators
 - Weitere Quantenzahlen: für n unabhängige Operatoren $\hat{O}_i$, die mit Hamiltonoperator **kommutieren** $\rightarrow n$ Quantenzahlen
 - Verknüpfung mit **Symmetrien**, z. B. im Wasserstoffatom: Rotationssymmetrie von Orbitalen $\rightarrow$ Drehimpulsquantenzahl ℓ
- Additive und multiplikative Quantenzahlen:
 - **Additive** Quantenzahlen: **Summe** der Quantenzahlen in jedem Prozess erhalten (z. B. elektrische Ladung)
 - **Multiplikative** Quantenzahlen: **Produkt** der Quantenzahlen in jedem Prozess erhalten (z. B. Parität und Ladungskonjugation, später: nicht erhalten in elektroschwacher Wechselwirkung)

Intrinsische Quantenzahlen

- Quantenzahlen von Quarks, Hadronen und Leptonen:
 - **Interne** Symmetrien → **intrinsische** (additive) Quantenzahlen
 - Fundamentale **Eichsymmetrien** in Lagrange-Dichte → Quantenzahlen: Ladung Q , schwacher Isospin I_3 , schwache Hyperladung Y , Farbladung
 - Weitere „zufällige“ Symmetrien im Standardmodell: Baryonenzahl, Leptonen(familien-)zahl, Flavorquantenzahlen

- Baryonenzahl:
$$B \equiv \frac{N_q - N_{\bar{q}}}{3}$$

mit $N_{q(\bar{q})}$ Zahl der (Anti-)Quarks

Teilchen	B	Antiteilchen	B
Quark	+1/3	Antiquark	-1/3
Baryon	+1	Antibaryon	-1
Lepton	0	Antilepton	0
Meson	0		

- Im Standardmodell zufällig **erhalten**
 → Proton (= leichtestes Baryon) stabil

Leptonenzahl

- **Leptonenzahl:** $L \equiv N_\ell - N_{\bar{\ell}}$
 - Leptonen: $L = +1$, Antileptonen: $L = -1$
 - Alle anderen Teilchen: $L = 0$
 - Im Standardmodell zufällig **erhalten**

- **Leptonenfamilienzahl:** L_e, L_μ, L_τ
 - Separate Quantenzahlen für drei Leptonengenerationen, $L_{e,\mu,\tau} = +1$ (-1) für (Anti-)Leptonen der entsprechenden Familie, $L_{e,\mu,\tau} = 0$ sonst
 - Im Standardmodell **verletzt** durch **massive Neutrinos** ($\rightarrow$ später)

- **Bemerkung:** Baryonenzahl B und Leptonenzahl L verletzt in vielen Theorien jenseits des Standardmodells, aber häufig **$B - L$ erhalten**

Die Leptonen				
		Elektrische Ladung		Elektrische Ladung
Elektron		$-1 e$	Elektron-Neutrino	0
Myon		$-1 e$	Myon-Neutrino	0
Tau		$-1 e$	Tau-Neutrino	0

Flavorquantenzahlen

Flavorquantenzahlen der Quarks:

Quantenzahl	Quark	Antiquark
Starker Isospin T_3	u/d: $\pm 1/2$	$\bar{u}/\bar{d}$: $\mp 1/2$
Strangeness S	s: -1	$\bar{s}$: $+1$
Charm C	c: $+1$	$\bar{c}$: -1
Beauty (Bottomness) B'	b: -1	$\bar{b}$: $+1$
Truth (Topness) T	t: $+1$	$\bar{t}$: -1

- Konvention: Flavorquantenzahl besitzt **dasselbe Vorzeichen wie Ladung**
- Erhalten** in starker und elektromagnetischer Wechselwirkung, **verletzt** in schwacher Wechselwirkung (geladene Ströme **ändern** Flavor)

Die Quarks

Starke Hyperladung:

$$Y_S \equiv B + S + C + B' + T$$

→ Zusammenhang mit elektrischer Ladung: **Gell-Mann–Nishijima-Formel**

$$Q = T_3 + \frac{Y_S}{2}$$

Kurze Zusammenfassung

- Unterscheidungen: **diskrete vs. kontinuierliche Symmetrien, globale vs. lokale Symmetrien**
- Noether-Theorem: Verbindung von Symmetrien und **Erhaltungssätzen**
- Quantenmechanik: Verbindung von Symmetrien mit **Quantenzahlen**
- Symmetrien und Quantenzahlen im Standardmodell:
 - **Eichsymmetrien**: lokale kontinuierliche Symmetrien → Dynamik
 - **Diskrete** Symmetrien C, P, T und Kombinationen (→ nächstes Kapitel)
 - **Intrinsische** Quantenzahlen von Quarks, Hadronen und Leptonen: Ladung, schwacher Isospin, schwache Hyperladung, Farbladung, Baryonenzahl, Leptonen(familien-)zahl, Flavorquantenzahlen

Moderne Experimentalphysik III – Teilchen und Hadronen

Karlsruher Institut für Technologie
Sommersemester 2020 – 9. Vorlesung (Teil 2)

ULRICH HUSEMANN, KATHRIN VALERIUS

Bildquelle: CMS

Wiederholung: Symmetrien & Quantenzahlen

- Unterscheidungen: **diskrete vs. kontinuierliche Symmetrien**, **globale vs. lokale Symmetrien**
- Noether-Theorem: Verbindung von Symmetrien und **Erhaltungssätzen**
- Quantenmechanik: Verbindung von Symmetrien mit **Quantenzahlen**
- Symmetrien und Quantenzahlen im Standardmodell:
 - **Eichsymmetrien**: lokale kontinuierliche Symmetrien → Dynamik
 - **Diskrete** Symmetrien C, P, T und Kombinationen (→ nächstes Kapitel)
 - **Intrinsische** Quantenzahlen von Quarks, Hadronen und Leptonen: Ladung, schwacher Isospin, schwache Hyperladung, Farbladung, Baryonenzahl, Leptonen(familien-)zahl, Flavorquantenzahlen

Kapitel 5.2

Diskrete Symmetrien: C, P, T

Ladungskonjugation

- Allgemein: **diskrete** Symmetrien → **multiplikative** Quantenzahlen
- Mathematisch: selbstinverse Abbildung (Involution) für Eigenfunktionen

$$\hat{C}^2 |\psi\rangle = C(\hat{C} |\psi\rangle) = C^2 |\psi\rangle \stackrel{!}{=} |\psi\rangle \rightarrow C = \pm 1$$

- **Elektrodynamik:** minimale Kopplung (auch: minimale Substitution)

$$p_\mu \rightarrow p_\mu - qA_\mu$$

■ Ladungskonjugation für $A_\mu = (\phi/c, \mathbf{A})$:	$A_\mu \rightarrow -A_\mu$
■ Ladungskonjugation für $\mathbf{E} = -\text{grad } \phi - \partial\mathbf{A}/\partial t$:	$\mathbf{E} \rightarrow -\mathbf{E}$
■ Ladungskonjugation für $\mathbf{B} = \text{rot } \mathbf{A}$:	$\mathbf{B} \rightarrow -\mathbf{B}$
■ Ladungskonjugation für Kräfte: $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$:	$\mathbf{F} \rightarrow +\mathbf{F}$

C: Erhaltung und Verletzung

- Starke und elektromagnetische Wechselwirkungen: **C erhalten**
→ dieselbe Physik mit Teilchen und Antiteilchen
- Elektroschwache Wechselwirkung: **C „maximal verletzt“**
 - Ladungskonjugierter Prozess **existiert nicht** in Prozessen mit Austausch von W-Bosonen
 - Gleichzeitig: **Parität P maximal verletzt**
 - Details zur C- und P-Verletzung bei W-Bosonen-Austausch → später

Ladungskonjugation

- **Neutrale Teilchen: Eigenzustände** der Ladungskonjugation, z. B.
 - Photon: identifiziert mit Viererpotenzial $A_\mu \rightarrow$ ändert Vorzeichen unter $\hat{C}$
$$\hat{C} |\gamma\rangle = -|\gamma\rangle$$
 - Neutrales Pion: Zerfall in zwei Photonen (C-Symmetrie erhalten)
$$\hat{C} |\pi^0\rangle = \hat{C} |\gamma\gamma\rangle = (-1)^2 |\gamma\gamma\rangle = +|\pi^0\rangle$$
- Transformationen zwischen **Teilchen** und **Antiteilchen**:
 - Alle **ladungsartigen Quantenzahlen** umgekehrt: $+Q \rightarrow -Q$, $+B \rightarrow -B$, ...
 - Beispiel: $\hat{C} |u\rangle = |\bar{u}\rangle$ (up-Quark $\rightarrow$ up-Antiquark)
 - Teilchen mit ladungsartigen Quantenzahlen $\neq 0$: **keine C-Eigenzustände**

Ladungskonjugation

- **Teilchen-Antiteilchen-Paare:** Eigenzustände von $\hat{C}$
 - Häufig in Teilchenreaktionen der starken Wechselwirkung produziert (Baryonenzahlerhaltung)
 - Eigenwert abhängig von relativem Bahndrehimpuls ℓ zwischen Teilchen und Antiteilchen und Spin s des Paares:

$$\hat{C} |q\bar{q}\rangle = (-1)^{\ell+s} |q\bar{q}\rangle$$

- Beispiel: J/ψ = gebundener $c\bar{c}$ -Zustand, „Vektormeson“ mit $\ell = 0$, $s = 1$
→ Eigenwert $C = -1$

Parität

- Paritätsoperation = **Punktspiegelung** am Ursprung

Größe	Erläuterung	Eigenwert	Beispiel
Skalar		+1	Temperatur: $\hat{P}T = +T$
Vektor		-1	Orts- und Impulsvektor: $\hat{P}\mathbf{r} = -\mathbf{r}, \quad \hat{P}\mathbf{p} = -\mathbf{p}$
Axialvektor (Pseudovektor)	Vektor $\times$ Vektor	+1	Drehimpuls, B-Feld: $\hat{P}\mathbf{L} = +\mathbf{L}, \quad \hat{P}\mathbf{B} = +\mathbf{B}$
Pseudoskalar	Axialvektor $\cdot$ Vektor	-1	Helizität: $\hat{P}h = \hat{P} \frac{\mathbf{s} \cdot \mathbf{p}}{ \mathbf{s} \mathbf{p} } = -h$

Parität in der Quantenmechanik

• Paritätsoperator: $\hat{P} \rightarrow$ Punktspiegelung am Ursprung

$$- \hat{P} |\psi(\vec{r}, t)\rangle = |\psi(-\vec{r}, t)\rangle$$

$$- \text{Projektionsoperator: } \hat{P}^2 = \mathbb{1}$$

- Falls ψ Eigenfunktion von $\hat{P}$:

$$\hat{P} |\psi(\vec{r}, t)\rangle = |\psi(-\vec{r}, t)\rangle = \underset{\substack{| \\ \text{Eigenwert}}}{P} |\psi(\vec{r}, t)\rangle$$

gerade / ungerade Eigenfunktion: $P = \pm 1$

- Beispiel: Kugelflächenfunktionen

$$\hat{P} Y_{\ell m}(\theta, \phi) = Y_{\ell m}(\pi - \theta, \phi + \pi) = (-1)^{\ell} Y_{\ell m}(\theta, \phi)$$

- Projektion auf gerade / ungerade Eigenfunktionen:

$$\hat{P}_{\pm} \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} (\mathbb{1} \pm \hat{P})$$

$$\rightarrow \hat{P}_{\pm} |\psi(\vec{r}, t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\psi(\vec{r}, t)\rangle \pm |\psi(-\vec{r}, t)\rangle) \equiv |\psi_{\pm}\rangle$$

$$\rightarrow \hat{P} |\psi_{\pm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\psi(-\vec{r}, t)\rangle \pm |\psi(\vec{r}, t)\rangle) = \pm |\psi_{\pm}\rangle$$

Anwendung: Multipolübergänge

- **Gammastrahlung** = elektromagnetische Übergänge in Kernen
 - Klassifikation nach **Multipolordnung** (vgl. Atomphysik)
 - Formulierung von **Auswahlregeln** für erlaubte Übergänge
 - Messung über **Winkelverteilungen** in Gammaskopie
- Ansatz für Klassifikation von Gammastrahlung: **Multipolentwicklung** der Wechselwirkung des Kerns mit elektromagnetischen Feldern
 - Fermis Goldene Regel: Zerfallskonstante aus Matrixelement & Phasenraum

$$\lambda = \frac{1}{\tau} = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle \psi_f | \mathcal{M}_{fi} | \psi_i \rangle|^2 \rho(E_f)$$

- Matrixelement: **elektromagnetische** Wechselwirkung $\sim \frac{e}{m} \mathbf{p} \cdot \mathbf{A}$

- **Auswahlregeln für Gammastrahlung:**
 - Drehimpulserhaltung: Änderung des Gesamtdrehimpulses $\mathbf{J}$ durch relativen Drehimpuls $\mathbf{L}$ und Spin $\mathbf{s}$ des emittierten Photons: $\Delta\mathbf{J} = \mathbf{J}_f - \mathbf{J}_i = \boldsymbol{\ell} = \mathbf{L} + \mathbf{s}$
 - Charakterisierung des Anfangs- und Endzustands: Eigenwerte des Paritätsoperators ($P_{i,f}$) und des Gesamtdrehimpulsoperators ($J_{i,f}$)
- Elektromagnetische Wechselwirkung: **Paritätssymmetrie erhalten**
 - Multipolentwicklung: **Kugelflächenfunktionen** $Y_{\ell m}$ mit **definierter Parität**
 - **Multipolordnung** gegeben durch **Eigenwert** von ℓ
 - Elektrische Übergänge $E\ell$: $P_f \cdot P_i = (-1)^\ell$
 - Magnetische Übergänge $M\ell$: $P_f \cdot P_i = (-1)(-1)^\ell = (-1)^{(\ell+1)}$

Anwendung: Multipolübergänge

- Niedrigste Multipolmomente (Eigenwert Drehimpulsänderung: $\ell = 1$):
 - **Elektrischer Dipolübergang (E1):** Wechselwirkung mit elektrischem Dipolmoment $\mathbf{d} = e\mathbf{r} \rightarrow$ Zerfallskonstante

$$\lambda_{E1} = \frac{e^2}{3\pi\epsilon_0\hbar^4 c^3} E_\gamma^3 |\langle \psi_f | \mathbf{r} | \psi_i \rangle|^2$$

- **Magnetischer Dipolübergang (M1):** Wechselwirkung mit magnetischem Dipolmoment $\boldsymbol{\mu} = e/(2m)(\mathbf{L} + g\mathbf{s}) \rightarrow$ Zerfallskonstante

$$\lambda_{M1} = \frac{\mu_0}{3\pi\hbar^4 c^3} E_\gamma^3 |\langle \psi_f | \boldsymbol{\mu} | \psi_i \rangle|^2$$

(mit $\mathbf{L}$ Drehimpuls, $\mathbf{s}$ Spin, g gyromagnetischer Faktor)

Auswahlregeln

■ Austauschteilchen: **einzelnes Photon**

■ Drehimpulserhaltung (Erinnerung: $\ell = L + s$):

$$\mathbf{J}_f = \mathbf{J}_i + \ell \quad \rightarrow \quad |J_f - J_i| \leq \ell \leq J_f + J_i$$

■ Photon = masseloses Spin-1-Teilchen: $s = 1$, zwei transversale Polarisationen $m_s = \pm 1 \rightarrow$ kein Multipolübergang $J_i = 0 \rightarrow J_f = 0$

■ Photon kann zusätzlich relativen Drehimpuls L forttragen

■ Zusammenfassung: **Auswahlregeln**

■ Dipolübergänge E1, M1: $\Delta J \equiv |J_f - J_i| = 0, \pm 1$

■ Quadrupolübergänge E2, M2: $\Delta J = 0, \pm 1, \pm 2$

■ Multipolübergänge $E\ell, M\ell$: $\Delta J = 0, \dots, \pm\ell$

■ Übergänge mit $J_i = 0 \rightarrow J_f = 0$ verboten

■ Parität für $E\ell$: $P_f P_i = (-1)^\ell$, Parität für $M\ell$: $P_f P_i = (-1)^{(\ell+1)}$

Beispiele (nach Bethge):

$$\frac{J^P = 1^+}{\quad}$$

$$\frac{J^P = 0^+}{\quad}$$

$\ell = 1, P_f P_i = 1$
 $\rightarrow$ M1-Übergang

$$\frac{J^P = 1^-}{\quad}$$

$$\frac{J^P = 0^+}{\quad}$$

$\ell = 1, P_f P_i = -1$
 $\rightarrow$ E1-Übergang

$$\frac{J^P = 3/2^+}{\quad}$$

$$\frac{J^P = 1/2^+}{\quad}$$

$1 \leq \ell \leq 2, P_f P_i = 1$
 $\rightarrow$ gemischter M1- und E2-Übergang

Zerfallskonstante

- Gesamter Gammazerfall: **Überlagerung** erlaubter Übergänge
 - „Wichtigkeit“ über **Zerfallskonstante λ**
 - Dieselbe Multipolordnung: Zerfallskonstante für $M\ell$ **kleiner** als für $E\ell$ (zusätzlicher Faktor v/c), höhere Multipolordnungen **stark unterdrückt**
 - Beispiel $3^+ \rightarrow 1^+$ -Übergang: $E2$, $M3$, $E4$ erlaubt, $E2$ dominant
 - Beispiel ^{110m}Ag : erster erlaubter Übergang $6^+ \rightarrow 2^-$ ($M4$)
→ metastabiles **Kernisomer** mit $t_{1/2} = 249,8$ d
- Starke **Energieabhängigkeit**: $\lambda \sim E_\gamma^{2\ell+1}$

nach S.A. Moszkowski, Theory of Multipole Radiation, 1965

Kurze Zusammenfassung

- Ladungskonjugation C: **Teilchen** $\leftrightarrow$ **Antiteilchen**
 - Eigenzustände: neutrale Teilchen und Teilchen-Antiteilchen-Paare
- Parität P:
 - Geometrisch: **Punktspiegelung** am Ursprung
 - Skalar: $P = +1$, Pseudoskalar: $P = -1$, Vektor: $P = -1$, Axialvektor: $P = +1$
- Anwendung: **Auswahlregeln** für Gammastrahlung von Kernen
 - **Paritätserhaltung** für elektromagnetische Prozesse
→ Entwicklung in Kugelflächenfunktionen mit definierter Parität
 - Elektrische und magnetische **Multipolübergänge** $E\ell$, $M\ell$
 - Zusammenhang mit **Zerfallskonstante**: höhere Ordnungen ℓ stark unterdrückt

Moderne Experimentalphysik III – Teilchen und Hadronen

Karlsruher Institut für Technologie
Sommersemester 2020 – 9. Vorlesung (Teil 3)

ULRICH HUSEMANN, KATHRIN VALERIUS

Bildquelle: CMS

Kurze Wiederholung

- Ladungskonjugation C: **Teilchen** $\leftrightarrow$ **Antiteilchen**
 - Eigenzustände: neutrale Teilchen und Teilchen-Antiteilchen-Paare
- Parität P:
 - Geometrisch: **Punktspiegelung** am Ursprung
 - Skalar: $P = +1$, Pseudoskalar: $P = -1$, Vektor: $P = -1$, Axialvektor: $P = +1$
- Anwendung: **Auswahlregeln** für Gammastrahlung von Kernen
 - **Paritätserhaltung** für elektromagnetische Prozesse
→ Entwicklung in Kugelflächenfunktionen mit definierter Parität
 - Elektrische und magnetische **Multipolübergänge** $E\ell$, $M\ell$
 - Zusammenhang mit **Zerfallskonstante**: höhere Ordnungen ℓ stark unterdrückt

Kapitel 5.2

Diskrete Symmetrien: C, P, T

Eigenparität

- Betrachte Parität von Teilchen mit Impuls $\mathbf{p}$ und Spin $\mathbf{s}$
- **Eigenparität** fundamentaler Teilchen:
betrachte Paritätsoperation im Ruhesystem
 - **Fermionen**: Teilchen und Antiteilchen haben **entgegengesetzte** Parität (Konsequenz der Dirac-Gleichung)
 - **Bosonen**: Teilchen und Antiteilchen haben **dieselbe** Parität
- Übliche **Konvention** zur Festlegung der Eigenparität:
 - Fermionen (z. B. p , n , e): Paritätseigenwert $P = +1$
 - Quarks und Leptonen: $P = +1$
 - Antiquarks und Antileptonen: $P = -1$
 - Mesonen: zusätzlich relativer $q\bar{q}$ -Drehimpuls: $P = (-1)^{\ell+1}$

Eigenparität

- Eigenparität von **Photonen**: $P = -1$ und Spin 1 („Vektorteilchen“)

- Klassische Konvention für Parität von A_μ , so dass **E** Vektor, **B** Axialvektor:

$$\hat{P}A_\mu = \hat{P}(\phi/c, \mathbf{A}) = (\phi/c, -\mathbf{A})$$

- Quantenzahlen des Photons in spektroskopischer Notation: $J^{PC} = 1^{--}$

- Eigenparität von **Pionen**: $P = -1$ und Spin 0 („pseudoskalares Teilchen“)

- „Mesisches Atom“: Einfang π^- durch Deuteron $\rightarrow$ Übergang in Zustand mit $\ell = 0$
- Beobachtung: Absorption des π^- in Kern mit Prozess $\pi^- + d \rightarrow n + n$
- Beträge der Spins: $s(d) = 1$, $s(\pi) = 0 \rightarrow$ mit $\ell = 0$: Gesamtdrehimpuls $J = 1$
- Parität des Deuterons: $d = p + n \rightarrow P = +1$
- Parität im Endzustand: 2 Neutronen = identische Fermionen $\rightarrow P = -1$
- Folgerung für Parität des Pions: $P = -1$

Helizität = Drehsinn

- Helizität h : Projektion von **Spin** auf **Impulsrichtung** → pseudoskalar
- Helizität definiert **Drehsinn** eines Systems:
 - **Rechtsdrehung (RH)**: Spin **parallel** zu Impuls
 - **Linksdrehung (LH)**: Spin **antiparallel** zu Impuls
- Helizität physikalischer Systeme:
 - „**Gute**“ **Quantenzahl**: vertauscht mit Hamiltonoperator
 - **Nicht lorentzinvariant**: für massive Teilchen kann immer Bezugssystem gefunden werden, in dem sich Impuls umkehrt, Spin aber nicht
 - Für massive Spin-1/2-Fermionen: vier Zustände
→ Teilchen/Antiteilchen jeweils mit $h = \pm 1$

Chiralität = Händigkeit

- Abstrakte Eigenschaft von Fermionen:

Chiralität = Eigenwert eines **Spinors** unter Operator $\gamma^5 = i \gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \gamma^3$

- Falls $\gamma^5 u(p) = +u(p)$: $u(p)$ Spinor eines **rechtshändigen** Teilchens
- Falls $\gamma^5 u(p) = -u(p)$: $u(p)$ Spinor eines **linkshändigen** Teilchens
- Paritätsoperation: Umwandlung linkshändige $\longleftrightarrow$ rechtshändige Spinoren
- **Projektion** der rechts- und linkshändigen Komponenten beliebiger Spinoren

$$\hat{P}_R = \frac{1}{2}(1 + \gamma^5), \quad \hat{P}_L = \frac{1}{2}(1 - \gamma^5)$$

- Relevanz:

- Für **masselose** Teilchen bzw. $E \gg mc^2$: **Chiralität = Helizität**
- Elektroschwache Wechselwirkung: W-Bosonen koppeln nur an **linkshändige Teilchen** und **rechtshändige Antiteilchen** $\rightarrow$ Parität **maximal verletzt**

Zeitumkehr

- Zeitumkehroperation T : $t \rightarrow -t$ und komplex konjugierter Spinor
 - T-Invarianz für Teilchenreaktionen: **derselbe Wirkungsquerschnitt** für Hin- und Rückreaktion
 - Quantenmechanische Formulierung subtil...
- **Elektrisches Dipolmoment d des Neutrons (EDM):**
 - Spinachse = einzige ausgezeichnete Richtung
 - d Vektor, s Axialvektor $\rightarrow d \neq 0$: Verletzung von T und P
 - nEDM (PSI): $|d| < 1,8 \cdot 10^{-26} e \text{ cm}$ ([PRL 124 \(2020\) 081803](#))
- BaBar: **T-Verletzung direkt beobachtet**
 - Vergleich von Hin- und Rückreaktion bei B-Mesonen ([Phys. Rev. Lett. 109 \(2012\) 211801](#))

Knecht, [NEDM_PT_violation.png](#),
gemeinfrei

CPT-Theorem und CP-Symmetrie

- **CPT-Theorem** (Pauli, Lüders, 1957): jede lokale lorentzinvariante Quantenfeldtheorie ist invariant unter gemeinsamen Transformationen von C, P und T
- Kombinierte **CP-Symmetrie**: Umwandlung eines Teilchens in ein Antiteilchen mit umgekehrter Chiralität (z. B. rechtshändiges Elektron $\leftrightarrow$ linkshändiges Positron)
- **Elektroschwache** Wechselwirkung (W- und Z-Bosonen-Austausch): auch kombinierte **CP-Symmetrie verletzt** (kleiner Effekt)
 → CPT-Theorem: T-Symmetrie ebenfalls verletzt

C, CP und Baryonenasymmetrie

■ Diskrete Symmetrien und Entstehung des Universums:

- Nach Urknall: ungefähr dieselbe Zahl der Baryonen n_b und Photonen n_γ , aber große **Baryonenasymmetrie** η beobachtet

$$\eta \equiv \frac{n_b - n_{\bar{b}}}{n_\gamma} \approx 6 \cdot 10^{-10}$$

- Interpretation: Paarvernichtung von Materie und Antimaterie während Phase der **Baryogenese** (zeitlich vor primordialer Nukleosynthese) bis auf $1:10^9$

■ **Notwendige Bedingungen** für Baryonenasymmetrie: für Prozesse im frühen Universum muss gelten (A. Sacharow, JETP Lett. 5 (1967) 24)

- Nichterhaltung der Baryonenzahl
- Verletzung der C- und der CP-Symmetrie
- Kein thermisches Gleichgewicht

A. Sacharow

© BELGA_SCIENCE

Aufgabe 18

- Welche Aussagen über die C-, P- und T-Symmetrie sind korrekt?
 - A. Neutrale Teilchen sind Eigenzustände der Ladungskonjugation, Teilchen mit ladungsartigen Quantenzahlen ungleich Null nicht.
 - B. Ist eine physikalische Theorie nicht zeitumkehrinvariant, sind die Wirkungsquerschnitte für Hin- und Rückreaktion unterschiedlich.
 - C. Die Eigenparität von Teilchen und Antiteilchen ist gleich.
 - D. Im Grenzfall masseloser Teilchen sind Chiralität und Helizität gleich.
 - E. Die Chiralität ist eine gute Quantenzahl, aber nicht lorentzinvariant.
- Bitte beantworten Sie diese Frage anonym auf ILIAS:
https://ilias.studium.kit.edu/goto.php?target=fold_1080516&client_id=produktiv

Kurze Zusammenfassung

- Fundamentale Teilchen: **Eigenparität**
 - **Helizität**: Projektion von Spin auf Impulsrichtung
→ **Drehsinn** (nicht lorentzinvariant)
 - **Chiralität**: Eigenwerte unter γ^5 → **Händigkeit**
→ Paritätsoperation P: **linkshändige** $\leftrightarrow$ **rechtshändige** Teilchen
- Zeitumkehr T: **derselbe Wirkungsquerschnitt** für Hin-/Rückreaktion
- **Kombinierte Symmetrien**:
 - CPT-Theorem: jede lokale lorentzinvariante Quantenfeldtheorie invariant unter kombinierter CPT-Transformation
 - Verletzung der C und CP-Symmetrie: Voraussetzung für beobachtete **Baryonenasymmetrie** im Universum (Sacharow-Kriterien)