4. Moleküle und Festkörper

Prof. David Hunger

Physikalisches Institut, KIT Fakultät für Physik

4.2. Chemische Bindung

Wellenfunktion in endlichem Potentialtopf

Was passiert, wenn man
zwei Atome zusammen bringt?

numerische Lösung
der S-Gl. für das
Doppelpotential

Wellenfunktion in endlichem Potentialtopf

sukzessive Annäherung

Beobachtung

- Wellenfunktionen erst der angeregten, dann auch der niedrigen Zustände beginnen zu überlappen
- Aufspaltung der Energieniveaus
- Symmetrische & antisymmetrische Wellenfunktionen
- Symmetrische Wellenfunktionen haben niedrigere Energie

Kovalente Bindung

- Simulationsexperiment zeigt Verhalten der kovalenten Bindung

weit auseinander liegende Kästen

Wellenfunktion kann symmetrisch oder antisymmetrisch sein

Naheliegende Kästen

- Wellenfunktionen überlappen
- die symmetrische hat eine hohe, die antisymmetrische eine kleine Aufenthaltswahrscheinlichkeit zwischen den Atomen
- die mittlere Krümmung (2. Ableitung $\triangleq$ Impuls) der antisymmetrischen Wellenfunktion ist größer.

→ Potentielle und kinetische Energie und damit auch die Gesamtenergie der Lösungen unterscheiden sich !

Kovalente Bindung

Beispiel Wasserstoff

- Jedes Wasserstoff Atom trägt ein Elektron bei
- Bei antisymmetrischer Spinfunktion finden beide Elektronen im symmetrischen Zustand Platz

Tipler, Physik

- Symmetrische Wellenfunktion: Ladungsdichte zwischen Protonen hoch
→ abstoßende Protonenladung wird teilweise abgeschirmt
- Antisymmetrische Wellenfunktion: Ladungsdichte zwischen den Protonen gering, keine Abschirmung

Abstandsabhängigkeit der Energie von 2 H Atomen

Kovalente Bindung

Beispiel Helium

- Jedes Helium Atom trägt zwei Elektronen bei
- Pauli Prinzip: Besetzung sowohl der symmetrischen als auch der antisymmetrischen Ortswellenzustände mit je zwei Elektronen
 - keine Netto Energieabsenkung
 - es gibt keine Helium Moleküle

(rein) kovalente Bindungen treten zwischen gleichen Atomsorten auf, wenn es genügend Zustände für antisymmetrische Spin-Konfigurationen gibt.

Kovalente Bindung

- Kovalente Bindung aus zwei Elektronen aus s-Orbitalen:
 σ – Bindung

- Kovalente Bindung aus zwei Elektronen aus p-Orbitalen:
 π – Bindung

Besonderheit beim Kohlenstoff (C)

- Grundzustand: $1s^2 2s^2 2p^2 \rightarrow$ 2-fache π – Bindung
- Angeregter Zustand: $1s^2 2s^1 2p^3$
- es kann günstiger sein, ein Elektron anzuregen und eine weitere Bindung einzugehen
→ es stehen ggf 4 Elektronen für Bindungen zur Verfügung
- 4 Linearkombinationen der Wellenfunktionen $\psi_{2s}, \psi_{2p_x}, \psi_{2p_y}, \psi_{2p_z}$ führen zu **Hybrid-Orbitalen** mit gleicher Energie, gerichteter Charakter
- sp^3 –Hybridisierung bei vierwertigem Kohlenstoff

Methan-Molekül

Ionenbindung

- Bindung zwischen Alkalimetall (einzelnes „Leuchtelektron“) und Halogen (ein Elektron fehlt zur vollen Schale)
- energetisch günstig: Alkalimetall ionisiert, Elektron bindet an Halogen

Beispiel: Kochsalz – NaCl

- Ionisierungsenergie Na 5.14 eV
- Elektronenaffinität Cl -3.62 eV
- Differenz 1.52 eV

- Coulomb Anziehung: bei Abstand 0.95nm gerade 1.52 eV
- Bei kleineren Abständen entsteht gebundener Zustand $\text{Na}^+ \text{Cl}^-$
- Bei sehr kleinen Abständen überlappen innere Orbitale
- Pauli Prinzip: Elektronen müssten in höhere Niveaus ausweichen → Abstoßung

Weitere Bindungsformen

Van der Waals Kräfte

- induzierte oder permanente elektrische Dipolmomente
- führen zu Kondensation von Materie zu festen Körpern

Wasserstoff-Brückenbindung

- H⁺-Ion als Bindeglied zwischen Atomen & Molekülen

Metallische Bindung

- Elektronen aus äußeren Schalen bewegen sich als Gas zwischen den positiven Metallionen
- Ionen in Raumgitter gebunden

Molekulare Energieniveaus und Spektren

Rotationsanregung

- Klassisch: $E_{rot} = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{L^2}{2I}$

- Quantenmechanisch: Drehimpuls quantisiert: $L^2 = J(J + 1)\hbar^2$

$$E_{rot} = J(J + 1)B, \quad B = \frac{\hbar^2}{2I} \quad \text{charakteristische Rotationsenergie}$$

Vibrationsanregung

- Approximation: Harmonischer Oszillator

$$E_{vib} = \hbar\omega_{vib} \left(n + \frac{1}{2} \right),$$

$$\omega_{vib} = \sqrt{k/\mu} \quad \mu \text{ reduzierte Masse}$$

Molekulare Spektren

Elektronische Übergänge

- Unterschiedliche Gleichgewichtspositionen für Kerne in Grund- & angeregtem Zustand
- Elektron- & Kernwellenfunktion separierbar

$$|\psi\rangle = |\phi\rangle|\chi\rangle$$

el. Vibrationszustand

Übergangsstärke $W_{n,m} \sim |\langle \phi_e \chi_e(m) | \hat{\mu} | \phi_g \chi_g(n) \rangle|^2$

$$W_{n,m} \sim \mu_{eg}^2 |\langle \chi_e(m) | \chi_g(0) \rangle|^2$$

Franck-Condon Faktor

= Überlapp zwischen vibronischen Wellenfunktionen

Molekulare Spektren

Schwingungs und Rotationsniveaus eines zweiatomigen Moleküls

typische Größenordnung: $\hbar\omega_{vib} \sim 0.1 \text{ eV}$
 ~ 10 mal größer als $k_B T$ (0.026 eV bei 300K)
 ~ 100 mal größer als typische Rotationsenergien

Molekulare Spektren

Unterstruktur von Rotationsübergängen

Spektrum von H_2

- Vibrationsübergänge
- feinere Rotations Unterstruktur