Übungsblatt 4

Dr. Markus Roth, Max Stadelmaier
Institut für Astroteilchenphysik

17.12.2020 - 14.01.2020
Gesamtpunktzahl: 25

Nächster Termin

Donnerstag, 14.01.

10.00 Uhr - 11.30 Uhr

<https://zoom.us/j/99143262888?pwd=WVhsS1diWVlZYWlvYXlyMHd4NUF6UT09>.

Meeting-ID: 991 4326 2888

Kenncode: 601988

Frohe Feiertage!

12 Diffusion kosmischer Strahlung

3 + 3 + 2 = 8

Betrachten Sie ein vereinfachtes Modell der kosmischen Strahlung (CR) unserer Galaxie, welche als Scheibe von einer Höhe H und einem Radius R , mit $H \ll R$ genähert werden kann. Diffusionsprozesse finden hauptsächlich senkrecht zur galaktischen Scheibe statt, und hängen daher näherungsweise nur von der senkrechten Koordinate z ab. Die Teilchendichte n der CR erfülle die Differentialgleichung

$$\frac{\partial n}{\partial t} - D \frac{\partial^2 n}{\partial z^2} = Q(z, t), \quad (1)$$

wobei $D = \frac{1}{3}\gamma\lambda$ den Diffusionskoeffizienten bezeichnet und $Q(z, t)$ den Quellterm der CR. Für eine Supernovaexplosion können wir hier annehmen, dass der Quellterm die Gestalt

$$Q(z, t) = Q_0 \delta(z)\delta(t)$$

annimmt.

Die Diffusionsgleichung beschreibt im Allgemeinen Prozesse mit Bewegung von zufälliger Natur (Wiener-Prozesse, *random walk*), wobei für die Varianz der Aufenthaltswahrscheinlichkeit an einem bestimmten Ort $\sigma^2 \sim t$ gilt.

(a) Zeigen Sie, dass

$$n = \frac{n_0}{\sqrt{2\pi\sigma(t)^2}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{z}{\sigma(t)}\right)^2} \quad (2)$$

eine Lösung von Gl. (1) ist. Bestimmen Sie n_0 und $\sigma(t)$. Veranschaulichen Sie ihre Lösung grafisch (Plots oder Skizzen).

- (b) Berechnen Sie den Anteil an Teilchen, der nach einer verstrichenen Zeit von t_0 noch in der Galaxie vorhanden ist,

$$p_n = \int_{-H}^H n(z, t_0) dz.$$

Nehmen Sie an, dass ¹

$$\lambda = 3 \cdot 10^{-15} \frac{\text{pc}^2}{\text{s}},$$

und betrachten Sie Protonen bei $E \simeq 10^{10}$ eV ($\Rightarrow \gamma \simeq 10$). Nutzen Sie ihr Ergebnis aus (a), oder alternativ $\sigma = \sqrt{2.3 D t}$. Wann befinden sich noch 99% der ursprünglichen Teilchen innerhalb der Galaxie? Was schlussfolgern Sie?

- (c) Ab welcher Energie können Teilchen (Protonen) die Galaxie verlassen? Nehmen Sie an, dass dazu nach $t \simeq 10^{14}$ s noch die Hälfte der ursprünglich freigesetzten Teilchen in diesem vereinfachten Modell innerhalb der Scheibe von $z < \pm H$ vorhanden ist. Sie können Ihr Ergebnis mit [1] vergleichen.

HINWEISE:

$\rightarrow$ Alter des Universums: $t_{\text{Univ}} \simeq 10^{22}$ s.

$\rightarrow$ Alter der Galaxie: $t_{\text{MW}} \simeq 4.3 \cdot 10^{17}$ s.

13 Leaky-Box-Modell

1 + 1 + 4 = 5

Die Ausbreitung der kosmischen Strahlung kann durch folgende Transportgleichung beschrieben werden:

$$\frac{\partial n_i}{\partial t} = \nabla D \nabla n_i + Q_i + \frac{\partial}{\partial E} (b_i(E) n_i) - \frac{n_i}{\tau_{\text{spal},i}} - \frac{n_i}{\tau_{\text{rad},i}} + \sum_{j>i} \frac{p_{ji}}{\tau_j} n_j \quad (3)$$

- (a) Erklären Sie die Bedeutung der einzelnen Terme.

Im Leaky-Box-Modell wird ein Gleichgewichtszustand,

$$\frac{\partial n_i}{\partial t} \simeq 0,$$

betrachtet, und der Diffusionsterm ersetzt,

$$\nabla D \nabla n_i \rightarrow -\frac{n_i}{\tau_{\text{esc},i}},$$

wobei für die Teilchen n_i eine mittlere *Escape-Zeit* $\tau_{\text{esc},i}$ angenommen wird. Weiterhin werden alle Isotope eines Elementes ausschließlich durch Spallation erzeugt. Die Produktionsrate für Isotop i sei gegeben durch

$$C_i = \sum_{j>i} \frac{p_{ji}}{\tau_j} n_j \simeq \text{const}.$$

Weiterhin werde der Energiegewinn- und verlust vernachlässigt.

¹Alfvén-Geschwindigkeit $\times$ Charakteristische Längenskala für Magnetfelder im interstellaren Medium[1]

- (b) Wie vereinfacht sich die Transportgleichung aus Gl. (3) für radioaktive und nicht-radioaktive Isotope?
- (c) Geben Sie das Verhältnis der Häufigkeit eines radioaktiven Isotops und eines nicht-radioaktiven Isotops mit Hilfe der Näherungen des Leaky-Box-Modells aus (b) an. Nehmen Sie an, dass

$$\tau_{\text{spal}} \gg \tau_{\text{esc}} \quad \text{und} \quad \tau_{\text{spal}} \gg \tau_{\text{rad}}.$$

14 Das Alter der galaktischen kosmischen Strahlung

2 + 5 = 7

- (a) Berechnen Sie das Alter der galaktischen kosmischen Strahlung, aus dem Verhältnis der Häufigkeit von ^{10}Be - und ^9Be -Kernen. Nutzen Sie dazu ihr Ergebnis aus Aufgabe 13. Entnehmen Sie Zahlenwerte für die relative Häufigkeit aus [2] (z.B. Table 2), und nutzen Sie $\tau_{\text{rad}}(^{10}\text{Be}) \simeq 1.5 \cdot 10^6$ a. Nehmen Sie an dass

$$\tau_{\text{esc}}(^{10}\text{Be}) \simeq \tau_{\text{esc}}(^9\text{Be}).$$

Sie können Näherungsweise

$$C(^{10}\text{Be})/C(^9\text{Be}) \simeq 10$$

verwenden. Ist das Ergebnis konsistent mit den Implikationen aus Aufgabe 12?

- (b) Fassen Sie die Analyse und das Ergebnis aus [2] kurz zusammen.

15 Neujahrsquiz

10 · 0.5 = 5

Diese Aufgaben können kurz und ohne Herleitung beantwortet werden und müssen **nicht** vorgestellt werden. Senden Sie ihre Antworten an max.stadelmaier@kit.edu.

- (i) Wie ist das Längenmaß Parsec ($\simeq 3.1 \cdot 10^{16}$ m) definiert?
- (ii) Was bezeichnet Sgr. A*?
- (iii) Welche Aussage impliziert das folgende Schaubild?

- (iv) Welches ist der der Erde am nächsten gelegene Stern? Welche ist die der Milchstraße am nächsten gelegene Galaxie?
- (v) Warum entwickeln Galaxien Spiralarme?
- (vi) Was ist ein *Redshift survey*? Was bedeutet

$$z = 0.158$$

des Quasars 3C-273 [3] in diesem Zusammenhang?

- (vii) Welche Teilchen finden Sie im Spektrum der kosmischen Strahlung bei $E \simeq 10^{10}$ eV?
- (viii) Welche Materialien sind für Tscherenkow-Detektoren geeignet?
- (ix) Was sind mögliche Quellen der kosmischen Strahlung?
- (x) Zeigen Sie, dass für Luftschauer, die durch kosmische Strahlung ausgelöst werden,

$$X_{\max} \sim \ln(E_{\text{prim}}/\text{eV})$$

gilt.

Einzelnachweise

- [1] J. Skilling, *The Diffusion Of Cosmic Rays*, 1970,
http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?1970MNRAS.147...1S&defaultprint=YES&filetype=.pdf
- [2] M.Garcia-Munoz, G.M. Mason, and J.A. Simpson, *The Age of the Galactic Cosmic Rays Derived from the ABundance of ^{10}Be* , 1977,
<http://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/1977ApJ...217..859G>
- [3] Quasar 3C 273,
https://en.wikipedia.org/wiki/3C_273