Theoretische Physik B, SS 2005

Musterlösung zum Übungsblatt 4

Besprechung: 23/05/2005

Institut für Theoretische Festkörperphysik

Prof. Dr. Gerd Schön, Dr. Alexander Shnirman (11/03, Tel.: 608-6030)

<http://www-tfp.physik.uni-karlsruhe.de/~shnirman>

1) Sphärisches Pendel

1a) Die kinetische Energie lautet

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) .$$

Für die potenzielle Energie gilt

$$U = mgz .$$

Wir drücken T und U in Polar-Koordinaten aus. Dazu benötigen wir ($\dot{r} = 0$)

$$\dot{x} = r \cos \theta \cos \phi \dot{\theta} - r \sin \theta \sin \phi \dot{\phi} \quad (1)$$

$$\dot{y} = r \cos \theta \sin \phi \dot{\theta} + r \sin \theta \cos \phi \dot{\phi} \quad (2)$$

$$\dot{z} = -r \sin \theta \dot{\theta} \quad (3)$$

Dann gilt ($r = l$)

$$T = \frac{1}{2}ml^2(\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta)$$

und

$$U = mgl \cos \theta$$

Die Lagrange-Funktion lautet dann

$$L = T - U = \frac{1}{2}ml^2(\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta) - mgl \cos \theta$$

Die Bewegungsgleichungen (Lagrange-Gleichungen 2. Art) sind

$$ml^2\ddot{\theta} = ml^2\dot{\phi}^2 \sin \theta \cos \theta + mgl \sin \theta \quad (4)$$

$$\frac{d}{dt} (ml^2\dot{\phi} \sin^2 \theta) = 0 \quad (5)$$

1b) Wir berechnen jetzt die z-Projektion des Drehimpulses $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$

$$L_z = xp_y - yp_x = mx\dot{y} - my\dot{x} = ml^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}$$

wobei Gl. (1) und Gl. (2) benutzt wurden. Die zweite Bewegungsgleichung Gl. (5) bedeutet, also, dass L_z erhalten ist, $L_z = const.$ Dann können wir $\dot{\phi}$ eliminieren:

$$\dot{\phi} = \frac{L_z}{ml^2 \sin^2 \theta}$$

Wir setzen dies in die Gl. (4) ein. Das ergibt

$$ml^2\ddot{\theta} - \frac{L_z^2 \cos \theta}{ml^2 \sin^3 \theta} - mgl \sin \theta = 0$$

Wir multiplizieren diese Gleichung mit $\dot{\theta}$. Das ergibt

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} ml^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} \frac{L_z^2}{ml^2 \sin^2 \theta} + mgl \cos \theta \right) = 0$$

Also sehen wir dass die Größe

$$E = \frac{1}{2} ml^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} \frac{L_z^2}{ml^2 \sin^2 \theta} + mgl \cos \theta$$

erhalten ist. Das ist die Energie. Das folgt auch aus $E = T + U$ und $T = \frac{1}{2} ml^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} \frac{L_z^2}{ml^2 \sin^2 \theta}$.

1c) Jetzt können wir die Energie in der Form $E = \frac{1}{2} ml^2 \dot{\theta}^2 + U_{\text{eff}}(\theta)$ schreiben, wobei

$$U_{\text{eff}}(\theta) = \frac{1}{2} \frac{L_z^2}{ml^2 \sin^2 \theta} + mgl \cos \theta .$$

Diese Funktion ist in Abb. 1 skizziert. Die Funktion hat ein Minimum für $\theta = \theta_c(L_z)$ und dies ist die Lösung der Bewegungsgleichungen in der keine Bewegung in die θ -Richtung statt findet. Das Pendel dreht mit $\theta = \theta_c = \text{const.}$ und $\dot{\phi} = \frac{L_z}{ml^2 \sin^2 \theta_c} = \text{const.}$ um.

Abbildung 1: $U_{\text{eff}}(\theta)$.

2. Das relativistische Teilchen

Die Lagrange-Funktion lautet

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{\dot{\vec{r}}^2}{c^2}} - U(\vec{r})$$

Die Energie ist

$$E = \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{r}}} \dot{\vec{r}} - L = \frac{m\dot{r}^2}{\sqrt{1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2}}} + mc^2 \sqrt{1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2}} + U(\vec{r}) = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2}}} + U(\vec{r})$$

Wenn $|\dot{\vec{r}}| \ll c$ ergibt das

$$E \approx mc^2 + \frac{m\dot{r}^2}{2} + U(\vec{r})$$

Die Bewegungsgleichung lautet

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{r}}} = \frac{\partial L}{\partial \vec{r}}$$

Das ergibt

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{m\dot{\vec{r}}}{\sqrt{1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2}}} \right) = -\frac{\partial U}{\partial \vec{r}}$$

3. Der Lenzsche Vektor

(3a) Die Lagrange-Funktion lautet $L = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \alpha/r$. Die Bewegungsgleichung ist

$$m\ddot{\vec{r}} = \frac{\partial}{\partial \vec{r}} \left(\frac{\alpha}{r} \right) = -\frac{\alpha\vec{r}}{r^3} \quad (6)$$

Jetzt berechnen wir $\dot{\vec{V}}_{Lenz}$

$$\dot{\vec{V}}_{Lenz} = \dot{\vec{p}} \times \vec{L} - \frac{m\alpha\dot{\vec{r}}}{r} + \frac{m\alpha(\vec{r} \cdot \dot{\vec{r}})\vec{r}}{r^3} = \dot{\vec{p}} \times \vec{L} + \frac{m\alpha}{r^3} [\vec{r} \times (\vec{r} \times \dot{\vec{r}})]$$

wobei wir $\dot{\vec{L}} = 0$ und $\vec{x} \times (\vec{y} \times \vec{z}) = \vec{y}(\vec{x} \cdot \vec{z}) - \vec{z}(\vec{x} \cdot \vec{y})$ benutzt haben. Wir setzen $\dot{\vec{p}} = m\ddot{\vec{r}}$ ein und benutzen Gl. (6). Das ergibt

$$\dot{\vec{V}}_{Lenz} = -\frac{\alpha}{r^3} \vec{r} \times \vec{L} + \frac{m\alpha}{r^3} [\vec{r} \times (\vec{r} \times \dot{\vec{r}})] = 0$$

(3b) Da die Ebene der Bahn senkrecht zu $\vec{L}$ liegt gilt

$$\vec{V}_{Lenz} \cdot \vec{L} = (\vec{p} \times \vec{L}) \cdot \vec{L} - \frac{m\alpha}{r} \vec{r} \cdot \vec{L} = 0$$

Jetzt berechnen wir $\vec{V}_{Lenz} \cdot \vec{r} = r V_{Lenz} \cos \theta$

$$\vec{V}_{Lenz} \cdot \vec{r} = (\vec{p} \times \vec{L}) \cdot \vec{r} - m\alpha r = (\vec{r} \times \vec{p}) \cdot \vec{L} - m\alpha r = L^2 - m\alpha r$$

Dann für die Bahnkurve gilt

$$r(\theta) = \frac{L^2}{m\alpha + V_{Lenz} \cos \theta}$$

Abbildung 2: Die Bahnkurve für den Fall $V_{Lenz} < m\alpha$. Es gilt $r_{\min} = \frac{L^2}{m\alpha + V_{Lenz}}$ und $r_{\max} = \frac{L^2}{m\alpha - V_{Lenz}}$.

Abbildung 3: Die Bahnkurve für den Fall $V_{Lenz} > m\alpha$. Es gilt $r_{\min} = \frac{L^2}{m\alpha + V_{Lenz}}$.

Die Bahnkurve für den Fall $V_{Lenz} < m\alpha$ ist in Abb. 2 skizziert. Es gilt $r_{\min} = \frac{L^2}{m\alpha + V_{Lenz}}$ und $r_{\max} = \frac{L^2}{m\alpha - V_{Lenz}}$. Die Bahnkurve für den Fall $V_{Lenz} > m\alpha$ ist in Abb. 3 skizziert. Es gilt $r_{\min} = \frac{L^2}{m\alpha + V_{Lenz}}$.

(3c)*

i) Es gilt

$$\delta L = \frac{\partial L}{\partial \vec{r}} \delta \vec{r} + \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{r}}} \delta \dot{\vec{r}}$$

Wir setzen die Bewegungsgleichung

$$\frac{\partial L}{\partial \vec{r}} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{r}}}$$

ein. Das ergibt

$$\delta L = \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{r}}} \right) \delta \vec{r} + \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{r}}} \delta \dot{\vec{r}} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{r}}} \delta \vec{r} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{r}}} \vec{\psi} \right) \epsilon$$

Es wurde angenommen, dass

$$\delta L = \frac{d}{dt} \xi(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) \epsilon$$

Dann

$$\delta L - \delta L = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{r}}} \vec{\psi} - \xi \right) \epsilon = \dot{I} \epsilon = 0$$

Also $\dot{I} = 0$, d.h., I ist erhalten.

ii) Wir berechnen δL für $\delta \vec{r} = \vec{\psi} \epsilon$ und $\vec{\psi} = (\vec{b} \times \dot{\vec{r}}) \times \vec{r}$. Das ergibt

$$\delta L = m \dot{\vec{r}} \delta \dot{\vec{r}} - \frac{\alpha \vec{r} \delta \vec{r}}{r^3}$$

Da $\vec{\psi}$ senkrecht zu $\vec{r}$ ist gilt $\vec{r} \delta \vec{r} = 0$. Dann gilt

$$\delta L = m \dot{\vec{r}} \delta \dot{\vec{r}} = m \dot{\vec{r}} \cdot [(\vec{b} \times \ddot{\vec{r}}) \times \vec{r}] \cdot \epsilon + m \dot{\vec{r}} \cdot [(\vec{b} \times \dot{\vec{r}}) \times \dot{\vec{r}}] \cdot \epsilon = m \dot{\vec{r}} \cdot [(\vec{b} \times \ddot{\vec{r}}) \times \vec{r}] \cdot \epsilon$$

Wir setzen jetzt Gl. (6) ein. Das ergibt

$$\delta L = -\frac{\alpha}{r^3} \dot{\vec{r}} \cdot [(\vec{b} \times \vec{r}) \times \vec{r}] \cdot \epsilon = -\frac{\alpha}{r^3} \dot{\vec{r}} \cdot [(\vec{b} \cdot \vec{r}) \vec{r} - r^2 \vec{b}] \cdot \epsilon = \frac{d}{dt} \xi(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) \epsilon$$

wobei $\xi = \alpha \vec{b} \cdot \vec{r} / r$. Also die erhaltene Größe lautet

$$\begin{aligned} I &= \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{r}}} \vec{\psi} - \xi = m \dot{\vec{r}} \cdot [(\vec{b} \times \dot{\vec{r}}) \times \vec{r}] - \frac{\alpha \vec{b} \cdot \vec{r}}{r} = \frac{1}{m} (\vec{b} \times \vec{p}) \cdot (\vec{r} \times \vec{p}) - \frac{\alpha \vec{b} \cdot \vec{r}}{r} = \\ &= \frac{1}{m} (\vec{b} \times \vec{p}) \cdot \vec{L} - \frac{\alpha \vec{b} \cdot \vec{r}}{r} = \frac{1}{m} (\vec{p} \times \vec{L}) \cdot \vec{b} - \frac{\alpha \vec{b} \cdot \vec{r}}{r} = \frac{1}{m} \vec{V}_{Lenz} \cdot \vec{b} \end{aligned}$$

Da $\vec{b}$ beliebig war, ist $\vec{V}_{Lenz}$ erhalten.