Klassische Theoretische Physik II (Theorie B) Sommersemester 2016

Prof. Dr. Alexander Mirlin
PD Dr. Igor Gornyi, Nikolaos Kainaris

Musterlösung: Blatt 4
Besprechung: 17.05.2016

1. Ein Teilchen im elektromagnetischen Feld (2+2+3+8+10=25 Punkte)

Die Lagrangefunktion eines Teilchens mit der Ladung Q im zeitlich konstanten elektromagnetischen Feld lautet

$$L(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) = \frac{m}{2} \dot{\vec{r}}^2 - Q\Phi(\vec{r}) + Q\dot{\vec{r}} \cdot \vec{A}(\vec{r}).$$

Dabei ist $\Phi(\vec{r})$ das elektrische Skalarpotential und $\vec{A}(\vec{r})$ das Vektorpotential,

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\Phi(\vec{r}), \quad \vec{B}(\vec{r}) = \vec{\nabla} \times \vec{A}(\vec{r}).$$

(a) Beweisen Sie die in der Vorlesung benutzte Formel:

$$\sum_{j=1}^3 \dot{x}_j \left(\vec{\nabla} A_j - \frac{\partial \vec{A}}{\partial x_j} \right) = \dot{\vec{r}} \times [\vec{\nabla} \times \vec{A}].$$

$$B_i = \epsilon_{ikl} \partial_k A_l$$

$$[\vec{\nabla} \times \vec{B}]_i = \epsilon_{ijk} v_j B_k = \epsilon_{ijk} v_j \epsilon_{klm} \partial_l A_m =$$

$$= v_j \partial_l A_m (\delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}) = v_j (\partial_l A_j - \partial_j A_l)$$

s. Lösung
zu Blatt 0:
Aufgabe 2,
Gln. (28)-(31)

(b) Bestimmen Sie den verallgemeinerten (kanonischen) Impuls und die Energie des Teilchens.

Der verallgemeinerte (kanonische) Impuls ergibt sich zu:

$$\vec{p} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{r}}} = m\dot{\vec{r}} + Q\vec{A} \quad \Rightarrow \quad \dot{\vec{r}} = \frac{1}{m} (\vec{p} - Q\vec{A})$$

Für die Energie gilt:

$$E = \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{r}}} \dot{\vec{r}} - L = \frac{m}{2} \dot{\vec{r}}^2 + Q\Phi = \frac{(\vec{p} - Q\vec{A})^2}{2m} + Q\Phi$$

- (c) Betrachten Sie den Fall der räumlich homogenen Felder, $\vec{E} \parallel x$ -Achse und $\vec{B} \parallel z$ -Achse, d.h. $\vec{E}(\vec{r}) = (E, 0, 0)$ und $\vec{B}(\vec{r}) = (0, 0, B)$. Geben Sie das elektrische Potential $\Phi(\vec{r})$ an. Zeigen Sie, dass $\vec{A}^{(1)}(\vec{r}) = (0, Bx, 0)$ und $\vec{A}^{(2)}(\vec{r}) = (-By/2, Bx/2, 0)$ dem gegebenen magnetischen Feld entsprechen.

$$\vec{E}(\vec{r}) = (E, 0, 0) \quad \vec{E} = -\vec{\nabla}\Phi \Rightarrow \Phi = -Ex + \text{const}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = (0, 0, B)$$

$\vec{A}$ ist nicht eindeutig definiert (Eich-Freiheit)

$$\vec{A}^{(1)}(\vec{r}) = (0, Bx, 0) \rightarrow B_z^{(1)} = \partial_x A_y^{(1)} - \partial_y A_x^{(1)} = B$$

$$\vec{A}^{(2)}(\vec{r}) = \frac{B}{2}(-y, x, 0) \rightarrow B_z^{(2)} = \partial_x A_y^{(2)} - \partial_y A_x^{(2)} = B$$

(Andere Komponente $\vec{B}$ sind null)

- (d) Leiten Sie die Bewegungsgleichungen für den obigen Fall homogener Felder her. Zeigen Sie, dass die Transformation $y(t) = \tilde{y}(t) - (E/B)t$ das elektrische Feld aus den Gleichungen eliminiert, und geben Sie die Lösung der Bewegungsgleichungen an. Wie sehen die Bahnkurven des Teilchen aus?

$$E \neq 0 \quad m\ddot{x} = Q\dot{y}B + QE$$

$$m\ddot{y} = -Q\dot{x}B$$

$$m\ddot{z} = 0 \rightarrow \dot{z} = \text{const} = v_z$$

$$\rightarrow \boxed{z = v_z t + z_0} \quad (*)$$

$$y = \tilde{y} - \frac{E}{B}t \rightarrow \dot{y} = \dot{\tilde{y}} - \frac{E}{B}, \quad \ddot{y} = \ddot{\tilde{y}}$$

$$\begin{cases} m\ddot{x} = Q\dot{\tilde{y}}B \\ m\ddot{\tilde{y}} = -Q\dot{x}B \end{cases} \Rightarrow E = 0$$

die selbe Gleichungen

Wir betrachten nun den Fall $E=0$.

$$\dot{x} = v_x, \quad \dot{y} = v_y$$

$$\dot{v}_x = \frac{QB}{m} v_y$$

$$\dot{v}_y = -\frac{QB}{m} v_x$$

$$\Rightarrow \ddot{v}_x = -\left(\frac{QB}{m}\right)^2 v_x$$

$$\Rightarrow v_x = v_0 \sin(\omega_c t + \varphi_0)$$

$$v_y = v_0 \cos(\omega_c t + \varphi_0)$$

$$\omega_c = \frac{QB}{m}$$

Zyklotron-Frequenz

$$\Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{v_0}{\omega_c} \cos(\omega_c t + \varphi_0) + X_0 \\ y = \frac{v_0}{\omega_c} \sin(\omega_c t + \varphi_0) + Y_0 \end{cases} (**)$$

$$\frac{v_0}{\omega_c} = R_c$$

Zyklotron-Radius

(*), (**) - allgemeine Lösung der Bewegungsgleichungen
 z-Richtung: freie Bewegung; 2 beliebige Konstanten
 v_z (Geschwind.) und z_0 (Anfangsposition)

xy-Ebene: Kreisbahn $(x - X_0)^2 + (y - Y_0)^2 = R_c^2$
 Mittelpunkt (X_0, Y_0) , Radius R_c

Zusammen mit gleichförmiger
 Bewegung in z-Richtung
 $\rightarrow$ Schraubenbahn

$$E \neq 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -R_c \cos(\omega_c t + \varphi_0) + X_0 \\ y = -\frac{Et}{B} + R_c \sin(\omega_c t + \varphi_0) + Y_0 \end{cases}$$

Kreisbewegung + gleichförmige Bewegung in y-Richtung
mit Geschwindigkeit $v = -E/B$

Zykloide

(+ freie Bewegung
in z-Richtung
mit beliebiger
Geschwindigkeit)

- (e) Bestimmen Sie die Bahnkurve eines geladenen Teilchens im Magnetfeld $\vec{B} = b\vec{r}/r^3$ (diese Form hat ein magnetisches Feld in der Nähe der Enden einer langen dünnen Magnetspule).

Bewegungsgleichung:

$$m\dot{\vec{v}} = Q \frac{b}{r^3} [\vec{v} \times \vec{r}] \quad (1)$$

Erhaltungssätze:

$$\frac{m\dot{\sigma}^2}{2} = E \quad (\text{Energie}) \quad (2)$$

$$m[\vec{r} \times \dot{\vec{v}}] - Qb \frac{\vec{r}}{r} = \vec{J} \quad (\text{Drehimpuls}) \quad (3)$$

$$\text{Gl. (1)} \cdot \vec{r} : \quad \vec{r} \cdot \dot{\vec{v}} = 0$$

$$\frac{d}{dt}(\vec{r} \cdot \vec{v}) = \dot{\vec{r}} \cdot \vec{v} + \vec{r} \cdot \dot{\vec{v}} = \dot{\vec{r}} \cdot \dot{\vec{r}} = v^2$$

$$\frac{d}{dt}(\vec{r} \cdot \vec{v}) = \frac{d}{dt}(\vec{r} \cdot \dot{\vec{r}}) = \frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} r^2 \Rightarrow \frac{d^2}{dt^2} \frac{r^2}{2} - v^2 = 0 \quad (1a)$$

$$\Rightarrow r^2 = r_0^2 + v^2(t - t_0)^2 \quad (4)$$

$$\text{Gl. (3)} \cdot \frac{\vec{r}}{r} \Rightarrow$$

$$-Qb = J \cos \theta, \quad (5)$$

θ - Polarwinkel in Kugelkoordinaten

Projektion von Gl. (3) auf $\vec{e}_z$: ($z \parallel J$)

$$mr^2 \dot{\varphi} \sin^2 \theta - Qb \cos \theta = J \quad (5a)$$

$$(5), (5a) \Rightarrow \dot{\varphi} = \frac{\gamma}{mr^2} \quad (6)$$

$$t=t_0 \Rightarrow v = r_0 \dot{\varphi} \sin \theta$$

$$\text{mit (6)} \Rightarrow \gamma = \frac{mr_0 v}{\sin \theta}$$

$$\text{mit (5)} \Rightarrow \tan \theta = -\frac{mr_0 v}{Qb} \quad (7)$$

Wir integrieren nun

$$\dot{\varphi} = \frac{r_0 v}{\sin \theta r^2(t)} \quad (6a)$$

$$\Rightarrow \varphi = \varphi_0 + \frac{1}{\sin \theta} \arctan \frac{v(t-t_0)}{r_0} \quad (8)$$

$$v = \text{const.}, \quad \theta = \text{const.}$$

2. Zwei Teilchen im elektromagnetischen Feld

(5+5=10 Punkte)

- (a) Zeigen Sie, dass die Bewegung von zwei geladenen Teilchen (Masse: m_1, m_2 , Ladungen: Q_1, Q_2) im homogenen elektrischen Feld mithilfe der Gleichungen für ihren Massenmittelpunkt und für ein Teilchen der Masse $m = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ in einem bestimmten Feld beschrieben werden kann.

$$L(\vec{r}_1, \dot{\vec{r}}_1, \vec{r}_2, \dot{\vec{r}}_2) = \frac{m_1}{2} \dot{\vec{r}}_1^2 - Q_1 \Phi(\vec{r}_1) + \frac{m_2}{2} \dot{\vec{r}}_2^2 - Q_2 \Phi(\vec{r}_2) - \frac{Q_1 Q_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|}$$

$$\vec{R} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}, \quad \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1, \quad \Phi(\vec{r}_{1,2}) = -\vec{E} \vec{r}_{1,2} + \Phi_0$$

$$\vec{r}_1 = \vec{R} - \frac{m_2}{m_1 + m_2} \vec{r}, \quad \vec{r}_2 = \vec{R} + \frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{r}$$

$$L(\vec{r}_1, \dot{\vec{r}}_1, \vec{r}_2, \dot{\vec{r}}_2) = L(\vec{R}, \dot{\vec{R}}) + L(\vec{r}, \dot{\vec{r}})$$

$$L(\vec{R}, \dot{\vec{R}}) = \frac{m_1 + m_2}{2} \dot{\vec{R}}^2 + (Q_1 + Q_2)(\vec{E} \vec{R} - \Phi_0)$$

$$L(\vec{r}, \dot{\vec{r}}) = \frac{m}{2} \dot{\vec{r}}^2 - \frac{Q_1 Q_2}{r} - m \left(\frac{Q_1}{m_1} - \frac{Q_2}{m_2} \right) \vec{E} \vec{r}$$

- (b) Unter welchen Bedingungen entkoppeln die Bewegungsgleichungen für die Schwerpunktskoordinate und für die Relativbewegung der zwei geladenen Teilchen im homogenen Magnetfeld?

$$L(\vec{r}_1, \dot{\vec{r}}_1, \vec{r}_2, \dot{\vec{r}}_2) = \frac{m_1}{2} \dot{\vec{r}}_1^2 + Q_1 \dot{\vec{r}}_1 \cdot \vec{A}(\vec{r}_1) + \frac{m_2}{2} \dot{\vec{r}}_2^2 + Q_2 \dot{\vec{r}}_2 \cdot \vec{A}(\vec{r}_2) - \frac{Q_1 Q_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|}$$

$$\vec{A}(\vec{r}_{1,2}) = \frac{1}{2} [\vec{B} \times \vec{r}_{1,2}]. \quad \text{Für } \frac{Q_1}{m_1} = \frac{Q_2}{m_2} \text{ gilt:}$$

$$L = \frac{m_1 + m_2}{2} \dot{\vec{R}}^2 + (Q_1 + Q_2) \dot{\vec{R}} \cdot \vec{A}(\vec{R}) + \frac{m_1 m_2}{2} \dot{\vec{r}}^2 + \frac{Q_1 m_2^2 + Q_2 m_1^2}{(m_1 + m_2)^2} \dot{\vec{r}} \cdot \vec{A}(\vec{r}) - \frac{Q_1 Q_2}{r}$$

3. Variationsrechnung: Problem des schnellsten Falles

(2+3+3+2+5=15 Punkte)

Ein Massenpunkt gleitet reibungsfrei unter dem Einfluß der Schwerkraft entlang einer Kurve $y(x)$ vom Anfangspunkt $A = (0, 0)$ zum Endpunkt $B = (x_B, y_B)$, s. Abb. 1. Seine Anfangsgeschwindigkeit ist null. Der Tiefpunkt der Bahn kann tiefer liegen als der Endpunkt.

Wie muss man $y(x)$ wählen, damit die Zeit T , die das Teilchen für den Weg von A nach B braucht, minimal ist? Im folgenden sollen Sie diese Fragestellung mithilfe der Variationsrechnung beantworten.

Abb. 1.

- (a) Starten Sie (begründen Sie dies auch) von dem Ausdruck

$$T = \int_A^B \frac{ds}{v},$$

wobei v den Betrag der Geschwindigkeit bezeichnet. Drücken Sie das Element der Bogenlänge ds durch dx und $dy/dx \equiv y'(x)$ aus.

Zuerst einmal gilt natürlich

$$T = \int_A^B dt$$

Da weiterhin gilt $dt = \frac{ds}{v}$ mit dem Wegelement

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = dx \sqrt{1 + (dy/dx)^2} = dx \sqrt{1 + [y'(x)]^2}$$

erhält man die Beziehung

$$T = \int_{x_A}^{x_B} dx \frac{\sqrt{1 + (y'(x))^2}}{v}.$$

- (b) Finden Sie die Geschwindigkeit aus dem Energiesatz und stellen Sie T in der Form eines Funktionals

$$T[y(x)] = \int_0^{x_B} K(y(x), y'(x)) dx$$

dar.

$$E = \frac{m}{2} \vec{v}^2 + mgy = 0 \quad \left(\begin{array}{l} \text{Anfangsbedingung} \\ y = y_A = 0 \\ \vec{v} = 0 \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow |\vec{v}| = \sqrt{-2gy}, \quad y < 0$$

$$T[y(x)] = \int_0^{x_B} dx \underbrace{\sqrt{1+y'^2} \frac{1}{\sqrt{-2gy}}}_{K(y(x), y'(x))}$$

- (c) Geben Sie die Lagrange-Gleichungen für ein Extremum dieses Funktionals an.

Um das Funktional $T[y]$ nun zu minimieren, d.h. die optimale Kurve zu finden, führen wir analog zur Vorlesung eine Variation durch: Angenommen, $y(x)$ sei die gesuchte Funktion die $T[y]$ minimiert, dann wird $T[y]$ durch die Ersetzung $y(x) \rightarrow y(x) + \delta y(x)$ ($\delta y(x)$ heisst Variation mit $\delta y(x_A) = \delta y(x_B) = 0$) wachsen. Da $T[y]$ bei $\delta y(x) = 0$ ein Minimum hat gilt also $\delta T[y] = 0$.

$$\frac{d}{dx} \frac{\partial K}{\partial y'} - \frac{\partial K}{\partial y} = 0$$

$$\left[\begin{array}{l} \frac{\partial K}{\partial y'} = \frac{1}{\sqrt{-2gy}} \frac{y'}{\sqrt{1+y'^2}} \\ \frac{d}{dx} \frac{\partial K}{\partial y'} = \frac{1}{\sqrt{-2gy} \sqrt{1+y'^2}} \left[-\frac{1}{2} \frac{y'^2}{y} + y'' - \frac{y' y''}{1+y'^2} \right] \\ \frac{\partial K}{\partial y} = \frac{1}{\sqrt{-2gy}} \cdot \frac{-1}{2y} \cdot \sqrt{1+y'^2} \end{array} \right]$$

$$\rightarrow \frac{1}{\sqrt{-2gy}} \frac{1}{\sqrt{1+y'^2}} \left\{ -\frac{1}{2} \frac{y'^2}{y} + y'' - \frac{y' y''}{1+y'^2} + \frac{1+y'^2}{2y} \right\} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{y''}{1+y'^2} + \frac{1}{2y} = 0$$

$$2y y'' + y'^2 + 1 = 0$$

- (d) Zeigen Sie in Analogie zur Energieerhaltung in der Mechanik eines Teilchens in einem zeitlich konstanten Potential, dass die Größe

$$I = y' \frac{\partial K}{\partial y'} - K$$

konstant (d.h. unabhängig von x) ist.

$$I = y' \frac{\partial K}{\partial y'} - K$$

$$\frac{dI}{dx} = y' \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial K}{\partial y'} \right) + y'' \frac{\partial K}{\partial y'} - \frac{\partial K}{\partial x} - \frac{\partial K}{\partial y} y' - \frac{\partial K}{\partial y'} y''$$

$$= y' \left[\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial K}{\partial y'} \right) - \frac{\partial K}{\partial y} \right] = 0$$

$$\Rightarrow I = \text{const}$$

$$I = \frac{y'^2}{\sqrt{-2gy} \sqrt{1+y'^2}} - \frac{\sqrt{1+y'^2}}{\sqrt{-2gy}} = - \frac{1}{\sqrt{-2gy} \sqrt{1+y'^2}}$$

(Man kann auch explizit prüfen (mit Hilfe der Bewegungsgleichung), dass $dI/dx = 0$:

$$\frac{dI}{dx} = y' \cdot I \cdot \left(\frac{1}{2} \frac{1}{y} + \frac{y''}{1+y'^2} \right) = 0$$

Analogie:

$$\begin{aligned} K &\leftrightarrow L \quad (\text{Lagrangefunktion}) \\ y &\leftrightarrow \text{generalisierte Koordinate } q \\ x &\leftrightarrow t \quad (\text{Zeit}) \\ I &\leftrightarrow H \quad (\text{Hamiltonfunktion, Energie}) \end{aligned}$$

(e) Damit erhalten Sie eine Differentialgleichung erster Ordnung der Form

$$\frac{dx}{dy} = \sqrt{\frac{-y}{\alpha + y}}$$

Was ist α als Funktion von I ? Diese Differentialgleichung kann über die Substitution $y = -(1 - \cos \tau)\alpha/2$ leicht gelöst werden. Die Kurve ist durch die Parameterdarstellung $y(\tau)$ und $x(\tau)$ gegeben. Finden Sie $x(\tau)$. Skizzieren Sie die Lösungskurven $y(x)$. Welche Steigung hat die Kurve am Anfangspunkt?

$$\begin{aligned} -\frac{1}{I} &= \sqrt{-2gy} \sqrt{1+y^2} \\ \Rightarrow y'^2 &= -1 - \frac{1}{2gI^2 y} \\ \Rightarrow \frac{dx}{dy} &= \pm \sqrt{\frac{-y}{\alpha + y}} \quad \alpha = \frac{1}{2gI^2} > 0 \end{aligned}$$

Substitution

$$\begin{aligned} y &= -\frac{\alpha}{2} (1 - \cos \tau) & \sqrt{\frac{-y}{\alpha + y}} &= \sqrt{\frac{1 - \cos \tau}{1 + \cos \tau}} = \pm \frac{\sin(\tau/2)}{\cos(\tau/2)} \\ \frac{dx}{dy} &= \frac{dx}{d\tau} / \frac{dy}{d\tau} = -\frac{1}{\frac{\alpha}{2} \sin \tau} \frac{dx}{d\tau} & \Rightarrow \frac{dx}{d\tau} &= \pm \alpha \sin^2 \frac{\tau}{2} \end{aligned}$$

$$\frac{dx}{d\tau} = \pm \frac{\alpha}{2} (1 - \cos \tau)$$

$$x = \frac{\alpha}{2} (\tau - \sin \tau) \quad (\text{Vorzeichen ist "+"}, \text{ wenn } x_B > 0)$$

$$\begin{cases} y = -\frac{\alpha}{2}(1 - \cos \tau) \\ x = \frac{\alpha}{2}(\tau - \sin \tau) \end{cases}$$

Zykloide

Anfangspunkt: $\tau \rightarrow 0$

$$y \approx -\frac{\alpha}{2} \frac{\tau^2}{2} = -(\alpha/4)\tau^2$$

$$x \approx \frac{\alpha}{2} \frac{\tau^3}{6} = (\alpha/12)\tau^3$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y \propto -x^{2/3} \\ \frac{dy}{dx} \propto -x^{-1/3} \rightarrow \infty \end{cases} \text{ im Limes } x \rightarrow 0$$