Klassische Theoretische Physik II SoSe 2023

Prof. Dr. A. Shnirman
Dr. A. Pavlov, A. ReichMusterlösung zu Blatt 9
Besprechung 04.07.2023

1. Ebenes Doppel-Pendel

(10 Punkte)

Betrachten Sie das in Abb. 1 dargestellte ebene Doppel-Pendel. Beide Massenpunkte bewegen sich nur in der $x - z$ - Ebene. Die Massen der Massenpunkte sind m_1 und m_2 und die Längen der masselosen Stäbe sind l_1 und l_2 . Die Gravitationskraft wirkt parallel zur z -Achse.

Abbildung 1: Das ebene Doppel-Pendel.

- Wählen Sie als generalisierte Koordinaten die Winkel ϕ_1 und ϕ_2 . Geben Sie die Matrizen m_{ij} und V_{ij} des in der Vorlesung vorgestellten Verfahrens für kleine Schwingungen an. Leiten Sie die Bewegungsgleichungen für ϕ_1 und ϕ_2 her. (3 Punkte)
- Stellen Sie die Eigenwertgleichung auf und bestimmen Sie die Eigenfrequenzen. Geben Sie die Normalkoordinaten Q_k an. (3 Punkte)
- Betrachten Sie nun das Pendel mit $l_1 = l_2 = l$. Geben Sie die Eigenfrequenzen und Eigenvektoren für die Grenzfälle $m_1 \gg m_2$ und $m_1 \ll m_2$ an und beschreiben Sie die Bewegung des Pendels in beiden Fällen. (4 Punkte)

Lösungsvorschlag

- Es ist

$$x_1 = l_1 \sin \phi_1, \quad z_1 = -l_1 \cos \phi_1,$$

$$x_2 = x_1 + l_2 \sin \phi_2, \quad z_2 = z_1 - l_2 \cos \phi_2.$$

Dann folgt

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= l_1 \dot{\phi}_1 \cos \phi_1, & \dot{z}_1 &= l_1 \dot{\phi}_1 \sin \phi_1, \\ \dot{x}_2 &= l_1 \dot{\phi}_1 \cos \phi_1 + l_2 \dot{\phi}_2 \cos \phi_2, & \dot{z}_2 &= l_1 \dot{\phi}_1 \sin \phi_1 + l_2 \dot{\phi}_2 \sin \phi_2.\end{aligned}$$

Die kinetische Energie lautet

$$\begin{aligned}T &= \frac{1}{2} m_1 (\dot{x}_1^2 + \dot{z}_1^2) + \frac{1}{2} m_2 (\dot{x}_2^2 + \dot{z}_2^2) \\ &= \frac{1}{2} (m_1 + m_2) l_1 \dot{\phi}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \left[l_2 \dot{\phi}_2^2 + 2 l_1 l_2 \cos(\phi_1 - \phi_2) \dot{\phi}_1^2 \dot{\phi}_2^2 \right],\end{aligned}$$

wobei wir $\cos \phi_1 \cos \phi_2 + \sin \phi_1 \sin \phi_2 = \cos(\phi_1 - \phi_2)$ benutzt haben.

Die potenzielle Energie ist

$$U = g(m_1 z_1 + m_2 z_2) = -(m_1 + m_2) g l_1 \cos \phi_1 - m_2 g l_2 \cos \phi_2.$$

und es folgt die Lagrange-Funktion

$$\begin{aligned}L = T - U &= \frac{1}{2} (m_1 + m_2) l_1 \dot{\phi}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \left[l_2 \dot{\phi}_2^2 + 2 l_1 l_2 \cos(\phi_1 - \phi_2) \dot{\phi}_1^2 \dot{\phi}_2^2 \right] \\ &\quad + (m_1 + m_2) g l_1 \cos \phi_1 + m_2 g l_2 \cos \phi_2.\end{aligned}$$

Die Bewegungsgleichungen lauten

$$\begin{aligned}\ddot{\phi}_1 + \frac{m_2}{m_1 + m_2} \frac{l_2}{l_1} \left[\dot{\phi}_2^2 \sin(\phi_1 - \phi_2) + \ddot{\phi}_2 \cos(\phi_1 - \phi_2) \right] + \frac{g}{l_1} \sin \phi_1 &= 0, \\ \ddot{\phi}_2 + \frac{l_1}{l_2} \left[-\dot{\phi}_1^2 \sin(\phi_1 - \phi_2) + \ddot{\phi}_1 \cos(\phi_1 - \phi_2) \right] + \frac{g}{l_2} \sin \phi_2 &= 0.\end{aligned}$$

Für kleine Schwingungen $\phi_1 \ll 1$, $\phi_2 \ll 1$ können diese Gleichungen linearisiert werden. Das bedeutet, dass wir die folgenden Näherungen benutzen

$$\sin x \simeq x, \quad \cos x \simeq 1 - \frac{x^2}{2}.$$

Die Lagrange-Funktion für kleine Schwingungen ist dann

$$\begin{aligned}L &\simeq \frac{1}{2} m_1 l_1^2 \dot{\phi}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \left(l_1 \dot{\phi}_1 + l_2 \dot{\phi}_2 \right)^2 \\ &\quad - \frac{1}{2} (m_1 + m_2) g l_1 \phi_1^2 - \frac{1}{2} m_2 g l_2 \phi_2^2 + (m_1 + m_2) g l_1 + m_2 g l_2 \\ &= \frac{1}{2} \sum_{ij=1}^2 \left(m_{ij} \dot{\phi}_i \dot{\phi}_j - V_{ij} \phi_i \phi_j \right) + (m_1 + m_2) g l_1 + m_2 g l_2\end{aligned}$$

mit den Matrizen $\hat{m}$ und $\hat{V}$

$$\hat{m} = \begin{pmatrix} (m_1 + m_2) l_1^2 & m_2 l_1 l_2 \\ m_2 l_1 l_2 & m_2 l_2^2 \end{pmatrix}, \quad \hat{V} = \begin{pmatrix} (m_1 + m_2) g l_1 & 0 \\ 0 & m_2 g l_2 \end{pmatrix}.$$

Die Bewegungsgleichungen für kleine Schwingungen folgen mithilfe der Matrizen $\hat{m}$, $\hat{V}$ und $\sum_j (m_{ij} \ddot{\phi}_j + V_{ij} \phi_j) = 0$, $i = 1, 2$, oder aus der Linearisierung der oben angegebenen Bewegungsgleichungen zu

$$\begin{aligned}\ddot{\phi}_1 + \frac{m_2}{m_1 + m_2} \frac{l_2}{l_1} \ddot{\phi}_2 + \frac{g}{l_1} \phi_1 &= 0, \\ \ddot{\phi}_2 + \frac{l_1}{l_2} \ddot{\phi}_1 + \frac{g}{l_2} \phi_2 &= 0.\end{aligned}$$

b) Die Eigenwertgleichung lautet $\det(\hat{V} - \omega^2 \hat{m}) = 0$. Also

$$\begin{aligned} & [(m_1 + m_2)gl_1 - \omega^2(m_1 + m_2)l_1^2] (m_2gl_2 - \omega^2m_2l_2^2) - (\omega^2m_2l_1l_2)^2 = 0 \\ \Rightarrow & m_1m_2l_1^2l_2^2(\omega^2)^2 - (m_1 + m_2)m_2gl_1l_2(l_1 + l_2)\omega^2 + (m_1 + m_2)m_2g^2l_1l_2 = 0 \end{aligned}$$

und es ergeben sich die Eigenfrequenzen

$$\begin{aligned} \omega_1^2 &= \frac{2g}{l_1 + l_2 + \sqrt{(l_1 + l_2)^2 - 4l_1l_2m_1/(m_1 + m_2)}}, \\ \omega_2^2 &= \frac{2g}{l_1 + l_2 - \sqrt{(l_1 + l_2)^2 - 4l_1l_2m_1/(m_1 + m_2)}}. \end{aligned}$$

Die (nicht-normierten) Eigenvektoren folgen aus

$$\sum_{i=1,2} (V_{ij} - \omega_k^2 m_{ij}) A_j^{(k)} = 0$$

zu

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} m_2/(m_1 + m_2) \\ -\frac{l_1 - l_2 - d}{2l_2} \end{pmatrix}, \quad A^{(2)} = \begin{pmatrix} m_2/(m_1 + m_2) \\ -\frac{l_1 - l_2 + d}{2l_2} \end{pmatrix},$$

wobei

$$d = \sqrt{(l_1 + l_2)^2 - 4l_1l_2m_1/(m_1 + m_2)}$$

definiert wurde. Aus den Vektoren $A_i^{(k)}$ bilden wir die quadratische Matrix $\hat{a}$ mit Koeffizienten c_i :

$$\hat{a} = (a)_{ij} = \left(c_1 A^{(1)}, c_2 A^{(2)} \right) = \begin{pmatrix} c_1 m_2/(m_1 + m_2) & c_2 m_2/(m_1 + m_2) \\ -c_1 \frac{l_1 - l_2 - d}{2l_2} & c_2 \frac{l_1 - l_2 + d}{2l_2} \end{pmatrix}.$$

Die Koeffizienten c_i werden aus der Normierung $\hat{a}^T \hat{m} \hat{a} = \hat{1}$ bestimmt:

$$\begin{aligned} c_1 &= \left[\frac{2(m_1 + m_2)}{m_2} \frac{1}{m_1(l_1 - l_2)^2 + m_2(l_1 + l_2)^2 + d(l_1(m_2 - m_1) + l_2(m_1 + m_2))} \right]^{1/2}, \\ c_2 &= \left[\frac{2(m_1 + m_2)}{m_2} \frac{1}{m_1(l_1 - l_2)^2 + m_2(l_1 + l_2)^2 - d(l_1(m_2 - m_1) + l_2(m_1 + m_2))} \right]^{1/2}. \end{aligned}$$

Für die Normalkoordinaten Q_k gilt

$$\begin{aligned} \vec{\phi} &= \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix} = \hat{a} \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{pmatrix} = \hat{a} \vec{Q} \rightarrow \vec{Q} = \hat{a}^{-1} \vec{\phi}. \\ \hat{a}^T \hat{m} \hat{a} &= \hat{1} \rightarrow \hat{a}^{-1} = \hat{a}^T \hat{m} \rightarrow \vec{Q} = \hat{a}^T \hat{m} \vec{\phi} \end{aligned}$$

und wir erhalten

$$\begin{aligned} Q_1 &= \frac{c_1 m_2}{2} \left[l_1(l_1 + l_2 + d)\phi_1 + l_2 \left(l_1 + l_2 - \frac{m_1 l_1}{m_1 + m_2} + d \right) \phi_2 \right], \\ Q_2 &= \frac{c_2 m_2}{2} \left[l_1(l_1 + l_2 - d)\phi_1 + l_2 \left(l_1 + l_2 - \frac{m_1 l_1}{m_1 + m_2} - d \right) \phi_2 \right]. \end{aligned}$$

c) Für $l_1 = l_2 = l$ ist

$$\omega_{1,2}^2 = \frac{g/l}{1 \pm \sqrt{m_2/(m_1 + m_2)}}.$$

Für $m_1 \gg m_2$ gilt

$$\omega_{1,2}^2 \simeq \frac{g}{l}.$$

Betrachten wir zusätzlich die Eigenvektoren $A^{(k)}$ sehen wir, dass das bedeutet, die Masse m_1 beinahe in Ruhe ist, und die Masse m_2 mit der üblichen Pendelfrequenz $\sqrt{g/l}$ oszilliert.

Für $m_1 \ll m_2$ gilt

$$\omega_1^2 \simeq \frac{g/l}{1 + [1 - m_1/(2m_2)]} \simeq \frac{g}{2l}$$

und

$$\omega_2^2 \simeq \frac{g/l}{1 - \sqrt{1 - m_1/m_2}} \simeq \frac{g/l}{1 - [1 - m_1/(2m_2)]} = \frac{2g}{l} \frac{m_2}{m_1}.$$

Die erste Mode (ω_1) entspricht einem Pendel der Länge $2l$. Für diese Mode gilt $A_2^{(1)} \simeq A_1^{(1)}$, d.h., dass das Doppel-Pendel sich wie ein einzelnes Pendel der Länge $2l$ bewegt. Für die zweite Mode (ω_2) gilt $A_2^{(2)} \simeq -A_1^{(2)}$. Das bedeutet, dass die Masse m_2 ungefähr in Ruhe bleibt und m_1 schwingt.

2. Asymmetrisches dreiatomiges Molekül

(10 Punkte)

Betrachten Sie das in Abb. 2 skizzierte Modell für ein dreiatomiges lineares Molekül. Die drei Atome der Massen $m_1 = m_2 = m$ und $m_3 = M$ sind über zwei Federn der Federkonstanten k und $2k$ miteinander verbunden und können sich nur entlang der Molekülachse bewegen. Der Gleichgewichtsabstand zwischen benachbarten Atomen sei l . Die Auslenkungen aus den jeweiligen Ruhelagen werden mit x_i ($i = 1, 2, 3$) bezeichnet.

Abbildung 2: Asymmetrisches dreiatomiges Molekül.

- Geben Sie die Lagrange-Funktion des Moleküles und die zugehörigen Matrizen m_{ij} und V_{ij} an. (2 Punkte)
- Bestimmen Sie die Eigenfrequenzen und zugehörigen Eigenvektoren. Was ergibt sich im Limes $M \rightarrow \infty$? (3 Punkte)
Hinweis: Eine der Lösungen ist $\omega^2 = 0$. Sie entspricht einer gleichförmigen Bewegung des ganzen Moleküls entlang der x -Achse.
- Betrachten Sie nun den Fall $M = 2m$. Geben Sie die Normalkoordinaten Q_k und die allgemeine reelle Lösung an. (5 Punkte)

Lösungsvorschlag

a) Die Langrange-Funktion des Moleküles lautet:

$$L = \frac{m}{2} (\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2) + \frac{M}{2} \dot{x}_3^2 - \frac{k}{2} (x_2 - x_1)^2 - k (x_3 - x_2)^2.$$

Dies lässt sich auch schreiben als

$$L = \frac{1}{2} (\dot{\vec{x}}^T \hat{m} \dot{\vec{x}} - \vec{x}^T \hat{V} \vec{x}) = \frac{1}{2} \sum_{ij} [m_{ij} \dot{x}_i \dot{x}_j - V_{ij} x_i x_j]$$

mit den beiden (symmetrischen) Matrizen

$$\hat{m} = \begin{pmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & M \end{pmatrix}, \quad \hat{V} = \begin{pmatrix} k & -k & 0 \\ -k & 3k & -2k \\ 0 & -2k & 2k \end{pmatrix}.$$

b) Eigenwertgleichung:

$$\begin{aligned} 0 &= \left| \begin{pmatrix} k - \omega^2 m & -k & 0 \\ -k & 3k - \omega^2 m & -2k \\ 0 & -2k & 2k - \omega^2 M \end{pmatrix} \right| \\ &= (k - \omega^2 m)(3k - \omega^2 m)(2k - \omega^2 M) - k^2(2k - \omega^2 M) - 4k^2(k - \omega^2 m) \\ &= -\omega^2 [Mm^2\omega^4 - 2km(2M + m)\omega^2 + 2k^2(M + 2m)]. \end{aligned}$$

Eigenfrequenzen:

$$\begin{aligned} \omega_1^2 &= 0, \\ \omega_2^2 &= \frac{k}{M} \left(1 + \frac{2M}{m} - \sqrt{1 + \frac{2M^2}{m^2}} \right), \\ \omega_3^2 &= \frac{k}{M} \left(1 + \frac{2M}{m} + \sqrt{1 + \frac{2M^2}{m^2}} \right). \end{aligned}$$

Eigenvektoren (nichtnormierte):

$$\begin{aligned} \sum_{ij} (V_{ij} - \omega_k^2 m_{ij}) A_j^{(k)} &= 0, \\ A^{(1)} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ A^{(2)} &= \begin{pmatrix} 1 \\ -1 - \frac{m}{M} + \sqrt{2 + \frac{m^2}{M^2}} \\ \frac{m^2}{M^2} - \frac{m}{M} \sqrt{2 + \frac{m^2}{M^2}} \end{pmatrix}, \\ A^{(3)} &= \begin{pmatrix} 1 \\ -1 - \frac{m}{M} - \sqrt{2 + \frac{m^2}{M^2}} \\ \frac{m^2}{M^2} + \frac{m}{M} \sqrt{2 + \frac{m^2}{M^2}} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Limes $M \rightarrow \infty$:

$$\omega_2^2 = (2 - \sqrt{2})k/m, \quad \omega_3^2 = (2 + \sqrt{2})k/m.$$

c) Für $M = 2m$ erhalten wir:

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \omega_3 = 2\sqrt{\frac{k}{m}}$$

und

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad A^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Aus den Vektoren $A_i^{(k)}$ bilden wir die quadratische Matrix $\hat{a}$ mit Koeffizienten c_i :

$$\hat{a} = (c_1 A^{(1)}, c_2 A^{(2)}, c_3 A^{(3)}) = \begin{pmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ c_1 & 0 & -3c_3 \\ c_1 & -c_2/2 & c_3 \end{pmatrix}.$$

Aus der Normierung $\hat{a}^T \hat{m} \hat{a} = \hat{1}$ bestimmen wir die Koeffizienten c_i :

$$c_1 = \frac{1}{2\sqrt{m}}, \quad c_2 = \sqrt{\frac{2}{3m}}, \quad c_3 = \frac{1}{2\sqrt{3m}}.$$

Normalkoordinaten:

$$Q_1 = \frac{\sqrt{m}}{2}(x_1 + x_2 + 2x_3),$$

$$Q_2 = \frac{2m}{3}(x_1 - x_3),$$

$$Q_3 = \frac{\sqrt{m}}{2\sqrt{3}}(x_1 - 3x_2 + 2x_3).$$

Lösung mit $\omega_1^2 = 0$: In Normalkoordinaten lautet die entsprechende Gleichung

$$\ddot{Q}_1 = 0$$

und damit ist die Lösung gegeben durch

$$Q(t) = \beta_1 t + \alpha_1,$$

was einer gleichförmigen Bewegung des gesamten Moleküles entspricht.

Die allgemeine Lösung:

$$\vec{x}(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (\beta_1 t + \alpha_1) + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1/2 \end{pmatrix} \beta_2 \cos(\omega_2 t + \alpha_2) + \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \beta_3 \cos(\omega_3 t + \alpha_3)$$

mit den sechs reellen Konstanten α_i, β_i ; ($i = 1; 2; 3$). Es sind sechs Konstanten, da wir es mit drei Differentialgleichungen zweiter Ordnung zu tun haben.