Erstes Übungsblatt zur Theorie D (QM I)

Abgabe: 19.04.2005 10:00 Uhr

NAME:

GRUPPE:

Aufgabe 1 Wellen-Teilchen-Dualität

(2 Punkte)

Die Einstein-de-Broglie-Beziehungen ordnen der Energie E eines Teilchens eine Frequenz ν und dem Impuls p eine Wellenlänge λ zu ($E = h\nu$; $\lambda = h/p$).

Berechnen Sie die Wellenlänge und Frequenz:

- eines Photons mit der Energie 1 keV.
- einer Kugel mit $m = 10$ g und Geschwindigkeit 10 m/s.
- von ("thermischen") Neutronen mit der kinetischen Energie von 0.05 eV im nichtrelativistischen Fall ($m_n = 940 \times 10^6$ eV/c²).

Aufgabe 2 Compton-Effekt

(3 Punkte)

Ein Photon der Frequenz ν stoße auf ein ruhendes Elektron e der Masse m . Nach dem Stoß laufe das gestreute Photon mit der Frequenz ν' weiter, das Elektron e' mit der Geschwindigkeit v . Der Streuwinkel zwischen ν und ν' sei α . (Nichtrelativistische Näherung!)

- (a) Wie lautet der Energieerhaltungssatz? Wie lautet der Impulserhaltungssatz?
 (b) Eliminieren Sie v aus dem Impulserhaltungssatz mit Hilfe des Energieerhaltungssatzes.
 (c) Die Frequenz ν' unterscheide sich nur wenig von ν , $\nu' = \nu - \delta\nu$. Zeigen Sie, dass in erster Ordnung gilt: $\nu^2 + \nu'^2 = 2\nu\nu'$ und zeigen Sie damit die Compton-Formel

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{mc} (1 - \cos \alpha) .$$

($h/(mc) = 2.4 \times 10^{-10}$ cm heißt die Compton-Wellenlänge des Elektrons.)

Aufgabe 3

(5 Punkte)

- (a) Gegeben sei eine (reell- oder komplexwertige) auf der gesamten x -Achse definierte Funktion $f(x)$. Dieser Funktion ordnen wir mittels des Integrals

$$\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-ikx} f(x)$$

eine neue, auf $-\infty < k < \infty$ definierte Funktion $\tilde{f}(k)$ zu, die wir als *Fouriertransformierte* von $f(x)$ bezeichnen. Berechnen Sie die Fouriertransformierte der Funktion

$$f(x) = e^{-\alpha x^2} \quad (\alpha > 0)$$

und vergleichen Sie $\tilde{f}(k)$ mit $f(x)$. (Hinweis: $\int_{-\infty}^{\infty} dx \exp[-(x + iy)^2] = \sqrt{\pi}$.)

- (b) Als Beispiel für die Ausbreitung einer Materiewelle betrachten wir (in einer Dimension) das *Gaußsche Wellenpaket*

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dk g(k) e^{i(kx - \omega(k)t)} ; \quad \omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}$$

mit (C und a reell, positiv)

$$g(k) = C \exp \left[-\frac{1}{2a^2} (k - k_0)^2 \right] .$$

- (i) Legen Sie die Konstante C so fest, dass $g(k)$ " auf Eins normiert" ist:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |g(k)|^2 dk = 1 .$$

- (ii) Bestimmen Sie $\Psi(x, t)$. Eine nützliche Formel für komplexe α, β, γ mit $\text{Re}(\alpha) > 0$ (die unmittelbar aus obigem Hinweis folgt) lautet:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dk \exp [-\alpha k^2 - i\beta k - \gamma] = \frac{1}{\sqrt{2\alpha}} \exp \left[\frac{-\beta^2}{4\alpha} - \gamma \right] .$$

Das Ergebnis läßt sich auf die folgende Form bringen:

$$\Psi(x, t) = \frac{Ca}{\sqrt{1 + i\frac{a^2\hbar t}{m}}} \exp \left[-\frac{a^2 (x - v_0 t)^2}{2 \left(1 + i\frac{a^2\hbar t}{m}\right)} \right] \exp [i (k_0 x - \omega_0 t)]$$

mit $v_0 = \hbar k_0/m$ and $\omega_0 = \hbar k_0^2/(2m)$.