Name: _____

Tutorium: _____

Abgabe bis Dienstag, 4.7.06, 11:30

Punkte: _____

Aufgabe 26: *Satz von Ehrenfest*

6 Punkte

- a) Zeigen Sie im Rahmen der Schrödingerschen Wellenmechanik das Ehrenfestsche Theorem für ein Teilchen in einer Dimension, das sich in einem Potential $V(x)$ bewegt:

$$\frac{d}{dt}\langle x \rangle = \langle p \rangle / m, \quad \frac{d}{dt}\langle p \rangle = -\langle V'(x) \rangle.$$

(3 Punkte)

- b) Zeigen Sie weiter, daß der Ortserwartungswert $\langle x \rangle$ die Newtonsche Bewegungsgleichung

$$m \frac{d^2}{dt^2} \langle x \rangle = -V'(\langle x \rangle)$$

erfüllt, falls $V(x)$ ein Polynom höchstens zweiten Grades in x ist.

(2 Punkte)

- c) Angenommen, $V(x)$ ist *kein* Polynom höchstens zweiten Grades in x . Wie geartet muß eine Wellenfunktion sein, damit die Newtonsche Bewegungsgleichung zumindest näherungsweise gilt? (Qualitative Antwort genügt)

(1 Punkt)

Aufgabe 27: *Kugelflächenfunktionen*

6 Punkte

Die assoziierten Legendrepolynome sind definiert als:

$$P_l^m(x) = \frac{(-1)^m}{2^l l!} (1-x^2)^{m/2} \frac{d^{l+m}}{dx^{l+m}} (x^2-1)^l,$$

mit $x \in [-1, 1]$, $l \in \mathbb{N}_0$, $m \in \mathbb{Z}$, $|m| \leq l$ und erfüllen die Differentialgleichung

$$(1-x)^2 P_l^{m''} - 2x P_l^{m'} + \left(l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right) P_l^m = 0.$$

Die Kugelflächenfunktionen sind gegeben durch

$$Y_l^m(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi}.$$

- a) Zeigen Sie, daß die Kugelflächenfunktionen als Funktionen auf der Kugel stetig sind.
 b) Der Bahndrehimpulsoperator lautet in Kugelkoordinaten:

$$L_x = i\hbar \left[\sin \phi \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\cos \phi}{\tan \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right]$$

$$L_y = i\hbar \left[-\cos \phi \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\sin \phi}{\tan \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right]$$

$$L_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi}.$$

Berechnen Sie $\vec{L}^2$ und zeigen Sie, daß $\Delta = -\vec{L}^2/(r^2\hbar^2) + (1/r^2)\partial_r(r^2\partial_r)$, wobei Δ der Laplaceoperator in Kugelkoordinaten ist.

- c) Zeigen Sie, daß die Kugelflächenfunktionen Y_l^m gemeinsame Eigenfunktionen zu den Operatoren L_z und $\vec{L}^2$ sind und bestimmen Sie die Eigenwerte.

(je 2 Punkte)

Aufgabe 28: *Teilchen auf dem Kreis*

Ohne
Bewertung

Wir betrachten ein Teilchen der Masse M , das sich auf einer Kreislinie in der xy -Ebene frei bewegen kann. Die Wellenfunktion hängt dann nur vom Azimutwinkel ϕ ab, und es muß gelten: $\psi(0) = \psi(2\pi)$. Wir bezeichnen die Menge der 2π -periodischen stetig differenzierbaren Funktionen mit Π .

- a) Geben Sie den Hamiltonoperator an und finden Sie die zugehörigen Eigenwerte und -funktionen.
 b) Berechnen Sie den Kommutator $[L_3, \phi]$, wobei L_3 der Drehimpuls in z -Richtung ist. Überprüfen Sie Ihr Ergebnis, indem Sie den Erwartungswert bezüglich eines Energieeigenzustandes bilden. Verwenden Sie hierfür die Hermitezität und die Eigenwerte von L_3 und verzichten Sie darauf, Integrale explizit hinzuschreiben.
 Hinweis: Sie sollten einen Widerspruch finden.
 c) Um den Widerspruch aufzulösen, müssen wir die maximalen Definitionsbereiche $D(O)$

$$O : D(O) \rightarrow \Pi \quad \text{mit } D(O) \subset \Pi$$

der Operatoren $L_3\phi$ und ϕL_3 betrachten. Bestimmen Sie also $D(L_3\phi)$ und $D(\phi L_3)$.

- d) Berechnen Sie nochmals den Erwartungswert $\langle \psi | [L_3, \phi] \psi \rangle$, wobei ψ ein normierter Energieeigenzustand ist. Setzen Sie diesmal aber explizit die Wellenfunktion ein und berechnen Sie den Erwartungswert als Integral. Verwenden Sie keine abstrakten Rechenregeln für hermitesche Operatoren.