Karlsruher Institut für Technologie

Institut für Theoretische Physik (ITP)
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Moderne Theoretische Physik I (TheoD, QM I)
Dozent: Prof. Dr. Frans R. Klinkhamer
Assistent: Dr. Viacheslav A. Emelyanov

- Abgabe am Montag, den 11.07.2016; Besprechung am Mittwoch, den 13.07.2016
- Aktuelle Informationen zur Vorlesung befinden sich unter folgendem Link:
https://www.itp.kit.edu/~slava/quantenmechanik_ss_16.html
- Melden Sie sich rechtzeitig für Vorleistung und Klausur durch das QISPOS-System an. Dies ist erforderlich und erfolgt unter <https://campus.studium.kit.edu>

Name: _____ Übungsgruppe: _____ Punkte: _____

Übungsblatt 12

Aufgabe 12.1: Würfelförmiger Potentialtopf (8 Punkte)

Wir betrachten das Potential

$$V(\mathbf{x}) = \begin{cases} 0, & \text{falls } \max(|x|, |y|, |z|) < R, \\ \infty, & \text{sonst.} \end{cases} \quad (1)$$

- Finden Sie alle Energieeigenzustände, indem Sie die dreidimensionale zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung durch Trennung der Variablen lösen. **(4 Punkte)**
- Bestimmen Sie die Entartungsgrade der niedrigsten sechs Energieeigenwerte. Können Sie die Entartungen auf eine Symmetrie zurückführen? **(4 Punkte)**

Aufgabe 12.2: Wasserstoffatom (8 Punkte)

- Ein Wasserstoffatom befinde sich im Zustand

$$\psi = \frac{1}{6}(4\psi_{100} + 3\psi_{211} - \psi_{210} + \sqrt{10}\psi_{21-1}). \quad (2)$$

Berechnen Sie die Norm von ψ sowie die Erwartungswerte der Energie, des Drehimpulsquadrates und der z -Komponente des Drehimpulses. **(4 Punkte)**

- Ein Wasserstoffatom befinde sich im Grundzustand. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Elektron weiter vom Proton entfernt aufhält als dies in der klassischen Mechanik bei derselben Gesamtenergie erlaubt wäre. **(4 Punkte)**

Aufgabe 12.3: Stationäre Störungstheorie (8 Punkte)

- (a) Der Hamilton-Operator des linearen anharmonischen Oszillators sei durch

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{W}, \quad \text{wobei} \quad \hat{H}_0 = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{m\omega^2 \hat{q}^2}{2} \quad \text{und} \quad \hat{W} = \alpha \frac{m^2 \omega^2}{\hbar} \hat{q}^4 \quad (3)$$

gegeben. Der Parameter α sei positiv. Welche Energiekorrekturen ergeben sich in erster Ordnung Störungstheorie bezüglich $\hat{W}$? (**3 Punkte**)

Hinweis: Um das Problem zu lösen, verwenden Sie Ihre in Aufgabe 11.1.b. erhaltenen Zwischenergebnisse.

- (b) Der eindimensionale harmonische Oszillator unterliege der Störung

$$\hat{W} = \alpha(\hat{q}\hat{p} + \hat{p}\hat{q}). \quad (4)$$

Berechnen Sie die Zustände in erster Ordnung und die Energien bis zur zweiten Ordnung Störungstheorie. (**5 Punkte**)