Verschiebung der Abgabe wegen Pfingstmontag

Die Abgabe Ihrer Lösungen ist digital einzureichen bis **Dienstag, 02.06.20, um 11:00 Uhr**.

Aufgabe 1: Kontinuierliche Basis für δ -förmiges Potential **3+2+3 = 8 Punkte**

Wir betrachten ein Potential der Form $V(x) = -V_0\delta(x)$ mit $V_0 > 0$.

- (a) Für $E < 0$ existiert ein gebundener Zustand. Zeigen Sie, dass dieser gegeben ist durch

$$\varphi_0(x) = \sqrt{\rho}e^{-\rho|x|} \quad \text{mit} \quad \rho = \frac{mV_0}{\hbar^2}.$$

Neben der Stetigkeit von $\varphi(x)$ benötigen Sie hier als weitere für δ -Distributionen charakteristische Anschlussbedingung den endlichen Sprung in der Ableitung $\varphi'(0^+) - \varphi'(0^-) = -\frac{2mV_0\varphi(0)}{\hbar^2}$. Motivieren Sie diese durch Integration der Schrödingergleichung über $\int_{-\epsilon}^{\epsilon} dx$ mit anschließendem Grenzübergang $\epsilon \rightarrow 0$. Es ist $0^\pm = 0 \pm \epsilon$.

- (b) Für Streuzustände mit $E > 0$ benötigen wir noch von links und von rechts einlaufende Wellen, $\varphi_p^l(x)$ und $\varphi_p^r(x)$. Diese folgen gemäß der Ihnen bekannten Berechnung von Transmission und Reflexion und seien in dieser Aufgabe vorgegeben durch

$$\varphi_p^l(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \begin{cases} e^{ipx/\hbar} - \frac{1}{1+i\kappa}e^{-ipx/\hbar} & \text{für } x \leq 0 \\ \frac{i\kappa}{1+i\kappa}e^{ipx/\hbar} & \text{für } x > 0 \end{cases}$$

mit $p = \sqrt{2mE}$ und $\kappa = \frac{p}{\rho\hbar}$. Bestimmen Sie $\varphi_p^r(x)$ aus $\varphi_p^l(x)$ durch Symmetrieüberlegungen. Tatsächlich bilden der gebundene und die Streuzustände ein kontinuierliches Orthonormalsystem. Zeigen Sie die Relationen

$$\langle \varphi_0 | \varphi_0 \rangle = 1, \quad \langle \varphi_0 | \varphi_p^l \rangle = 0.$$

Das Skalarprodukt im Funktionenraum ist gegeben durch $\langle f_1 | f_2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx f_1^*(x) f_2(x)$. *Hinweis:* Nutzen Sie $\int_0^{\infty} dx e^{ikx} = \frac{i}{k} + \pi\delta(k)$. Es gilt auch $\langle \varphi_0 | \varphi_p^r \rangle = 0$, $\langle \varphi_p^l | \varphi_{p'}^l \rangle = \delta(p-p')$, $\langle \varphi_p^r | \varphi_{p'}^r \rangle = \delta(p-p')$ und $\langle \varphi_p^l | \varphi_{p'}^r \rangle = 0$, aber diese Rechnungen seien uns erspart.

- (c) Zeigen Sie für den Fall $x > 0$ und $x' > 0$, dass das System vollständig ist, also dass

$$\varphi_0(x)\varphi_0(x') + \int_0^{\infty} dp \varphi_p^{l*}(x)\varphi_p^l(x') + \int_0^{\infty} dp \varphi_p^{r*}(x)\varphi_p^r(x') = \delta(x-x').$$

Hinweis: Nützliche Integrale sind $\int_0^{\infty} dx \frac{\cos(ax)}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}e^{-|a|}$ und $\int_0^{\infty} dx \frac{x \sin(bx)}{1+x^2} = \text{sign}(b)\frac{\pi}{2}e^{-|b|}$.

Aufgabe 2: Basistransformationen

1+1+2 = 4 Punkte

In einem zweidimensionalen komplexen Hilbert-Raum mit normierten Basisvektoren $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ sei ein hermitescher Operator M definiert durch $M|+\rangle = |+\rangle$, $M|-\rangle = -|-\rangle$, $\langle + | - \rangle = 0$.

- (a) Wie lautet M in der Basis $|+\rangle, |-\rangle$?

- (b) Wir definieren $|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + i|-\rangle)$ und $|2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle - i|-\rangle)$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für $M = +1, M = -1$ jeweils in den beiden Zuständen $|1\rangle$ und $|2\rangle$? *Hinweis:* Offenbar sind die betragsquadierten Entwicklungskoeffizienten in der Eigenbasis $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ zu berechnen.
- (c) Zeigen Sie explizit, dass $|1\rangle$ und $|2\rangle$ orthonormal sind. Bestimmen Sie die unitäre Transformationsmatrix U , die $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ in $\{|1\rangle, |2\rangle\}$ überführt. In welche Matrix N wird M durch U transformiert?

Aufgabe 3: Eigenvektoren und Eigenwerte eines Operators

2+2 = 4 Punkte

Die Vektoren $\{|1\rangle, |2\rangle\}$ seien eine Orthonormalbasis eines zweidimensionalen komplexen Hilbert-Raums. Gegeben sei der Operator

$$\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \text{dargestellt in der Basis} \quad \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = a|1\rangle + b|2\rangle.$$

- (a) Ist σ_y hermitesch? Berechnen Sie die Eigenwerte und -vektoren $|x_i\rangle$ bezüglich der angegebenen Basis.
- (b) Prüfen Sie die Orthogonalität und Vollständigkeit der Eigenvektoren in der Darstellung der Orthonormalbasis. Drücken Sie den Projektionsoperator $P = \sum_i |x_i\rangle \langle x_i|$ durch die Orthonormalbasis aus und wenden Sie diesen auf die Eigenvektoren $|x_i\rangle$ an.

Aufgabe 4: Operatorspielerei, die Dritte

2+2 = 4 Punkte

Die zwei Teilaufgaben sind linear unabhängig.

- (a) Zeigen Sie: Besitzt ein linearer Operator A die Eigenschaft $AA^\dagger = A^\dagger A$ und ist $|a\rangle$ mit $\langle a|a\rangle = 1$ ein Eigenvektor von A zum Eigenwert a , so ist $|a\rangle$ auch Eigenvektor von $A^\dagger$ zum Eigenwert a^* . *Hinweis:* Ein Operator, welcher mit seinem Adjungierten vertauscht, heißt Normaloperator und besitzt stets ein vollständiges System orthogonaler Eigenvektoren.
- (b) Gegeben sei der Operator

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Zeigen Sie mit Hilfe der bekannten Reihenentwicklung, dass $\exp(i\alpha\sigma_x) = \mathbb{I} \cos \alpha + i\sigma_x \sin \alpha$ mit dem Einheitsoperator $\mathbb{I}$.

Aufgabe 5: Virialsatz und Hermite-Polynome

Präsenzaufgabe

Diese Aufgabe ist nicht schriftlich einzureichen. Die zwei Teilaufgaben sind unabhängig zu bearbeiten und je eine 10-15 minütige Präsentation wert.

- (a) Stellen Sie den Virialsatz aus der Mechanik vor, der eine Aussage zur zeitlich mittleren kinetischen Energie und potentiellen Energie eines abgeschlossenen physikalischen Systems macht. Zeigen Sie auch ein Beispiel auf. *Hinweis:* Wir diskutieren später die quantenmechanische Variante des Satzes.
- (b) In der Behandlung des harmonischen Oszillators in der Quantenmechanik treten Hermite-Polynome auf. Stellen Sie die Polynome vor. Legen Sie insbesondere auch Wert auf die Orthogonalität und die Vollständigkeit derselben.