

Übungen zur Theoretischen Physik F SS 10

Prof. Dr. G. Schön
Dr. J. ColeBlatt 0
Besprechung, 16.04.2010

1. Integrabilitätsbedingung:

Eine Form

$$\delta\omega = f(x, y)dx + g(x, y)dy$$

heißt integrabel wenn eine Funktion $h(x, y)$ existiert, deren vollständiges Differential dh identisch mit $\delta\omega$ ist. Das ist genau dann der Fall, wenn die Integrabilitätsbedingung

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_x = \left. \frac{\partial g}{\partial x} \right|_y$$

erfüllt ist.

Testen Sie, ob für die folgenden Fälle

(a) $f(x, y) = 3x^2 - 2xy - y^2$ und $g(x, y) = -x^2 - 2xy + y^2$,

(b) $f(x, y) = 3x + y$ und $g(x, y) = -x - 3y$,

$\delta\omega$ integrabel ist. Falls $\delta\omega$ integrabel ist, bestimmen Sie $h(x, y)$.

2. Funktionaldeterminanten:

Seien $u(x, y)$ und $v(x, y)$ Funktionen der unabhängigen Variablen x und y . Als Funktionaldeterminante bezeichnet man die Größe

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \det \begin{pmatrix} \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_y & \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_x \\ \left. \frac{\partial v}{\partial x} \right|_y & \left. \frac{\partial v}{\partial y} \right|_x \end{pmatrix}.$$

(a) Zeigen Sie die Relationen

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_y$$

$$\frac{\partial(x, v)}{\partial(x, y)} = \left. \frac{\partial v}{\partial y} \right|_x$$

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = -\frac{\partial(v, u)}{\partial(x, y)} = -\frac{\partial(u, v)}{\partial(y, x)} \quad \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(s, t)} \frac{\partial(s, t)}{\partial(x, y)} = \frac{\frac{\partial(u, v)}{\partial(s, t)}}{\frac{\partial(x, y)}{\partial(s, t)}}.$$

- (b) Es sei nun ein funktionaler Zusammenhang zwischen x und y durch $\phi(x, y) = \text{const} = z$ gegeben, der eine Abhängigkeit $y = y(x)$ herstellt. Zeigen Sie, dass dann gilt:

$$\left. \frac{\partial x}{\partial y} \right|_{\phi} = \left(\left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_{\phi} \right)^{-1}, \quad \left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_{\phi} = - \frac{\left. \frac{\partial \phi}{\partial x} \right|_y}{\left. \frac{\partial \phi}{\partial y} \right|_x}.$$

(Bem.: Oft schreiben wir in obigen Beziehungen einfach $z = z(x, y)$ und ersetzen ϕ überall durch z).

- (c) Wir betrachten nun drei Variablen, die eine Bedingung $F(x, y, z) = 0$ erfüllen, sowie zwei der Variablen eine weitere Bedingung $w = w(x, y)$. Zeigen Sie, dass dann gilt:

$$\left. \frac{\partial x}{\partial w} \right|_z = \left. \frac{\partial x}{\partial y} \right|_z \left. \frac{\partial y}{\partial w} \right|_z, \quad \left. \frac{\partial x}{\partial y} \right|_z = \left. \frac{\partial x}{\partial y} \right|_w + \left. \frac{\partial x}{\partial w} \right|_y \left. \frac{\partial w}{\partial y} \right|_z.$$

3. Legendre-Transformation:

Gegeben sei eine Kurve $U(S)$ in einem Bereich, in welchem sich das Vorzeichen ihrer Krümmung nicht ändert. Geben Sie eine eindeutige Darstellung der Kurve, indem Sie anstelle der Koordinaten S und U die Steigung $T = dU/dS$ sowie den U -Achsenabschnitt F der Tangente an jeden Kurvenpunkt als unabhängige Variable verwenden. Die Funktion $F(T)$ heißt Legendre-Transformierte zu $U(S)$. Auflösen der (obigen) Beziehung $T = T(S)$ nach S definiert eine Funktion $S = S(T)$.

- (a) Zeigen Sie, dass die vollständigen Differentiale der Kurve und ihrer Legendre-Transformierten durch

$$dU(S) = T(S)dS \quad \text{und} \quad dF(T) = -S(T)dT$$

gegeben sind.

- (b) Gegeben sei nun eine Fläche $U(S, V)$ mit positiver Steigung bezüglich S , negativer Steigung bezüglich V und unveränderlichem Vorzeichen der Krümmung. Führen Sie jeweils eine Legendre-Transformation für konstant gehaltenes V bzw. für konstant gehaltenes S durch. Die Steigungen seien durch $T = \partial U / \partial S|_V$ sowie $-P = \partial U / \partial V|_S$ gegeben. Auflösen von $T(S, V)$ nach S und $P(S, V)$ nach V definiert Funktionen $S(T, V)$ und $V(S, P)$. Bestimmen Sie analog zu oben die vollständigen Differentiale der Legendre-Transformierten $F(T, V)$ und $H(S, P)$. Die Funktionen $U(S, V)$, $F(T, V)$ und $H(S, P)$ entsprechen der inneren Energie, der freien Energie und der Enthalpie.